



КАТАЛОГ '23
ЗАСОБІВ
ЗАХИСТУ РОСЛИН

Розкриймо потенціал рослини разом!

ШАНОВНІ АГРАРІЇ, ПАРТНЕРИ, ДРУЗІ!

У новій реальності ми з вами постали перед новими викликами, але наші спільні цінності — чесність, добропорядність, сумлінність — незмінні. Компанія «Сингента» неухильно дотримується цих вимог у виробництві й бізнес-етиці. Щиро дякуємо вам за те, що вже багато років ви розкриваєте потенціал рослин разом із нами.

Завдяки вам ми відкриваємо нові обрії в сільському господарстві та вдосконалюємо наші продукцію й сервіси, щоб незмінно відповідати найвищим стандартам агробізнесу. Співпраця з вами нас надихає. Потенціал нашої землі нескінченний, і ми з вами це вже не раз доводили.

Нині наше головне завдання — зберегти і підвищити врожаї, полегшити вашу працю та принести ще більше інновацій в аграрний простір України.

Для нас честь — співпрацювати з вами. Щиро дякуємо вам за довіру, підтримку і міцне партнерство.

Віримо, що попереду у нас із вами багато здобутків та перемог!

З повагою і найкращими побажаннями,

компанія «Сингента»


Розкриймо потенціал рослини разом®

Зміст

Історія компанії.....	4	ДОДАТОК	188
Наука і розвиток.....	6	Препарати і строки їх застосування.....	190
Основні науково-дослідні центри у світі.....	7	Майстерня Аграрія.....	210
■ ПРОТРУЙНИКИ ТА ІНОКУЛЯНТИ	8	Офіційний додаток «Сингента Україна».....	212
■ ГЕРБИЦИДИ	28	АгроПрогноз.....	214
■ БІОСТИМУЛЯТОРИ	66	Корпоративна соціальна відповідальність.....	216
■ ІНСЕКТИЦИДИ	72	Контактна інформація.....	222
■ РЕТАРДАНТИ	96	Алфавітний покажчик.....	224
■ ФУНГІЦИДИ	102		
■ РОДЕНТИЦИДИ	146		
■ АГРОГІД	150		
■ SEEDCARE™	168		
■ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ	180		

Історія компанії

«Сингента» у її сучасному вигляді — молода компанія, яку засновано на давній виробничій традиції, що нараховує більше як 250 років. Ми пишаємося історією нашої компанії, яка вивела нас на позицію світового лідера





Наука і розвиток

«Сингента» — один зі світових лідерів у виробництві ЗЗР і насіння, але це далеко не все, що компанія може запропонувати агровиробникам


Поряд із виробництвом насіння компанія інтегрує весь цикл роботи з ним: селекція, виробництво, підготовка та продаж. «Сингента» пропонує готові системи захисту й антирезистентні програми для різних культур, розробляє і впроваджує у виробництво принципово нове сільськогосподарське обладнання.

Реалізація багатьох успішних проєктів компанії була б неможливою без попередніх польових дослідів. Ви запитаете: навщо ці досліді, якщо науковці давно все розрахували, а отримані в лабораторіях цифри свідчать про успіх?

Відповідь на це питання проста: на жаль, жодна найсучасніша лабораторія не спроможна відтворити процеси, які відбуваються в біосфері і супроводжують культурну рослину протягом усього її життєвого циклу.

Розуміючи всю серйозність цього аспекту, «Сингента» створила підрозділ біологічних досліджень (Research and Development), який сьогодні один з основних робочих інструментів компанії.

Випробування й дослідження підрозділу R&D проводяться винятково в польових умовах, і це потужний фундамент та основа авторитету компанії. Саме достеменність даних, отриманих у результаті польових досліджень, допомагає компанії краще зрозуміти та вповні оцінити перспективність і потенціал наших проєктів.



Основні науково-дослідні центри у світі



Улітку 2017 року компанія «Сингента» офіційно відкрила науково-селекційний центр у селі Чумаки Дніпропетровської області. Мета діяльності станції — виведення нових гібридів соняшнику й кукурудзи, адаптованих до вирощування в ґрунтово-кліматичних зонах України та Східної Європи.

Усього в компанії є три селекційні центри зі створення гібридів соняшнику. Крім розташованого в Україні, ще два діють у Франції й Аргентині. У межах станції функціонує сучасна лабораторія з вивчення стійкості селекційного матеріалу до нових рас вовчка. Основні напрями селекційної роботи центру — виведення гібридів соняшнику з високим вмістом олеїнової кислоти, гібридів, стійких до нових вірулентних рас вовчка соняшникового, до гербіцидів вибіркової дії, як-от HTS, Clearfield® і Clearfield® Plus, Air.

У центрі одночасно працюють по 4–5 селекційних програмах, випробовуючи понад 15 тис. різних комбінацій батьківських форм, щоб отримати найкращі результати. За час роботи селекційного центру виведено два перспективні гібриди соняшнику — SY Suomi та SY Aztek, у яких висока пристосованість до різних ґрунтово-кліматичних умов.

Серед найважливіших викликів, які постають перед селекціонерами кукурудзи, — вивести ранньостиглі високоврожайні гібриди, адаптовані до стресів, зокрема до посухи. Головне завдання селекції — створити ранньостиглі гібриди, фази цвітіння і формування врожаю яких завершуються до настання критичних літніх температур, щоб за рахунок швидкої вологовіддачі в аграріїв була можливість посіяти озимі культури.

Наразі серед здобутків селекційного центру — три виведені гібриди кукурудзи: SY Scorpius, SY Ambador, SY Pamplona. Гібрид SY Scorpius постійно входить у топ-10 гібридів за рівнем продажів не лише в Україні, а й по всій Європі.

Науково-дослідний центр охоплює селекційну станцію, селекційний розплідник та мережу дослідних полів з випробування соняшнику й кукурудзи, розташованих в усіх агрокліматичних зонах України. Тут відбувається весь селекційний процес — від перших схрещень до виведення нових ліній, переведення їх у стерильну форму, виробництво експериментального насіння для закладення дослідів та виробництво насіння для реєстрації.



Унікальні знаки Clearfield® та Clearfield® Plus є зареєстрованою торговою маркою компанії BASF. © 2016 BASF. Усі права захищено.

ЕКСПРЕС® є зареєстрованою торговою маркою компанії FMC

© 2018 FMC. Усі права захищені.



ПРОТРУЙНИКИ ТА ІНОКУЛЯНТИ

Апрон® XL 350 ES, ТН.....	10	Максим® Форте 050 FS, т. к. с.....	20
Атува® (+ протектор Премакс™).....	11	Максим® XL 035 FS, т. к. с.....	21
Вайбранс® 500 FS, ТН.....	12	Селест® Макс 165 FS, ТН.....	22
Вайбранс® Інтеграл 235 FS, ТН.....	13	Селест® Топ 312.5 FS, ТН.....	23
Вайбранс® Тріо FS, ТН.....	14	Форс® 200 CS, СК.....	24
Вайбранс® RFC, ТН.....	15	Форс® Зеа 280 FS, ТН.....	25
Круїзер® 350 FS, т. к. с.....	16	З турботою про сою.....	26
Круїзер® OSR 322 FS, ТН.....	17	Механізм дії основних класів протруйників.....	27
Максим® 025 FS, ТН.....	18		





ЗАВАНТАЖТЕ ПРОГРАМУ
SYNGENTA SEEDCARE AR









ЗАВАНТАЖУЮЧИ ПРОГРАМУ, ВИБЕРІТЬ УКРАЇНУ ЯК КРАЇНУ.

Ukraine

ВИ ЗНАЙДЕТЕ ЦЕЙ ЗНАЧОК НА ТИХ СТОРІНКАХ, ДЕ ВИ МОЖЕТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДОПОВНЕНУ РЕАЛЬНОСТЬ.

[
ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ З AR
]









THE
SEEDCARE
INSTITUTE™



ВІДМІННИЙ ЗАХИСТ ВІД ПЕРОНОСПОРОЗУ І ВЕРТИЦИЛЬОЗУ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Апрон® XL 350 ES, TH
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	350 г/л металаксилу–М
	ХІМІЧНА ГРУПА	Феніламід
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Текучий концентрат для обробки насіння
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л, 20 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Надійний захист насіння і молодих рослин від внутрішньої й зовнішньої інфекції
- ✓ Знищення первинної інфекції та контроль вторинного інфікування сходів рослин
- ✓ Тривала захисна дія
- ✓ Висока толерантність до культури
- ✓ Оброблене насіння можна зберігати декілька років без втрати схожості

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/т
СОНЯШНИК	Несправжня борошниста роса, вертицильоз, біла гниль	Передпосівна обробка насіння суспензією препарату	3,0
ЦУКРОВІ БУРЯКИ	Пероноспороз, коренеїд		2,0
ОГІРКИ	Пероноспороз		2,5
КАПУСТА, ЦВІТНА КАПУСТА	Кореневі гнилі, пероноспороз		0,5
ЦИБУЛЯ			1,0
МОРКВА			1,0
КАВУН			1,0

СУМІСНІСТЬ: **Апрон® XL** можна застосовувати самостійно, а також як додатковий елемент у сумішах з іншими протруйниками, крім тих, що мають олійну основу, при високому рівні ураження насіння або ґрунту збудниками пероноспорозу. Сумісний з препаратами **Максим® 025**, **Максим® XL**, **Круїзер® 350**, **Круїзер® 600**, **Форс® 200**. У кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.





БАКТЕРІЇ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ВАШ УРОЖАЙ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Атува® (+ протектор Премакс™)
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	Штами бульбочкових бактерій <i>Bradyrhizobium japonicum</i> (штам 5079 і штам 5080), титр життєздатності клітин бульбочкових бактерій на 1 мл препарату — не менше як 2×10^{10} КУО/мл
	ХІМІЧНА ГРУПА	Біологічний препарат
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Стерильна рідка формуляція
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Нетоксичний, ЛД50 > 5 млрд клітин/мишу
	УПАКОВКА	Полімерні пакети об'ємом 4 л з інокулянтом Атува® та об'ємом 1 л з протектором Премакс™ та комбіпаки з інокулянтом Атува® об'ємом 2 л та протектором Премакс™ об'ємом 0,5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Концентрація бактерії 2×10^{10} КУО/мл — найвища серед конкурентних продуктів
- ✓ Потовщена стінка мембран бактерії (технологія ОСМО-протекшн) забезпечує високий рівень виживання бактерії в упаковці і на насінні в стресових умовах (засуха, холод, хімічний стрес)
- ✓ Рідка формуляція і технологія одночасного нанесення з протруйниками

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/т
СОЯ	Утворення бульбочок на коренях та фіксування атмосферного азоту в симбіозі з рослинами сої	Обробка насіння	2 л/т Атува® + 0,5 л/т Премакс™

Атува® — це інокулянт для сої від одного зі світових лідерів ринку біологічних препаратів компанії «Різобактер» (Аргентина), виготовлений спеціальним методом розмноження бактерії за ексклюзивною технологією ОСМО-протекшн для підвищення сумісності з протруйниками та досягнення найкращого рівня інокуляції.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Біопрепарат зберігають окремо від пестицидів і харчових продуктів у темному, захищеному від атмосферних опадів приміщенні при нормальній вологості від 60 % до 75 %. Термін зберігання препарату в тарі виробника при нормальній вологості і температурі від +4 °C до +10 °C — 24 місяці.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ: При температурах не нижче за +10 °C. Температура води при готуванні робочої рідини не вище за +25 °C. Приготовлену робочу рідину варто взяти протягом двох годин при вологості від 60 % до 75 %. Препарати слід використати одразу після відкриття пакета (оригінального фасування).

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ: Протруєння слід проводити в місцях, де немає впливу прямих сонячних променів. Для найдовшого зберігання активності спочатку треба наносити протруйник, а потім інокулянт. Середовище, яке міститься в продукті, було стерилізоване перед внесенням азотфіксуючої бактерії, що дозволяє унеможливити забруднення препарату іншими сторонніми організмами.

* КУО — колонієутворювальних одиниць.




Сервіс «Фітоекспертиза насіннєвого матеріалу». Див. с. 156.

Сервіс «Калібрування протруювальних машин та перевірка якості нанесення». Див. с. 167.



Рекомендовано засіб індивідуального захисту
Наприклад:
Повнолицьова маска з фільтром ЗМ 6000 + ЗМ 6035 (РЗ) або 2135 (РЗ)





Вайбранс®

СТАБІЛЬНИЙ УРОЖАЙ ТА НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Вайбранс® 500 FS, TH
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	500 г/л седаксану
	ХІМІЧНА ГРУПА	Карбоксаміди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Текучий концентрат для обробки насіння
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	200 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Стимулівний вплив на розвиток кореневої системи
- ✓ Надійний захист від летючої сажки
- ✓ Максимальний захист від ризоктоніозної кореневої гнилі
- ✓ Надійний захист у монокультурі



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/т
КУКУРУДЗА	Ризоктоніозна коренева гниль, стимулювання розвитку кореневої системи	Протруювання насіння перед висіванням	0,13–0,25 (4 мл на 80 тис. насінин)
	Ризоктоніозна коренева гниль, летюча сажка, стимулювання розвитку кореневої системи		0,8–1,5 (24 мл на 80 тис. насінин)

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю препаратів, крім тих, що мають олійну основу. У кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.

Може використовуватися в сумішах з препаратами **Максим® Кватро**, **Максим® XL**, **Максим®**, **Круїзер® 350**, **Круїзер® 600**, **Форс® Зеа** та іншими протруйниками.

Фізіологи науково обґрунтували, що загалом передпосівна обробка насіння седаксаном позитивно впливає на ростові показники і вміст фотосинтетичних пігментів у рослин озимої пшениці та кукурудзи в разі ґрунтової посухи, термічного й сольового стресів. Отримані результати свідчать про можливість передпосівної обробки насіння седаксаном задля підвищення посухостійкості рослин на ранніх фазах розвитку.



Вайбранс® Інтеграл

Формула М

ЗМІНЮЄ СТЕРЕОТИПИ В ЗАХИСТІ НАСІННЯ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Вайбранс® Інтеграл 235 FS, TH
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	25 г/л седаксану, 25 г/л флудиоксонілу, 10 г/л тебуконазолу, 175 г/л тіаметоксаму
	ХІМІЧНА ГРУПА	Карбоксаміди, фенілпіроли, триазоли, неонікотиніди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Текучий концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л, 20 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Стимулює розвиток кореневої системи, особливо в умовах стресу
- ✓ Тривалий посилений захист проти фузаріозної, ризоктоніозної корневих і прикорневих гнилей, тифульозу, снігової плісняви
- ✓ Можливість застосовувати після будь-якого попередника
- ✓ Формула М у складі протруйника забезпечує краще утримання препарату на насінні та ідеальну якість протруювання




ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/т
ЯЧМІНЬ ЯРИЙ	Сажкові хвороби (тверда, летюча, кам'яна), гельмінтоспориоз, септоріоз, кореневі гнілі, снігова пліснява, ризоктоніоз, тифульоз, хлібна жужелиця, злакові мухи, хлібні блішки, попелиці, цикадки, п'явиці, трипси	Протруювання насіння перед висіванням	1,5–2,0
ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ			1,5–2,0
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА			1,5–2,0

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю препаратів, крім тих, що мають олійну основу. У кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: Дізнавайтесь більше на сайті www.vibrance.com.ua.

Фізіологи науково обґрунтували, що загалом передпосівна обробка насіння седаксаном позитивно впливає на ростові показники і вміст фотосинтетичних пігментів у рослин озимої пшениці та кукурудзи в разі ґрунтової посухи, термічного й сольового стресів. Отримані результати свідчать про можливість передпосівної обробки насіння седаксаном задля підвищення посухостійкості рослин на ранніх фазах розвитку.





Вайбранс® Тріо

Формула М

ТРИ ВИМІРИ ЗАХИСТУ ВАШОГО НАСІННЯ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Вайбранс® Тріо FS, TH
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	25 г/л седаксану, 25 г/л флудиоксонілу, 10 г/л тебуконазолу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Карбоксаміди, фенілпіроли, триазоли
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Текучий концентрат для обробки насіння
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація BOO3: II
	УПАКОВКА	5 л, 20 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Максимальний фунгіцидний захист у всіх зонах вирощування після будь-якого попередника
- ✓ Стимулювання розвитку кореневої системи за будь-яких термінів висіву
- ✓ Тривалий посилений захист проти фузаріозної, ризоктоніозної корневих і прикорневих гнилей, тифульозу, снігової плісняви
- ✓ Формула М у складі протруйника забезпечує краще утримання препарату на насінні та ідеальну якість протруювання

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/т
ЯЧМІНЬ ЯРИЙ	Сажкові хвороби (тверда, летюча, кам'яна), гельмінтоспориози, септоріоз, кореневі гнилі, снігова пліснява, ризоктоніоз, тифульоз	Протруювання насіння перед висіванням	1,5–2,0
ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ			
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА			

Фізіологи науково обґрунтували, що загалом передпосівна обробка насіння седаксаном позитивно впливає на ростові показники і вміст фотосинтетичних пігментів у рослин озимої пшениці та кукурудзи в разі ґрунтової посухи, термічного й сольового стресів. Отримані результати свідчать про можливість передпосівної обробки насіння седаксаном задля підвищення посухостійкості рослин на ранніх фазах розвитку.



ДОСКОНАЛІСТЬ СКЛАДУ, ФОРМУЛЯЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ


ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Вайбранс® RFC 112,5 TH
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	50 г/л седаксану, 25 г/л флудиоксонілу, 37,5 г/л металаксилу-М
	ХІМІЧНА ГРУПА	Карбоксаміди, фенілпіроли, феніламід
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Текучий концентрат для обробки насіння
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Сучасна формуляція, розроблена для одночасного нанесення з інокулянтами
- ✓ Надійний фунгіцидний захист у сівозмінах, насичених просапними культурами
- ✓ Стимулює розвиток кореневої системи на всіх типах ґрунтів
- ✓ Подовжений захист від усіх форм корневих і прикорневих гнилей та пероноспорозу
- ✓ Формула М у складі протруйника забезпечує краще утримання препарату на насінні та ідеальну якість протруювання



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/т
СОЯ, ГОРОХ, НУТ	Фузаріоз, кореневі і прикореневі гнилі, в т. ч. ризоктоніоз, пероноспороз, біла гниль, аскохітоз, септоріоз	Протруювання насіння перед висіванням	1,0

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю препаратів, крім тих, що мають олійну основу. У кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність. **Вайбранс® RFC**, т. н. розроблено для одночасного нанесення з азотфіксуючими бактеріями. Можна наносити в суміші з рідкими інокулянтами на основі *Bradyrhizobium japonicum* як одночасну аплікацію.

ОБ'ЄМ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: До 6 л/т залежно від устаткування для протруювання насіння.





ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАСІННЯ І СХОДІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Круїзер® 350 FS, т. к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	350 г/л тіаметоксаму
	ХІМІЧНА ГРУПА	Неонікотиноїди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Текучий концентрат суспензії для обробки насіння
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	20 л, 200 л, 1000 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Системна дія забезпечує ефективний захист від ґрунтових і посходових шкідників протягом 6–8 тижнів
- ✓ Збереження оптимальної густоти сходів при мінімальній витраті насіннєвого матеріалу
- ✓ Відсутність негативної дії на посівні якості насіння (зокрема й того, яке зберігалось протягом року після обробки)
- ✓ «Вігор»-ефект — препарат стимулює і покращує загальну стресостійкість рослин, які проростають

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ







Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/т
БУРЯКИ ЦУКРОВІ	Дротяники, довгоносики, блішки, щитоноски, піщаний мідляк, бурякова крихітка, личинки хрущів, попелиці	Передпосівна обробка насіння суспензією препарату	10,0–15,0
КУКУРУДЗА	Дротяники, несправжні дротяники, чорнотілки, шведська муха, попелиці, блішки, західний кукурудзяний жук (діабротика)		6,0–9,0 (144 мл / 80 тис. нас.)
СОНЯШНИК	Дротяники, несправжні дротяники, сірий і південний бурякові довгоносики, мідляки, попелиці		6,0–10,0 (111 мл / 150 тис. нас.)
РІПАК	Хрестоцвіті і ріпакова блішки, капустияний і ріпаковий прихованохоботники, ріпаковий пильщик, попелиці, дротяники, несправжні дротяники, личинки хрущів		4,0
ЛЬОН	Льонова блішка		0,5
КАРТОПЛЯ	Колорадський жук, дротяники, комплекс ґрунтових і посходових шкідників		0,3
СОРГО	Ґрунтові шкідники, попелиці		5,0
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА	Хлібна жужелиця, злакові мухи, цикадки, попелиці		0,4–0,5

Стимує поширення вірусних хвороб, знищуючи їхніх головних переносників — попелиць, цикадок, трипсів тощо

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю препаратів для обробки насіння, крім тих, що містять органічні розчинники. Може використовуватися в сумішах з препаратами **Апрон® XL**, **Максим® XL**, **Максим®**, **Максим® Кватро**, **Вайбранс® Тріо**, **Максим® Форте**, **Вайбранс® RFC** та іншими протруйниками.



ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Круїзер® OSR 322 FS, TH
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	33,3 г/л металаксилу–М, 8 г/л флудиоксонілу, 280 г/л тіаметоксаму
	ХІМІЧНА ГРУПА	Феніламіди, фенілпіроліди, неонікотиноїди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Текучий концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Відмінний контроль широкого спектра шкідників і хвороб
- ✓ Безпечний для культури
- ✓ «Вігор»–ефект стимулює проростання рослин
- ✓ Оброблені препаратом рослини краще переносять холод



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/т
РІПАК	Шкідники: дротяники, личинки хрущів, несправжні дротяники, хрестоцвіті блішки та ін. Хвороби: фомоз, альтернаріоз, фузаріоз, пероноспороз, пітіоз	Передпосівна обробка насіння суспензією препарату	15,0
МАК	Шкідники: комплекс наземних і ґрунтових шкідників сходів Хвороби: гельмінтоспоріоз, фузаріозна коренева гниль, пероноспороз		35,0

Стимує поширення вірусних хвороб, знищуючи їхніх головних переносників — попелиць

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із полімерними препаратами для дражування насіння, а також з іншими препаратами для обробки насіння у вигляді водних текучих емульсій з нейтральною реакцією. У разі сумнівів слід провести перевірку.









Рекомендовано засіб індивідуального захисту
Наприклад:
Напівмаска з фільтрами 3М 6059 ABEK1 + 3М 5925 P2

THE
SEEDCARE
INSTITUTE™

Максим®


СТАНДАРТ ОБРОБКИ НАСІННЯ ПРОТИ ХВОРОБ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Максим® 025 FS, TH
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	25 г/л флудиоксонілу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Фенілпіроли
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Текучий концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л, 200 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Препарат контактної дії проти широкого спектра хвороб
- ✓ Тривалий період захисної дії
- ✓ Висока ефективність проти фузаріозів
- ✓ Висока толерантність до культури
- ✓ Сучасна препаративна форма, яка надійно утримується на насінні

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га
ГОРОХ	Фузаріоз	Передпосівна обробка насіння суспензією препарату	1,0
КУКУРУДЗА	Стеблові і кореневі гнилі		
ЛЬОН	Фузаріоз, антракноз, побуріння стебел		
РИС	Пірикуляріоз		1,5
КАРТОПЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ НАСІННЄВІ ПОСІВИ	Суха гниль, гельмінтоспоріоз, парша, фомоз	Обробка бульб перед садінням або під час садіння	0,75
ТРАВИ ГАЗОННІ	Комплекс хвороб	У період вегетації	0,75*
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА	Снігова пліснява, кореневі гнилі, тверда сажка, фузаріоз	Передпосівна обробка насіння суспензією препарату	1,5–2,0
СОНЯШНИК	Кореневі гнилі		5,0–6,0

* Норму вказано в літрах на гектар (л/га). Рекомендована норма витрати робочого розчину — 300 л/га.

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю препаратів, крім тих, що мають олійну основу. У кожному окремому випадку слід перевіряти препарати на сумісність.











THE
SEEDCARE
INSTITUTE™**Максим® Форте**

Формула М

АгроГід 

ФОРМУЛА МАКСИМАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСІННЯ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Максим® Форте 050 FS, т. к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	25 г/л флудиоксонілу, 15 г/л тебуконазолу, 10 г/л азоксистробіну
	ХІМІЧНА ГРУПА	Фенілпіроли, триазоли, стробілурини
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Текучий концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л, 20 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ


- ✓ Максимальна ефективність проти офіобольозної і фузаріозної кореневих гнилей за рахунок синергії трьох діючих речовин
- ✓ Максимально дієвий протруйник у складі антирезистентних програм
- ✓ Максимальна урожайність завдяки захисту від хвороб і фізіологічної стимулятивної дії
- ✓ Формула М у складі протруйника забезпечує максимальне утримання препарату на насінні та ідеальний контроль якості протруювання

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ



Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/т
ЯЧМІНЬ ЯРИЙ	Кам'яна й летюча сажки, темно-бура плямистість, кореневі гнилі	Передпосівна обробка насіння суспензією препарату	1,5–2,0
ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ	Кам'яна й летюча сажки, гельмінтоспоріози		
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА	Тверда й летюча сажки, септоріоз, кореневі гнилі		

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю препаратів, крім тих, що мають олійну основу.

У кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.



Інші формуляції







Формула М





НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ НАСІННЯ ВІД ҐРУНТОВИХ І ВНУТРІШНІХ ІНФЕКЦІЙ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Максим® XL 035 FS, т. к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	25 г/л флудиоксонілу, 10 г/л металаксилу–М
	ХІМІЧНА ГРУПА	Феніламіди, фенілпіроли
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Текучий концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л, 200 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Препарат системної і контактної дії для боротьби з ґрунтовими й насінневими інфекціями та хворобами сходів
- ✓ Зберігає оптимальну густоту здорових молодих рослин
- ✓ Системна дія для знищення внутрішньої інфекції
- ✓ Відсутність негативної дії на посівні якості насіння навіть через рік після обробки



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/т
БУРЯКИ ЦУКРОВІ	Коренеїд, пліснявіння насіння	Передпосівна обробка насіння суспензією препарату	9 мл на посівну одиницю
ГОРОХ, СОЯ	Пліснявіння насіння, фузаріозна коренева гниль, пероноспороз, аскохітоз		1,0
КУКУРУДЗА	Стеблові й кореневі гнилі, пліснявіння насіння		6,0
СОНЯШНИК	Пліснявіння насіння, фузаріозна коренева гниль, біла гниль		5,0
РІПАК	Пероноспороз, пліснявіння насіння, фузаріозна коренева гниль, альтернаріоз, пітіум		
СОРГО	Гельмінтоспоріоз, пліснявіння насіння, кореневі гнилі		

СУМІСНІСТЬ: Максим® XL можна використовувати в сумішах з препаратами **Апрон® XL, Круїзер®, Форс® Зеа, Вайбранс® 500** та іншими протруйниками, зареєстрованими на відповідних культурах. У кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.







THE
SEEDCARE
INSTITUTE™

Селест® Макс
Формула М



ЗБАЛАНСОВАНИЙ ЗАХИСТ — ЗБАЛАНСОВАНА ЦІНА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Селест® Макс 165 FS, ТН
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	25 г/л флудиоксонілу, 15 г/л тебуконазолу, 125 г/л тіаметоксаму
	ХІМІЧНА ГРУПА	Фенілпіроли, триазоли, неонікотиноїди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Текучий концентрат для обробки насіння
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л, 20 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Збалансований захист від шкідників і хвороб на початковому етапі росту рослини
- ✓ Готова до використання суміш, яка не потребує корекції
- ✓ Можливість застосовувати після будь-якого попередника
- ✓ Максимальна прибутковість на посівах різного призначення і різного терміну висіву
- ✓ Формула М у складі протруйника забезпечує максимальне утримання препарату на насінні та ідеальний контроль якості протруювання

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ







Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/т
ПШЕНИЦЯ ЯРА	Тверда й летюча сажки, кореневі гнилі (фузаріозна, гельмінтоспориозна, офіобольозна), септоріоз. Хлібна жужелиця, злакові мухи, хлібні блішки, попелиці, цикадки	Передпосівна обробка насіння суспензією препарату	1,5–2,0
ЯЧМІНЬ ЯРИЙ	Кам'яна й летюча сажки, гельмінтоспориози, септоріоз. Попелиці, цикадки, п'явиці, трипси, хлібні блішки, хлібна жужелиця		
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА	Тверда й летюча сажки, кореневі гнилі (фузаріозна, гельмінтоспориозна, офіобольозна), септоріоз. Хлібна жужелиця, злакові мухи, хлібні блішки, попелиці, цикадки		
ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ	Кам'яна й летюча сажки, гельмінтоспориози, септоріоз. Попелиці, цикадки, п'явиці, трипси, хлібні блішки, хлібна жужелиця		

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю препаратів, крім тих, що мають олійну основу.
У кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.



ГОТОВЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВРОЖАЮ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Селест® Топ 312.5 FS, TH
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	25 г/л флудиоксонілу, 25 г/л дифеноконазолу, 262,5 г/л тіаметоксаму
	ХІМІЧНА ГРУПА	Фенілпіроли, триазоли, неонікотиноїди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Текучий концентрат для обробки насіння
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Селест® Топ — інсекто-фунгіцид для комплексного захисту картоплі від ризоктоніозу, альтернаріозу, парші, комплексу ґрунтових і наземних шкідників. З моменту проростання і сходів препарат забезпечує надзвичайно тривалий захист завдяки синергії діючих речовин у своїй формуляції
- ✓ Готова до використання суміш фунгіцидів та інсектициду
- ✓ Високотехнологічне антирезистентне рішення для комплексного захисту картоплі, яке має подовжений ефект як у ґрунті, так і після сходів культури
- ✓ «Вігор»-ефект — стимулювання сходів, розвиток кореневої системи, підвищення стресостійкості



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/т
КАРТОПЛЯ	Комплекс хвороб (ризоктоніоз, альтернаріоз, парша срібляста і звичайна, фузаріоз), комплекс ґрунтових шкідників та шкідників сходів (дротяники, личинки хрущів, капустянки, несправжньодротяники, попелиці, колорадський жуқ)	Обробка бульб перед садінням / при садінні	0,5–0,7
СОЯ	Фузаріоз, аскохітоз, дротяники	Передпосівна обробка насіння суспензією препарату	1,0–1,5
РИС	Пірикуляріоз		2,0
ПШЕНИЦЯ І ЖИТО ОЗИМИ	Летюча сажка, фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, септоріоз. Хлібна жужелиця, злакові мухи, хлібні блішки, попелиці, цикадки		1,5–2,0
ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ І ЯРИЙ	Кам'яна і летюча сажки, фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, септоріоз, борошниста роса. Хлібна жужелиця, злакові мухи, хлібні блішки, попелиці, цикадки		

МЕХАНІЗМ ДІЇ: Контактно-системний.


Флудиоксоніл впливає на утворення клітинних мембран і синтез амінокислот грибів. Цей механізм дії характерний тільки для фенілпіролів, завдяки чому флудиоксоніл має унікальну біологічну ефективність.

Дифеноконазол інгібує синтез ергостеролу гриба-патогена, у зв'язку з чим не відбувається далі утворення клітин гриба-патогена.

Тіаметоксам перериває передачу нервових імпульсів у нервовій системі комах, унаслідок чого вони гинуть при спробі поживитися рослиною, яка виросла з насіння, обробленого **Селест® Топ**.

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю препаратів, крім тих, що мають олійну основу. У кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.

ЗАСТОСУВАННЯ НА КАРТОПЛІ: Обробка бульб за 12–48 годин до висаджування або при садінні.



ПОВНИЙ СПЕКТР ЗАХИСТУ ВІД ҐРУНТОВИХ ШКІДНИКІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Форс® 200 CS, СК
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	200 г/л тефлутрину
	ХІМІЧНА ГРУПА	Синтетичні піретроїди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Капсульована суспензія
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	20 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Інсектицидний протруйник з фумігантним ефектом
- ✓ Однаково потужно діє на різні види ґрунтових шкідників
- ✓ Повна відсутність негативної дії на посівні якості насіння
- ✓ Діє навіть у посушливих умовах
- ✓ Забезпечує точний висів насіння навіть при високій чисельності ґрунтових шкідників



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/т
ЦУКРОВІ БУРЯКИ	Дротяники, личинки коваликів, бурякова крихітка, бурякова коренева попелиця	Передпосівна обробка насіння суспензією препарату	14,0
СОНЯШНИК	Комплекс ґрунтових шкідників		2,0
КУКУРУДЗА			2,5–5,0

Форс® постачається лише на перевірені спеціалістами компанії «Сингента» насінневі заводи, тому що препарат потребує спеціальних умов застосування.

ІННОВАЦІЙНІСТЬ: **Тефлутрин** — незвичайний інсектицид з класу піретроїдів. Унікальна риса, якою тефлутрин вирізняється серед решти діючих речовин, — це утворення активної газової фракції, а відтак захисної сфери навколо обробленого насіння в радіусі 2–2,5 см. Завдяки цьому шкідники гинуть ще до того, як устигають завдати шкоди насінню, проросткам чи корінню.

УВАГА! ОБРОБЛЕНЕ НАСІННЯ НЕ МОЖНА ДОРОБЛЯТИ В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВА.





ОПТИМАЛЬНА ГУСТОТА ДЛЯ ФОРСОВАНОГО РОСТУ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Форс® Зеа 280 FS, TH
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	200 г/л тіаметоксаму, 80 г/л тефлутрину
	ХІМІЧНА ГРУПА	Неонікотиноїди, синтетичні піретроїди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Текучий концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	50 л, 1000 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Превентивний контроль ґрунтових шкідників ще до безпосереднього їх контакту з обробленими рослинами
- ✓ Контроль шкідників сходів на ранніх етапах розвитку кукурудзи
- ✓ Оптимізація норми висіву
- ✓ Істотно зменшує пошкодженість птахами



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ


Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/т
КУКУРУДЗА	Комплекс ґрунтових шкідників (дротяники, несправжні дротяники, личинки хрущів, гусениці підгризаючих совок), попелиці, блішки, чорниші, західний кукурудзяний жук, шведські мухи	Передпосівна обробка насіння суспензією препарату	5,0–6,0 (100 мл / 80 тис. нас.)

Завдяки утворенню газової фази запобігає навіть дрібним пошкодженням ґрунтовими шкідниками (на відміну від суто системних інсектицидів), що надалі унеможлиблює розвиток вторинних інфекцій, як-от ризоктоніози, фузаріози, бактеріози та ін.

Для забезпечення репелентної дії потрібна температура +8...10 °С. У зв'язку з цим слід уникати висівати насіння кукурудзи в холодний ґрунт або якщо очікується зниження температури ґрунту протягом терміну дії препарату. Крім того, слід дотримуватися агротехнічних умов і термінів посіву.

СУМІСНІСТЬ: Форс® Зеа можна змішувати з іншими загальноживаними пестицидами для обробки насіння. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.

УВАГА! ОБРОБЛЕНЕ НАСІННЯ НЕ МОЖНА ДОРОБЛЯТИ В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВА.



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

Застосування інсектицидного протруйника з визначеною нормою саме на посівну одиницю (100 мл препарату на 80 тис. насінин кукурудзи) можливе тільки на спеціалізованому насінневному заводі. Лише обробка протруйником у заводських умовах забезпечує однакову норму інсектициду на кожен насінину.



Рекомендовано засіб індивідуального захисту
Наприклад:
Повнолицьова маска з фільтром 3M 6051 A1 + 3M 5911 P1

З турботою про сою

Соя — це культура з максимальною віддачею в разі застосування правильного протруйника та інокулянта

Новітня розробка компанії «Сингента» — формуляція під назвою Rhizobium Friendly (дружній до бактерій) дає змогу одночасно наносити (4 секунди) на насіння сої протруйник та інокулянт без жодного «конфлікту» між ними.

Формуляцію RFC — Rhizobium Friendly Compounds (дружня до бактерій формуляція) — спеціально розроблено для обробки насіння разом з інокулянтом, вона не впливає на життєздатність бульбочкових бактерій.

В основі протруйника лежить інноваційна діюча речовина седаксан — перша молекула від компанії «Сингента», розроблена спеціально тільки для обробки насіння.



Такий склад діючих речовин у протруйнику **Вайбранс® RFC** дає максимальний фунгіцидний захист від широкого спектра насінневих і ґрунтових інфекцій при вирощуванні сої.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Сучасна формуляція, розроблена для одночасного нанесення з інокулянтами
- ✓ Надійний фунгіцидний захист у сівозмінах, насичених просапними культурами
- ✓ Стимулює розвиток кореневої системи на всіх типах ґрунтів
- ✓ Подовжений захист від усіх форм корневих і прикорневих гнилей та пероноспорозу
- ✓ Формула М у складі протруйника забезпечує краще утримання препарату на насінні та ідеальну якість протруювання

МЕХАНІЗМ ДІЇ ОСНОВНИХ КЛАСІВ ПРОТРУЙНИКІВ

FRAC код	Механізм дії	Хімічна група	Діюча речовина	Препарат	Ризик резистентності	Принцип дії
E2	Осморегуляція клітини, синтез амінокислот	Фенілпіроли	Флудиоксоніл	Вайбранс® Інтеграл Вайбранс® Тріо Вайбранс® RFC Максим® 025 FS Максим® Форте Максим® XL Максим® Адванс Максим® Кватро Селест® Макс Селест® Топ Круїзер® OSR	Низький–середній	Контактний
A1	Інгібування біосинтезу нуклеїнових кислот	Феніламід	Металаксил–М	Апрон® XL Максим® XL Максим® Адванс Максим® Кватро Круїзер® OSR	Середній	Системний
3	Біосинтез стеролу в мембрані (С 14–диметилази)	Триазоли	Тебуконазол	Вайбранс® Інтеграл Вайбранс® Тріо Максим® Форте Селест® Макс	Середній	Системний
			Дифеноконазол	Селест® Топ		
B1	Мітоз і поділ клітини	Бензамідазоли	Тіабендазол	Максим® Адванс Максим® Кватро		
11	Мітохондріальне дихання клітин патогену	Стробілурини	Азоксистробін	Максим® Форте Максим® Кватро	Високий	Трансламінарний
C2	Інгібування сукцинатдегідрогінази	Карбоксаміди	Седаксан	Вайбранс® Інтеграл Вайбранс® 500 Вайбранс® Тріо Вайбранс® RFC	Високий	Контактно-системний
4A	Антагоністи нікотинінових ацетилхолінових рецепторів	Неонікотиніоїди	Тіаметоксам	Вайбранс® Інтеграл Селест® Макс Селест® Топ Круїзер® OSR Круїзер® Зеа Форс® Зеа	Середній	Системний
3A	Модулятор натрієвих каналів	Піретроїди	Тефлутрин	Форс® Форс® Зеа	Високий	Контактно-фумігаційний

ГЕРБИЦИДИ

Аксіал® Крос 050 EC к. е.	30	Мілагро® 040 SC, к. с.	47
Аксіал® 050 EC, к. е.	32	Люмакс® 537,5 SE, с. е.	48
Гезагард® 500 FW, к. с.	33	Про Люмакс®	49
Дербі® 175, к. с.	34	Пік® 75 WG, ВГ	50
Діален Супер® 464 SL, в. р. к.	35	Пріма™ Форте 195 , с. е.	51
Дуал Голд® 960 EC, к. е.	36	Примекстра® Голд 720 SC, к. с.	54
Каллісто® 480 SC, к. с.	37	Примекстра® TZ Голд 500 SC, к. с.	55
Елюміс® 105 OD, МД.	38	Реглон® Ейр 200 SL, РК.....	56
Про Елюміс®.	39	Реглон® Форте 200 SL, РК.....	57
Каптора®, РК	40	Реглон® Супер 150 SL, РК.....	58
Каптора® Плюс, РК.....	42	Твіст™ 250, в. г.	60
Лінтур® 70 WG, в. г.	44	Ураган Форте® 500 SL, в. р. к.	62
Логран® 75 WG, в. г.	45	Фюзілад Форте® 150 EC, к. е.	64
Лонтрел™ Гранд, в. г.	46		





НОВИЙ



Аксіал® Крос

ПЕРЕХРЕСТЯ УСПІШНИХ РІШЕНЬ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Аксіал® Крос 050 ЕС, КЕ
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	45 г/л піноксадену + 5 г/л флорасуламу + 11,25 г/л антидоту (клоквінтосет-мексилу)
	ХІМІЧНА ГРУПА	Фенілпіразоліни + триазолпіримідини
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Еталон у боротьбі з вівсюгом і метлюгом звичайними, лисохвостом, видами мишіїв і курячого проса, з падалицею соняшнику й ріпаку всіх видів
- ✓ Перший гербіцид на ринку з крос-спектром на ячмені — ярому й озимому
- ✓ Можливість застосовувати навесні і восени
- ✓ Відсутність фітотоксичності на культуру
- ✓ Не має післядії в сівозміні

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА, ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ І ЯРИЙ ТА ЖИТО (В ПРОЦЕСІ РЕЄСТРАЦІЇ)	Однорічні злакові бур'яни: метлюг звичайний, види вівсюга, види лисохвосту, види очеретянки, види пажитниці, види мишію, плоскуха звичайна (куряче просо) та однорічні зимуючі та ярі дводольні бур'яни	Обприскування посівів від фази початок кущення до появи прапорцевого листка. Найкраща фаза злакових бур'янів — 3 листки — початок кущення	0,7–0,9	1/0

СУМІСНІСТЬ: Аксіал® Крос 050 ЕС, КЕ можна змішувати із широким спектром гербіцидів та з більшістю фунгіцидів, інсектицидів, регуляторів росту рослин, добрив, мікроелементів. Для розширення спектра ефективності можна змішувати з флуроксіпіром, іоксинілом, бромоксинілом, флорасуламом, амінопіралідом, клопіралідом, МЦПА.

Аксіал® Крос сумісний із фунгіцидами Амістар® Екстра, Амістар® Тріо, Тілт®, Тілт® Турбо, Альто® Супер, Елатус® Ріа, з інсектицидами Енжіо®, Карате® Зеон, з регулятором росту Моддус®. При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватися рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші. У кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Аксіал® Крос ефективний вже при +5 °С. Оптимальна температура застосування — від +10 °С до +25 °С. Аксіал® Крос менше залежить від впливу складних погодних умов, ніж інші аналогічні гербіциди.

Не рекомендується використовувати препарат, коли рослини перебувають у стресовому стані та при різких коливаннях температури протягом дня. Не рекомендується застосовувати препарат, якщо очікується зниження температури нижче за +5 °С або приморозки. Обробку слід розпочати після встановлення стабільного рекомендованого температурного режиму протягом 2 днів.



РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 200–250 л/га.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: **Аксіал® Крос** нечутливий до ультрафіолетового випромінювання, ефективний в екстремальних сухих умовах, не вимагає вологості ґрунту або сонячного світла для активації. Гербіцид дозволено застосовувати в широкому діапазоні розвитку культур — ВВСН 11–39. Завдяки цій гнучкості його застосовують на ранніх стадіях або в складних ситуаціях аж до пізньої осені при температурі +5 °С. Найкраща дія гербіциду на однорічні дводольні бур'яни проявляється в період їхнього активного росту, коли вони перебувають у фазі 2–4 листки. **Аксіал® Крос** демонструє набагато ефективніший контроль домінуючих однорічних дводольних бур'янів, особливо підмаренника чіпкого і падалиці ріпаку звичайного та ІМІ, порівняно з флорасуламом, застосованим без ад'юванта Адігор. Через 30 хв. після внесення не змивається дощем. Бур'яни зупиняють ріст через 48 год. після обробки, стають хлоротичними, повна їх загибель настає через 1–3 тижні. Гербіцид забезпечує високий рівень активності проти злаків і дводольних бур'янів і при осінньому, і при весняному застосуванні. У більшості випадків рекомендована норма витрати — 0,7 л/га восени. Навесні по перерослих злакових і дводольних бур'янах (більше за 4 листки) норма — 0,9 л/га.

За наявності в посівах важко контрольованих дводольних бур'янів, як-от вероніка (види), фіалка (види), гірчак шорсткий, рутка лікарська, переліска однорічна, петрушка собача, рекомендується замінити **Аксіал® Крос** на суміш **Дербі®** 0,07 кг/га + **Аксіал®** 0,9 л/га або **Пріма™ Форте** 0,5 л/га + **Аксіал®** 0,9 л/га.

СЕЛЕКТИВНІСТЬ: Дозволений до використання на більшості зернових культур. Нефітотоксичний до культури навіть у разі застосування подвійної норми внесення. У разі загибелі з невідомих причин культури, обробленої гербіцидом, дозволяється одразу пересів ярою пшеницею, ярим ячменем, житом або кукурудзою.

КОМЕНТАРІ: Якщо рослини перебувають під впливом стресів навколишнього середовища (температура нижче за +3 °С або приморозки до або після внесення гербіциду), іноді може спостерігатися хлороз на піхвах/усередині окремих листків. Рослини набирають нормального вигляду протягом 1–2 тижнів після появи. Названі симптоми не мають негативного впливу на урожай.

Аксіал® Крос неефективний проти: бромус (усі види) та егілопс циліндричний.





ЛАГІДНИЙ ДО КУЛЬТУРИ, БЕЗЖАЛЬНИЙ ДО БУР'ЯНІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Аксіал® 050 ЕС, к. е.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	50 г/л піноксадену, клоквінтосет–мексил (антидот)
	ХІМІЧНА ГРУПА	Фенілпіразоліни
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Найвища ефективність проти мітлиці, вівсюга, пажитниці, мишію, курячого проса
- ✓ Відмінна толерантність до культури, зокрема до ячменю пивоварного
- ✓ Унікальна поверхнево-активна речовина Адігор у складі препарату забезпечує високу ефективність гербіциду та інших компонентів бакової суміші
- ✓ Не має післядії на культури в сівозміні

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА, ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ, ЯЧМІНЬ ЯРИЙ	Однорічні злакові бур'яни: метлюг звичайний (<i>Apera spicaventi</i> (L.) Pal.), види вівсюга (<i>Avena</i> spp.), види лисохвосту (<i>Alopecurus</i> spp.), види очеретянки (<i>Phalaris</i> spp.), види пажитниці (<i>Lolium</i> spp.), види мишію (<i>Setaria</i> spp.), плоскуха звичайна (куряче просо) (<i>Echinochloa crus-galli</i> L.)	Обприскування посівів від початку кущення до появи прапорцевого листка. Найкраща фаза злакових бур'янів — 3 листки — початок кущення	0,9	1/–

СУМІСНІСТЬ: З метою підсилення дії **Аксіал®** проти однорічних і багаторічних дводольних бур'янів радять використовувати **Пріма™ Форте, Дербі®** в рекомендованих нормах. Крім того, **Аксіал®** безпечно змішувати з гербіцидами на основі амінопіраліду, клопіраліду, флуроксіпіру, іоксинілу, бромксинілу, МЦПА.

У бакових сумішах гербіцид сумісний із більшістю пестицидів. При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватись рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші. У кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність. Для комплексного захисту зернових культур від однорічних злакових і більшості дводольних бур'янів рекомендується **Аксіал®** змішувати з **Дербі®** і **Пріма™ Форте**.

Не рекомендується вносити суміші **Аксіал®** з гербіцидами, які містять трибенурон-метил, йодосульфурон, амідосульфурон, дикамбу та 2,4 Д у повних нормах. Сумісний з фунгіцидами **Амістар® Екстра, Амістар® Тріо, Тілт®, Тілт® Турбо, Альто® Супер, Елатус® Ріа**, інсектицидами **Енжіо®, Карате® Зеон**, регулятором росту **Моддус®** та іншими.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Дощ не впливає на ефективність дії вже через 30 хвилин після внесення гербіциду. **Аксіал®** ефективний при весняному та осінньому застосуванні.

Не рекомендується застосовувати препарат, якщо очікується зниження температури нижче за +5 °С або заморозки. Обробку слід розпочати після встановлення стабільного рекомендованого температурного режиму протягом 2 днів.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: **Аксіал®** ефективний вже при +5 °С. Оптимальна температура застосування — від +10 °С до +25 °С. Не рекомендується використовувати препарат, коли рослини перебувають у стресовому стані та при різких коливаннях температури протягом дня.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 150–200 л/га.

КОМЕНТАРІ: Оптимальна стадія розвитку злакових бур'янів для внесення гербіциду — 3 листки — початок кущення.



Рекомендовано засіб індивідуального захисту
Наприклад:
Повнолицьова маска з фільтром та префільтром 3М
6000 + 3М 6059 (АВЕК1) + 5925 (Р2)



Перед застосуванням уважно прочитайте тарну етикетку



ФАХІВЕЦЬ У ЗАХИСТІ СОНЯШНИКУ Й ОВОЧІВ ВІД БУР'ЯНІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Гезагард® 500 FW, к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	500 г/л прометрину
	ХІМІЧНА ГРУПА	Триазини
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Широкий спектр контролю однорічних злакових і дводольних бур'янів
- ✓ Тривалий захисний період — понад 7–10 тижнів
- ✓ Ідеальний партнер для бакових сумішей
- ✓ Нефитотоксичний до культури при дотриманні регламентів



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
СОНЯШНИК	Однорічні дводольні і злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання або до появи сходів культури	2,0–4,0	1/30
ГОРОХ НА ЗЕРНО		Обприскування ґрунту до появи сходів культури	3,0–5,0	
ГОРОХ ОВОЧЕВИЙ		Обприскування ґрунту до появи сходів або у фазах від 2 до 4 справжніх листків у культурі	2,0	
КОРІАНДР		Обприскування ґрунту до появи сходів культури	3,0–4,0	
КАРТОПЛЯ		Обприскування ґрунту до появи сходів культури	3,0–5,0	
СОЯ		Обприскування ґрунту до появи сходів або у фазах від 2 до 4 справжніх листків у культурі	2,0–3,0	1/45
МОРКВА				

СУМІСНІСТЬ: Гезагард® можна змішувати з іншими загальнозживаними гербіцидами на відповідних культурах. Для повного контролю основних однорічних злакових і дводольних бур'янів Гезагард® рекомендується змішувати з Дуал Голд® на відповідних культурах. На практиці добре себе зарекомендувала комбінація Дуал Голд® + Гезагард® (соняшник, соя, горох, картопля).

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Обприскування проводиться до появи сходів культури по добре підготованому і оптимально зволоженому ґрунту (на моркві й коріандрі обприскування можна проводити також у фазах від 2 до 4 листків у культурі). Норма витрати препарату залежить від забур'яненості та вмісту гумусу в ґрунті. Вищі дози використовують на важких за механічним складом ґрунтах та з великим вмістом гумусу. Залежно від норми витрати і ґрунтово-кліматичних умов захисний період препарату становить від 4 до 12 тижнів. При використанні гербіциду згідно з рекомендаціями обмежень у сівозміні немає. Для запобігання можливого утворення осаду в жорсткій лужній воді рекомендовано додавати пом'якшувачі (підкислювачі) в нормах, рекомендованих для цих препаратів.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО СРОЗЧИНУ: 250–350 л/га.

КОМЕНТАРІ: Окремі однорічні дводольні бур'яни краще контролюються у фазі ранніх сходів. На цю особливість треба зважати, застосовуючи Гезагард®. Не рекомендується застосовувати препарат, якщо очікуються заморозки протягом 2–3 днів.

При приготуванні робочого розчину слід обов'язково враховувати значення водневого показника рН. Якщо рівень рН води, яку використовують для приготування робочого розчину вище за 7, рекомендовано застосовувати спеціальні препарати для підкислення розчину.

У разі недостатньої вологи (або її відсутності) та при сильних вітрах, які можуть знести верхній шар ґрунту разом із препаратом, рекомендовано заробку в ґрунт на глибину 3–5 см. Якщо це зробити неможливо, рекомендується вносити препарат перед посівом, під сівалку.



Рекомендовано засіб індивідуального захисту
Наприклад:
Напівмаска з фільтром та префільтром 3М 7500 +
6051 (A1) + 5925 (P2)









Дербі® 175 SC

ГЕРБІЦИД

ТОТАЛЬНЕ ВИНИЩЕННЯ ПЕРЕРОСЛИХ БУР'ЯНІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Дербі® 175, к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	100 г/л флуметсуламу, 75 г/л флорасуламу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Триазолпіримідини
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	0,5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Неперевершений контроль підмаренника чіпкого навіть у фазі 14 кілець та інших перерослих бур'янів
- ✓ Контролює слабочутливі до сульфонілсечовин дводольні бур'яни: волошку синю, сокирки польові, мак (види), ромашку (види), вику польову, жабрій, гірчак березкоподібний, осоти, лободу
- ✓ Ефективно контролює падалицю ріпаку всі види
- ✓ Відмінний партнер для всіх зернових грамініцидів

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ПШЕНИЦЯ І ЯЧМІНЬ ЯРІ ТА ОЗИМИ	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування під час вегетації від початку куціння до прапорцевого листка культури включно, зокрема авіаметодом	0,05–0,07	1/–

СУМІСНІСТЬ: У бакових сумішах гербіцид **Дербі®** сумісний із більшістю пестицидів. У кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність. Для комплексного контролю однорічних злакових і дводольних бур'янів **Дербі®** рекомендується змішувати з гербіцидом **Аксіал®**.

Безпечно використовувати **Дербі®** в бакових сумішах з фунгіцидами **Амістар® Екстра**, **Амістар® Тріо**, **Тілт®**, **Тілт® Турбо**, **Альто® Супер**, **Елатус® Ріа**, інсектицидами **Енжіо®**, **Карате® Зеон**, регулятором росту **Моддус®** та хлормекват-хлоридом.

Для підсилення контролю важкоконтрольованих і стійких бур'янів:

Дербі® (0,05 л/га) + **Діален Супер®** (0,3 л/га) — для підсилення ефективної дії проти лободи білої

Дербі® (0,07 л/га) + ПАР або сульфат амонію — для підсилення ефективної дії проти лободи білої

Дербі® (0,07 л/га) + **Логран®** (10 г/га) + ПАР — для підсилення контролю зимуючих видів, молочаю, фіалки польової, кропиви та падалиці ІМІ-ріпаку

Дербі® (0,07 л/га) + **Пік®** (8–10 г/га) + ПАР — для підсилення контролю видів герані, амброзії та падалиці соняшнику всіх видів (2–3 хвили сходів)

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Ефективний контроль перерослих дводольних бур'янів, слабочутливих до сульфонілсечовин. Вищу із зареєстрованих норм препарату застосовувати в таких випадках: у пізніх фазах розвитку та/або для контролю розвиненіших рослин чутливих бур'янів (> 8 листків); за наявності в посівах багаторічних бур'янів; за умови дуже зріджених посівів; за несприятливих погодних умов перед і після обприскування.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: **Дербі®** ефективний уже при +5 °С, але треба зазначити, що швидкість дії сповільнюється порівняно з оптимальними умовами для внесення +12...25 °С. Оптимальна температура застосування — від +8 °С до +25 °С. Заморозки після застосування **Дербі®** суттєво не впливають на ефективність препарату. Перші візуальні симптоми дії препарату проявляться на 15–20 день після внесення. Не рекомендується використовувати препарат, коли рослини перебувають у стресовому стані та при різких коливаннях температури протягом дня.







РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 150–200 л/га при наземному обприскуванні та від 50 л/га при авіаобробці.




Діален Супер®

СТОП БАГАТОРІЧНИМ БУР'ЯНАМ!

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Діален Супер® 464 SL, в. р. к.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	120 г/л дикамби, 344 г/л 2,4-Д диметиламінної солі
	ХІМІЧНА ГРУПА	Похідні бензойної й арилоксиалканкарбонової кислот
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Водорозчинний концентрат
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	10 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Контролює біля 200 видів дводольних бур'янів, у тому числі багаторічні та стійкі до 2,4-Д
- ✓ Очищення полів від осотів під наступні культури сівозміни
- ✓ Запобігає виникненню резистентності до препаратів із групи сульфонілсечовин
- ✓ Ідеальний партнер для бакових сумішей



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА	Однорічні і багаторічні дводольні бур'яни, у тому числі стійкі до 2,4-Д і МЦПА	Обприскування під час вегетації від початку куцїння до виходу в трубку культури	0,8	1/-
ПШЕНИЦЯ І ЯЧМІНЬ ЯРІ			0,5-0,7	
КУКУРУДЗА			3-5 листків у культури	

СУМІСНІСТЬ: Діален Супер® у бакових сумішах сумісний із більшістю пестицидів. Можна змішувати із загальноживаними фунгіцидами, інсектицидами й гербіцидами на зернових колосових культурах. При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватись рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші. З метою підсилити дію проти багаторічних дводольних бур'янів Діален Супер® рекомендується додавати до Ураган Форте® на парах і землях несільськогосподарського призначення, з Мілагро® — на кукурудзі, з гербіцидом Пік® — на кукурудзі й зернових. На площах під посів овочевих культур не рекомендується вносити Діален Супер® пізно восени або перед посівом.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Обприскування посівів зернових колосових культур рекомендується проводити навесні у фазі від початку до другого міжвузля, посівів кукурудзи — у фазі 3-5 листків культури. Максимальна ефективність від застосування гербіциду досягається на ранніх фазах розвитку бур'янів: однорічні у фазі 2-4 листки, а багаторічні у фазі розетки діаметром до 5 см.

Діален Супер® 464 SL в. р. к. вигідно відрізняється від низки гербіцидів своєю унікальною здатністю ефективно контролювати найбільш шкочинні коренепаросткові багаторічні види бур'янів, як-от осоти, будяки, березка польова й інші, що сприяє очищенню полів від багаторічних бур'янів під наступні культури в сівозміні.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Оптимальна температура застосування — від +12 °С до +25 °С.

При різких змінах температури протягом доби слід орієнтуватися на найнижчий показник. Не використовувати гербіцид у спекотну погоду. Посіви обробляти тільки в рекомендовані фази розвитку культурних рослин.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 150-200 л/га. Норма витрати робочої рідини має бути достатньою для змочування всієї листової поверхні бур'яну. При цьому не можна допускати стикання робочого розчину з поверхні листка.









Рекомендовано засіб індивідуального захисту
Наприклад:
Повнолицьова маска з фільтром та предфільтром 3М
6000 + 3М 6059 (АВЕК1) + 5925 (P2)



Дуал Голд®

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАХИСНИК НА ВАРТІ ВАШИХ ПОСІВІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Дуал Голд® 960 ЕС, к. е.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	960 г/л S-метолахлору
	ХІМІЧНА ГРУПА	Хлорацетаміди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Надзвичайно тривалий захисний період (10–12 тижнів)
- ✓ Ідеальний партнер для бакових сумішей
- ✓ Найменш фітотоксичний до культури серед усієї групи хлорацетамідів
- ✓ Застосовується на багатьох культурах

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	
БУРЯКИ ЦУКРОВІ, СОНЯШНИК, СОЯ	Однорічні злакові й деякі дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури	1,2–1,6	
КУКУРУДЗА, РІПАК ЯРИЙ І ОЗИМИЙ		Обприскування ґрунту після висадки, але до появи сходів культури	1,6	
КАРТОПЛЯ		Обприскування ґрунту до висадки розсади		
ТОМАТИ (РОЗСАДА)		Обприскування ґрунту до посіву або до появи сходів культури	1,2	
КАПУСТА (РОЗСАДА)		Обприскування ґрунту до посіву, під час посіву, після посіву, але до появи сходів культури		
ГОРОХ		Обприскування ґрунту до висадки розсади	1,3–1,6	
ТОМАТИ (БЕЗРОЗСАДНІ)		Обприскування ґрунту після обрізки головних кореневищ, але до появи сходів культури	1,6–2,0	
ТЮТЮН		Обприскування ґрунту до посіву або до появи сходів культури	1,6	
ХМІЛЬ		Обприскування ґрунту до посіву або до появи сходів культури	Обприскування ґрунту до посіву або до появи сходів культури	1,6–2,0
КАВУНИ				1,6–2,0
СОРГО (обов'язкова обробка насіння антидотом)				

СУМІСНІСТЬ: Щоб розширити спектр контролю дводольних бур'янів, **Дуал Голд®** рекомендується змішувати з іншими гербіцидами на відповідних культурах. Нині широко використовують комбінацію **Дуал Голд®** + **Гезагард®** (соняшник, соя, горох, картопля), **Дуал Голд®** + препарати на основі ленацилу, хлоридазону та метамітрону (цукрові буряки), **Дуал Голд®** + препарати на основі кломазону (ріпак). Не рекомендується застосовувати суміш **Дуал Голд®** + кломазон, якщо очікуються приморозки протягом 2–3 днів.







РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 300–350 л/га. У разі недостатньої вологи (або її відсутності) та при сильних вітрах, які можуть знести верхній шар ґрунту разом із препаратом, рекомендовано заробку в ґрунт на глибину 3–5 см. Якщо це зробити неможливо, рекомендується вносити препарат перед посівом, під сівалку.





ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ КУКУРУДЗИ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Каллісто® 480 SC, к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	480 г/л мезотріону
	ХІМІЧНА ГРУПА	Трикетони
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Контролює бур'яни, стійкі до інших гербіцидів (наприклад, паслін чорний)
- ✓ Ідеальний партнер для бакових сумішей з іншими гербіцидами
- ✓ Попереджує виникнення резистентності до препаратів із групи сульфонілсечовин
- ✓ Попереджує появу кількох наступних хвиль бур'янів завдяки ґрунтовій дії
- ✓ Може використовуватися на різних стадіях розвитку культури і бур'янів



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га
КУКУРУДЗА	Однорічні й окремі багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазах від 3 до 8 листків кукурудзи включно	0,2 + ПАР* (обов'язково)
МАК	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазах від 2–4 листків культури	0,2 + ПАР* (обов'язково)

* Додавання поверхнево-активних речовин (ПАР) не менш як 0,1 % до норми робочого розчину.

СУМІСНІСТЬ: Може застосовуватися самостійно і в бакових сумішах, наприклад зі страховими гербіцидами (**Мілагро®**, **Пік®**). Не рекомендується застосовувати інсектициди на основі фосфорорганічних сполук та тіокарбаматів за 7 днів до або після застосування гербіциду **Каллісто®**. Не застосовувати на посівах кукурудзи, насіння якої оброблено інсектицидами на основі фосфорорганічних сполук.

Не рекомендується змішувати з мікроелементами, зокрема з цинком у будь-якій формі.

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СІВОЗМІНИ: При потребі пересіву кукурудзи, обробленої гербіцидом **Каллісто®** (посуха, приморозки, вимокання), кукурудзу можна висівати одразу. Восени того самого року можна висівати озимі ячмінь і пшеницю, райграс, а також озимий ріпак, якщо було проведено оранку. Наступної весни після оранки можна висівати соняшник, сою, сорго, ріпак, люцерну. Чутливі культури, як-от буряки (цукрові, столові, кормові), горох, можна висівати через 18 місяців після застосування препарату **Каллісто®**.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Оптимальна температура застосування — від +12 °С до +25 °С.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 150–200 л/га.



Рекомендовано засіб індивідуального захисту
Наприклад:
Напівмаска з фільтрами 3М 7500 + 3М 6051 (A1) +
5935 (P3)




КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ПРОТИ БУР'ЯНІВ У КУКУРУДЗИ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Елюміс® 105 OD, МД
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	30 г/л нікосульфурону, 75 г/л мезотріону
	ХІМІЧНА ГРУПА	Сульфонілсечовини, трикетони
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Масляна дисперсія
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	20 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Широке вікно застосування — 2–8 (10) листків культури
- ✓ Повний контроль широкого спектра однорічних і багаторічних злакових та дводольних бур'янів
- ✓ Контроль ваточника сирійського
- ✓ Попереджує появу кількох наступних хвиль дводольних бур'янів завдяки ґрунтовій дії
- ✓ Відсутність фітотоксичності на культуру навіть за умови пізнього внесення
- ✓ Покращена формуляція — не потребує додавання сурфактантів

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га
КУКУРУДЗА	Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування під час вегетації у фази від 2 до 8 листків культури включно	1,25–2,0*

* Максимальну норму внесення слід застосовувати в разі масової появи багаторічних і перерослих бур'янів.

СУМІСНІСТЬ: Не застосовувати з мікроелементами, зокрема з цинком у будь-якій формі. Не рекомендовано змішувати з інсектицидами на основі фосфорорганічних сполук.

Також не застосовувати на посівах кукурудзи, насіння якої оброблено інсектицидами на основі фосфорорганічних сполук та тіокарбаматів.

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СІВОЗМІНИ: Наступного року після застосування препарату **Елюміс®** не рекомендується вирощувати цукровий буряк, горох, нут і овочі. Сою, соняшник та ріпак рекомендовано висівати після оранки. Кукурудзу, сорго, пшеницю, ячмінь — без обмежень.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 150–250 л/га.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Оптимальна температура застосування — від +12 °C до +25 °C.

КОМЕНТАРІ: Поєднання двох діючих речовин забезпечує контроль найпроблемніших бур'янів, як-от пирій, щавель кінський, гірчак (види), осоти (види). Норма внесення залежить від розвитку бур'янів.

2–4 листки — 1,5 л/га, 6–8 листків — 1,75 л/га. Перерослі бур'яни — 2,0 л/га. У разі масової появи багаторічних злакових і дводольних бур'янів норма використання повинна бути максимальною.



Про Елюміс®

ВОЛОДИМИР МАКСИМОВИЧ

Технічний менеджер з підтримки гербіцидів на кукурудзі й соняшнику, компанія «Сингента»

Розгляньмо, коли й навіщо застосовувати **Елюміс®**.







Насамперед ми рекомендуємо **Елюміс®** для полів із комплексною забур'яненістю, де домінують багаторічні бур'яни. Це стосується не тільки багаторічних злакових, а й багаторічних дводольних. Крім того, **Елюміс®** як комплексне рішення має найширше на ринку вікно застосування на культурі і здатність контролювати перерослі бур'яни в той період, коли інші гербіциди вже не можна застосовувати (після 8 листків культури). За рахунок мезотріону препарат здатний контролювати і такий дуже поширений нині бур'ян як ваточник сирійський (*Asclepias siriaca L.*). Загроза поширення цього бур'яну останнім часом дуже висока не тільки на кукурудзі і не тільки в східних областях України. За рахунок потужної ґрунтової дії **Елюміс®** здатний контролювати кілька наступних хвиль бур'янів, зокрема падалицю соняшнику (звичайного, ІМІ- і сульфостійкого).





ГЕРБИЦИД ДЛЯ CLEARFIELD® СОНЯШНИКУ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Каптора®, РК
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	33 г/л імазамоксу, 15 г/л імазапіру
	ХІМІЧНА ГРУПА	Імідазоліони
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Розчинний концентрат
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	20 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- Захист соняшнику від усіх рас вовчка
- Надійний захист від бур'янів, у тому числі на проблемних площах
- Широкий спектр дії
- Контроль наступних хвиль бур'янів (ґрунтова дія)

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га
СОНЯШНИК*	Однодольні і дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 4 справжні листки у культури	1,0–1,2

СУМІСНІСТЬ: Не рекомендується застосовувати в баковій суміші з іншими гербицидами (високоєфективний препарат), інсектицидами з групи ФОС та мінеральними добривами.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Каптора® слід застосовувати тільки на сортах і гібридах соняшнику системи виробництва Clearfield® на початкових стадіях розвитку бур'янів. Не рекомендується застосовувати препарат, коли рослини соняшнику перебувають у стресовому стані від впливу чинників навколишнього середовища (низькі або, навпаки, високі температури, сильна посуха, надмірна вологість тощо). Не рекомендується застосовувати гербицид Каптора® при температурі нижче за +10...12 °С та вище за +25 °С.

ОРГАНІЗАЦІЯ СІВОЗМІНИ: Препарати з групи імідазоліонів не можна використовувати на одному полі частіше, ніж один раз на три роки. Після застосування препарату слід дотримуватися такої сівозміни:

- без обмежень — сорти чи гібриди соняшнику, ріпаку, кукурудзи, стійкі до гербицидів з групи імідазоліонів;
- через 4 місяці — пшениця, жито;
- через 9 місяців** — кукурудза, ячмінь***, овес, рис, соняшник, соя, горох, боби, сорго;
- через 18 місяців — овочі, картопля;
- через 24 місяці — цукровий і кормовий буряк, ріпак, гречка, просо.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Оптимальна температура для застосування — від +14 °С до +25 °С.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО

РОЗЧИНУ: 200–400 л/га. За наявності великої кількості рослинних решток на ґрунті витрата робочого розчину має бути не менше як 250 л/га. Найефективніше застосовувати, коли більшість бур'янів перебуває на початкових фазах розвитку.

КОМЕНТАРІ: В окремих випадках після застосування препарату спостерігається зменшення висоти та/або зміна кольору рослин, особливо якщо рослини соняшнику перебувають під впливом стресів навколишнього середовища (низькі температури, сильна посуха, надмірна вологість). Як правило, рослини набирають нормального вигляду й росту протягом 1–2 тижнів.

Каптора® — надійний партнер для Clearfield® гібридів

ВИСОКООЛЕЇНОВІ CLEARFIELD® ГІБРИДИ



Копомбі



Таленто



СИ Експерто

CLEARFIELD® ГІБРИДИ



СИ Барбаті









НК Неома



ОНОВЛЕНА ІСТОРІЯ УСПІХУ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Каптора® Плюс, РК
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	16,5 г/л імазамоксу, 7,5 г/л імазапіру
	ХІМІЧНА ГРУПА	Імідазоліони
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Розчинний концентрат
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	10 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Надійний захист від вовчка і бур'янів
- ✓ Посилений контроль осотів, амброзії, нетреби та злакових бур'янів
- ✓ Широке вікно застосування (від 2-го до 8-го листка)
- ✓ Контроль наступних хвиль бур'янів (ґрунтова дія)
- ✓ Можливість застосовувати в системах з енергоощадною технологією обробки ґрунту

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
СОНЯШНИК (ГІБРИДИ, СТІЙКІ ДО КАПТОРА® ПЛЮС)	Однодольні і дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі від 2 до 8 справжніх листків у культури (на початкових фазах розвитку бур'янів)	1,6–2,5	1/не встановлюється

СУМІСНІСТЬ: Застосування в бакових сумішах з іншими гербіцидами недоцільне (високоєфективний препарат). Препарат може бути використано в бакових сумішах з багатьма іншими засобами захисту, але перед застосуванням слід обов'язково перевірити препарати на сумісність.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Каптора® Плюс слід застосовувати винятково на гібридах соняшнику, призначених для виробничої системи **Clearfield® Plus**. Найефективніше застосовувати, коли більшість бур'янів перебуває на початкових фазах розвитку. Не порушувати температурний режим при застосуванні та не застосовувати гербіцид, коли рослини соняшнику перебувають у стресовому стані під впливом абіотичних чинників (низькі або, навпаки, високі температури, надмірна вологість ґрунту тощо).

Норма застосування гербіциду:

1,6 л/га — однорічні дводольні до 2-х листків.

2,0 л/га — однорічні дводольні (2–4 листки), в т. ч. амброзія полинолиста, лобода біла, нетреба звичайна, однорічні злакові та вовчок соняшниковий.

2,5 л/га — однорічні перерослі, багаторічні дводольні (осоти, березка) до 6 листків у бур'янів.

Стадії культури:

2–4 листки у культури — однорічні злакові, однорічні і багаторічні дводольні бур'яни, вовчок соняшниковий.

6–8 листків у культури — іноді в разі пізніх посівів або при пізній появі вовчка соняшникового (всі раси).

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРЕПАРАТ:

- потребує рівномірного внесення по всій площі (перекриття проходів обприскувача треба звести до мінімуму);
- не допускається знесення робочої рідини на сусідні поля.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Норма витрати робочої рідини — 200–400 л/га.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Від +14 °C до +25 °C.

ОРГАНІЗАЦІЯ СІВОЗМІНИ: Препарати з групи імідазоліонів не повинні використовуватися на одному полі частіше, ніж один раз на три роки.



Восени (в рік застосування, ~через 4 місяці)	Навесні (наступного року, ~через 9 місяців)	Восени (наступного року, ~через 15 місяців)	Навесні (~через 22–24 місяці після застосування)
Пшениця озима** Жито озиме**	Пшениця яра Соя Горох Боби Кукурудза* Овес* Рис* Сорго* Ячмінь ярий**	Пшениця озима Жито озиме Ячмінь озимий	Буряки цукрові і кормові Ріпак ярий Гречка Просо Льон Овочі Інші культури


* Коли рН ґрунту вище за 6,2 і сума опадів більша, ніж 200 мм.

** При сумі опадів менше за 200 мм і рН нижче за 6,2 існує небезпека прояву фітотоксичності, негативні наслідки якої можна знизити за рахунок механічного обробітку ґрунту на глибину не менше як 15 см.

ВІДСУТНІСТЬ ВИДИМОГО ТОКСИЧНОГО ПРОЯВУ



До внесення



Після внесення

Clearfield® Plus гібриди, стійкі до Каптора® Плюс

ВИСОКООЛЕЇНОВІ CLEARFIELD® PLUS ГІБРИДИ

 СИ Флавіо КЛП **NEW**

CLEARFIELD® PLUS ГІБРИДИ

 СИ Розета КЛП

 СИ Мічіган КЛП **NEW**

 СИ Бакарді КЛП




ПОТУЖНА І ШВИДКА ДІЯ ПРОТИ БУР'ЯНІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Лінтур® 70 WG, в. г.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	41 г/кг триасульфурону, 659 г/кг дикамби у формі солі натрію
	ХІМІЧНА ГРУПА	Сульфонілсечовини, похідні бензойної кислоти
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Вододисперсні гранули
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	1 кг

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Контроль широкого спектра однорічних і багаторічних дводольних бур'янів, у тому числі стійких до 2,4-Д
- ✓ Знищує надземну частину і кореневища багаторічних бур'янів
- ✓ Стандарт у захисті газонних трав від комплексу дводольних бур'янів
- ✓ Діє швидше й ефективніше за рахунок поєднання двох діючих речовин
- ✓ Не має обмежень для наступних культур у сівозміні

**ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ**

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, кг/га	Кратність обробок / Термін очікування
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА	Однорічні і багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування під час вегетації від фази 4 листки до кінця кущіння культури включно	0,15–0,18	1/–
ЯЧМІНЬ ЯРИЙ		Обприскування під час вегетації від фази 3 листки до кінця кущіння культури	0,12–0,15	
ГАЗОННІ ТРАВИ		Обприскування у фазі кущіння газонних трав		

СУМІСНІСТЬ: Лінтур® можна змішувати з іншими загальнозживаними пестицидами на відповідних культурах.

Не рекомендується змішувати з регуляторами росту.

При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватись рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 150–200 л/га.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Уникати застосовувати препарат одразу після заморозків або в очікуванні заморозків у ніч після обробки. Не застосовувати препарат на посівах, які перебувають у стресовому стані (наприклад, під час посухи, надмірного зволоження ґрунту, при пошкодженні приморозками, шкідниками, хворобами тощо).

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Оптимальна температура застосування — від +10 °С до +25 °С.



Рекомендовано засіб індивідуального захисту







Наприклад:
Респіратор протиаерозольний 3М VFlex9161 (FFP1) або
3М AURA 9312+ або 8812



Перед застосуванням уважно прочитайте тарну етикетку

ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИ НИЗЬКИХ ЗАТРАТАХ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Логран® 75 WG, в. г.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	750 г/л триасульфурону
	ХІМІЧНА ГРУПА	Сульфонілсечовини
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Вододисперсні гранули
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	120 г



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Ефективний проти домінуючих однорічних дводольних бур'янів, у т. ч. стійких до групи 2,4-Д та 2М-4Х
- ✓ Контроль широкого спектра зимуючих бур'янів, в т. ч. кропиви, фіалки, вероники, сокирок, підмаренника
- ✓ Має ґрунтову дію, яка забезпечує захист посівів від бур'янів, що проростають з насіння після обробки
- ✓ Оптимальний гербіцид для осіннього застосування



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, г/га	Кратність обробок / Термін очікування
ОЗИМА І ЯРА ПШЕНИЦЯ, ЯРИЙ ЯЧМІНЬ	Однорідні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА, та деякі багаторічні дводольні	Обприскування посівів у фазі від 2-3 листків до прапорцевого листка включно	6,5-10	1/термін очікування не встановлюється

РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ: Логран® може діяти не тільки на бур'яни, які проросли, а й на проростаючі — за рахунок ґрунтової дії. Це особливо важливо для захисту посівів в осінній період. Для комплексного знищення однорічних та багаторічних бур'янів високу ефективність має суміш Логран® 6,5-10,0 г/га + Пік® 8,0-10,0 г/га. Для підсилення ефективності проти багаторічних коренепарасткових бур'янів рекомендується використовувати бакову суміш гербіцидів Логран® і Діален Супер® у такій пропорції: 6,5-10 г/га Логран® + Діален Супер® 0,5 л/га.

Бакова суміш гербіцидів Логран® 6,5-10 г/га + Пік® 8-10 г/га ідеальна для застосування на зернових восени:

- Логран® і Пік® ефективні при низьких температурах — від +5 °С
- Контролюють широкий спектр зимуючих бур'янів
- Не впливають на морозостійкість культурних рослин
- Ґрунтова активність стримує проростання нових сходів бур'янів, зокрема навесні
- При осінньому застосуванні через сезон відсутня будь-яка післядія на культурі в сівозміні

СУМІСНІСТЬ: Логран® у бакових сумішах сумісний із більшістю пестицидів. Можна змішувати із загальноживими фунгіцидами, інсектицидами й гербіцидами на зернових колосових культурах. Слід дотримуватися рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Логран® рекомендується вносити при температурі +5 °С і вище. Найкращі результати досягаються при температурі +10...25 °С.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 150-200 л/га.

КОМЕНТАРІ: У разі потреби пересіву висівати тільки озиму, яру пшеницю, ячмінь і кукурудзу. Озимий ріпак після зернових можна висівати в цей самий рік. На наступний рік можна сіяти всі культури без обмежень. Не рекомендується застосовувати Логран® на щойно провапнованих ґрунтах або з рН понад 7,5; на зернових із підсівом багаторічних і бобових трав.



Рекомендовано засіб індивідуального захисту
Наприклад:
Повнолицьова маска з фільтром та предфільтром
ЗМ 6000 + ЗМ 6059 (АВЕК1) + 5925 (P2)









Лонтрел™ ГРАНД

ГЕРБИЦИД

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗАХИСТУ ВІД ОСОТІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Лонтрел™ Гранд, в. г.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	750 г/кг клопіраліду
	ХІМІЧНА ГРУПА	Похідні піридинкарбонової кислоти
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Водорозчинні гранули
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	2 кг



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Відмінний контроль усіх видів осотів разом із кореневою системою
- ✓ Очищення полів від осотів під наступні культури сівозміни
- ✓ Ідеальний партнер для бакових сумішей (особливо з препаратами на основі фенмедифаму і десмедифаму) на цукрових буряках
- ✓ Легко дозується і зберігається
- ✓ Знищення всіх бур'янів родини складноцвітів

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, кг/га
БУРЯКИ ЦУКРОВІ, КУКУРУДЗА, КАПУСТА	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни, падалиця соняшнику	Обприскування вегетуючих бур'янів у фазі розетки (висота осотів — 15–20 см) від фази 2-х листків культури	0,2
РІПАК ОЗИМИЙ І ЯРИЙ	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 6–8 листків в однорічних бур'янів; у фазі розетки — початку формування генеративного пагона 2–8 см (проти осотів)	0,12–0,2
ЛЬОН-ДОВГУНЕЦЬ (НА ТЕХНІЧНІ ЦІЛІ)		Обприскування у фазі «ялинки» культури	0,04–0,12
ЗЕРНОВІ ЗЛАКОВІ КУЛЬТУРИ	Однорічні дводольні, у тому числі стійкі до 2,4-Д, та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування від фази куштиння до виходу в трубку культури	0,12
ЧАСНИК, ЦИБУЛЯ (КРИМ НА ПЕРО)	Однорічні дводольні, у тому числі стійкі до 2,4-Д, та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів у фазі розетки (висота осотів — 15–20 см) від фази 2-х листків культури	0,1–0,16







СУМІСНІСТЬ: Можна змішувати з фунгіцидами, інсектицидами, рідкими добривами. На цукровому буряку для контролю осотів рекомендуються суміші з препаратами на основі фенмедифаму та десмедифаму.


ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Оптимальна температура застосування — від +10 °С до +25 °С.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 150–200 л/га.

КОМЕНТАРІ: На цукрових буряках гербицид краще вносити разом з препаратами на основі фенмедифаму та десмедифаму під час другої обробки.

НАЙБЕЗПЕЧНІШИЙ ГРАМІНІЦИД ДЛЯ КУКУРУДЗИ
ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Milaagro® 040 SC, к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	40 г/л нікосульфурону
	ХІМІЧНА ГРУПА	Сульфонілсечовини
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л


ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Найбільш селективний до культури серед усіх відомих сульфонілсечовин (фаза внесення — від 3 до 10 листків культури включно)
- ✓ Знищує всі злакові бур'яни разом з кореневою системою, включаючи багаторічні, у тому числі пирій повзучий і гумай
- ✓ Високоєфективний навіть в умовах посухи
- ✓ Чудовий партнер для гербіцидів проти дводольних бур'янів
- ✓ Не має післядії на наступні культури у сівозміні


ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га
КУКУРУДЗА	Однорічні та багаторічні злакові (гумай, пирій) і найпоширеніші однорічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фази від 3 до 10 листків культури включно	1,0–1,25

СУМІСНІСТЬ: Застосовується як самостійно, так і в бакових сумішах з гербіцидами **Пік®**, **Діален Супер®**, **Каллісто®**, **Пріма™ Форте**.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 100–150 л/га.

КОМЕНТАРІ: Не використовувати **Milaagro®** при температурах нижче за +8 °С і вище за +25 °С. Фосфорорганічні інсектициди використовувати за 7 днів до або через 4 дні після внесення **Milaagro®**.



Ефективність препарату



Люмакс®



ВІДМІННИЙ ВИБІР ДЛЯ ДОСХОДОВОГО І ПІСЛЯСХОДОВОГО КОНТРОЛЮ БУР'ЯНІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Люмакс® 537,5 SE, с. е.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	375 г/л S-метолахлору, 125 г/л тербутилазину, 37,5 г/л мезотріону
	ХІМІЧНА ГРУПА	Хлорацетаміди, триазини, трикетони
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Суспензійна емульсія
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	20 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Можна використовувати як ґрунтовий і страховий гербіцид одночасно (до фази 5 листків кукурудзи)
- ✓ Контроль нетреби звичайної, амброзії полинолистої та багаторічних дводольних бур'янів (по вегетації)
- ✓ Можна застосовувати в нестабільних кліматичних умовах
- ✓ Високоєфективний проти бур'янів, стійких до інших препаратів
- ✓ Оптимальний для використання за No-Till та Stripe-Till технологіями
- ✓ Оптимальний вибір при вирощуванні ділянок гібридизації кукурудзи
- ✓ Пролонгований контроль бур'янів (протягом 10 тижнів)



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га
КУКУРУДЗА	Однорічні злакові і дводольні та деякі багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування до посіву, після посіву, по сходах (3–5 листків у культури)	3,5–4,0
ЯБЛУНЯ, ВІНОГРАДНИКИ		Обприскування ґрунту до появи сходів бур'янів або у фазах 1–2 листки у злакових та 2–4 листки у дводольних	

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СІВОЗМІНИ: При потребі пересіву кукурудзи, обробленої гербіцидом **Люмакс®** (засуха, заморозки, вимокання), кукурудзу можна висівати одразу. Восени того самого року можна висівати озимі ячмінь і пшеницю, райграс, а також озимий ріпак, якщо було проведено оранку. Наступної весни після оранки можна висівати соняшник, сою, сорго, ріпак, люцерну. Чутливі культури, як-от буряки (цукрові, столові, кормові), горох, можна висівати через 18 місяців після застосування препарату **Люмакс®**.

СУМІСНІСТЬ: В окремих випадках (наприклад, у саду) може використовуватися в сумішах із посходовими гербіцидами (**Реглон® Супер**, **Фюзілад Форте®**). На кукурудзі не рекомендується застосовувати інсектициди на основі фосфорорганічних сполук та тіокарбаматів за 7 днів до або після застосування гербіциду **Люмакс®**, а також не застосовувати на посівах кукурудзи, насіння якої оброблено інсектицидами на основі фосфорорганічних сполук та тіокарбаматів.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 300–350 л/га.

КОМЕНТАРІ: Кукурудза. При ранньопіслясходовому внесенні стадія розвитку однорічних злакових бур'янів має бути 1–2 листки, дводольних — 2–4 листки. Можна вносити по сходах культури. При ґрунтовому внесенні в разі недостатньої вологості рекомендовано заробку в ґрунт на глибину 3–5 см. Якщо протягом 2–3 днів очікуються приморозки, слід утриматися від обробки препаратом.

Яблуня, виноградники. Обмежити потрапляння препарату на культуру. Обмежити використання препарату на зрошуваних легких ґрунтах (через можливе промивання діючої речовини в зону коренів).



Про Люмакс®

ВОЛОДИМИР МАКСИМОВИЧ

Технічний менеджер з підтримки гербіцидів на кукурудзі й соняшнику, компанія «Сингента»

Спробуймо розібратися, навіщо нам із вами **Люмакс®**. Ні для кого не секрет, що ранній контроль бур'янів — запорука збереження високого потенціалу гібридів, але чому саме **Люмакс®**?

Як правильно і коли його застосовувати

- ✓ Якщо посіви не містять багаторічних злакових бур'янів
- ✓ Якщо в господарстві великі площі вирощування кукурудзи, але мало техніки для їх вчасної обробки
- ✓ Якщо після появи сходів кукурудзи прогнозується тривала волога погода
- ✓ Чудовий вибір для ділянок гібридизації

Компанія «Сингента» рекомендує вносити препарат ранньопіслясходово, і цей термін означає стадію розвитку не культури, а саме бур'янів. Найкращий період для застосування **Люмакс®** — коли на полі є сходи кукурудзи і невеличка щіточка однорічних злакових бур'янів у фазі «шильця». На стадію розвитку дводольних бур'янів навіть не дивимося, головне — стадія однорічних злакових.

Люмакс® завдяки мезотріону має ще й потужну ґрунтову дію, і після його внесення характерна ознака — чорне поле — аж до збирання.





ВЕРШИНА ЗАХИСТУ ПОСІВІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Пік® 75 WG, ВГ
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	750 г/кг просульфурону
	ХІМІЧНА ГРУПА	Сульфонілсечовини
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Гранули, що диспергуються у воді
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	0,1 кг



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Високоєфективний проти більшості дводольних бур'янів, у тому числі падалиці соняшнику і ріпаку, гірчаків, нетреби звичайної та осотів
- ✓ Тривалий період застосування — до прапорцевого листка на зернових і 8-го листка у кукурудзи
- ✓ Контролює другу хвилю бур'янів, падалицю соняшнику, амброзію й інші види бур'янів
- ✓ Оптимальний гербіцид для осіннього застосування

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, кг/га	Кратність обробок / Термін очікування
ПШЕНИЦЯ ЯРА	Однорідні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА, та деякі багаторічні дводольні	Обприскування посівів у фазі від 2–3 листків до прапорцевого листка включно	0,015–0,02	1/термін очікування не встановлюється
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни, в т. ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА	Від 3-х листків до прапорцевого листка культури включно		1/-
ЯЧМІНЬ		Від фази куцїння до прапорцевого листка культури		
КУКУРУДЗА		3–8 листків культури		
СОРГО		3–6 листків культури		
ПРОСО		Від куцїння до фази виходу культури в трубку		
ЛЬОН		У фазі «ялинки»		
РИС	Дводольні й широколисті болотні бур'яни	3–4 листки культури		

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: У посівах озимої пшениці й кукурудзи рекомендується застосовувати з нормою витрати 8–10 (15) г/га. У посівах кукурудзи гербіцид не рекомендується застосовувати до фази 3 листки.

СУМІСНІСТЬ: Для контролю ширшого спектра дводольних бур'янів на зернових культурах, кукурудзі й сорго Пік® можна змішувати з іншими гербіцидами, як-от Мілагро®, Діален Супер®, Дербі®, Пік®, Логран®, з інсектицидами, регуляторами росту й фунгіцидами.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СІВОЗМІНИ: У рік застосування препарату допускається пересівання зерновими (пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, просо) і льоном. Овочеві культури, цукровий буряк, соняшник, гірчицю, ріпак і фацелію висівати не раніше, ніж через 18 місяців після застосування. Для зниження ризику появи післядії, особливо на ґрунтах з рН > 7, бажано використовувати гербіцид у суміші з препаратом Дербі® та Пік®, знизивши норму витрати Пік® удвічі.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Ефективний уже при +5 °С. Оптимальна температура застосування — від +10 °С до +25 °С.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 150–200 л/га.



Пріма™ ФОРТЕ


ГЕРБІЦИД



ПЕРША СЕРЕД КРАЦИХ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Пріма™ Форте 195, с. е.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	5 г/л флорасуламу, 10 г/л амінопіраліду, 180 г/л 2,4-Д у формі етилгексилевого ефіру в кислотному еквіваленті
	ХІМІЧНА ГРУПА	Триазолпіримідини, похідні піридинкарбонової кислоти, похідні арилоксиалканкарбонової кислоти
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Суспензійна емульсія
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Середньотоксичний Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л

**ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ**

- ✓ Надійне й зручне рішення для тривалого контролю бур'янів, особливо падалиці соняшнику (+ сульфо-, ІМІ-), амброзії, видів осоту, сокирок, гірчаків, маку, лободи
- ✓ Відмінна толерантність до культури незалежно від температурних режимів
- ✓ Стабільна ефективність у складних погодних умовах
- ✓ Гармонійний синергізм системних діючих речовин забезпечує надійний контроль резистентних видів бур'янів

**ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ**

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування	Терміни виходу
ОЗИМА ПШЕНИЦЯ, ЯРИЙ ЯЧМІНЬ, КУКУРУДЗА (Дозволено до використання в європейських країнах: ячмінь озимий, пшениця яра, овес, жито, просо, сорго)	Однорічні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д, МЦПА, та окремі багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 2-4 листки однорічних та у фазі розетки багаторічних дводольних бур'янів до утворення 2-го міжвузля зернових та від 3 до 5 листків кукурудзи і сорго до початку виходу в трубку проса	0,5 л/га	- (1)	3 дні / -
	Однорічні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д, МЦПА, та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 6-8 листків однорічних та 10-15 см багаторічних дводольних бур'янів до утворення 2-го міжвузля зернових, від 3 до 5 листка кукурудзи і сорго до початку виходу в трубку проса	0,7 л/га		

СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний із фунгіцидами, інсектицидами, протидвродольними гербіцидами, рідкими азотними добривами та регуляторами росту рослин. Для комплексного захисту зернових культур від однорічних злакових рекомендується використовувати **Пріма™ Форте** з **Аксіал®**. При використанні препаратів у бакових сумішах слід також враховувати регламенти застосування іншого(-их) препарату(-ів), що додає(ю)ться до суміші (термін застосування, культури тощо). Перед приготуванням робочої суміші рекомендується перевірити змішувальність препаратів у невеликій посудині.


Сумісний з фунгіцидами **Амістар® Екстра**, **Амістар® Тріо**, **Тілт®**, **Тілт® Турбо**, **Альто® Супер**, **Елатус® Ріа**, інсектицидами **Енжіо®**, **Карате® Зеон**, регулятором росту **Моддус®**.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Препарат починає працювати уже при середньодобовій температурі +5 °С, але при цьому його дія може бути повільнішою. Оптимальна температура для застосування препарату — в межах від +8 до +25 °С.

Важливо! Не застосовуйте препарат одразу після заморозків або якщо заморозки очікуються в ніч після обробки.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 150–200 л/га.

Пріма™ Форте 0,5 л/га




ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ: Препарат не викликає пошкоджень або зниження врожаю культурних рослин при його застосуванні від стадії куціння до стадії двох міжвузлів у культурної рослини. Найчутливіші до дії препарату рослини сприйнятливих видів бур'янів у стадії розвитку від 2-х до 8-ми справжніх листків, також ефективний по сім'ядолях бур'янів. Препарат містить діючі речовини з різним механізмом дії, що дозволяє досягти надійного рівня контролю у разі змішаної забур'яненості. Рекомендована норма витрати препарату залежить від типу забур'яненості, стадії розвитку бур'янів, густоти культурних рослин та кліматичних умов до, під час і після обприскування. Вищу з рекомендованих норму слід застосовувати у разі пізніх стадій розвитку бур'янів, високої забур'яненості посівів багаторічними бур'янами, на зріджених посівах, у разі тривалого періоду з прохолодною погодою та при пізній обробці культури (у фазі двох міжвузлів у культурних рослин). Недоцільно використовувати середню норму. Для досягнення максимальної ефективності препарат слід наносити рівномірно на листову поверхню рослин, застосовуючи добре відрегульоване обладнання. Рекомендується застосовувати щілинні (плоскоструменеві) розпилювачі, які забезпечують середній розмір крапель при обприскуванні.



Пріма™ Форте 0,7 л/га

За умови мінімум 300 мм опадів від внесення гербіциду до сівби наступної культури



ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СОЛОМИ Й РОСЛИННИХ РЕШТОК: Солому і рослинні рештки слід залишити на полі і якомога раніше після збирання врожаю загорнути в ґрунт на глибину не менше як 10 см за допомогою оранки, культивування, дискування. Після загортання соломи в ґрунт, щоб вона повністю розклалася, треба витримати щонайменше 4 місяці за умови активного мікробіологічного розкладу до посіву чутливих культур навесні наступного року. Препарат у рослинних рештках розкладається швидше в теплому й вологому і кислому рН ґрунті, розклад можна пришвидшити додатковим зрошенням та внесенням азотних добрив.

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СІВОЗМІНИ: Після застосування гербіциду **Пріма™ Форте** рекомендується дотримуватись таких рекомендацій з вирощування наступних культур:

- У разі потреби пересівання після застосування препарату на тому самому полі можна вирощувати кукурудзу, сорго, ярі зернові, злакові трави;
- восени цього року (після весняного застосування): озимі зернові, озимий ріпак, злакові трави;
- при нормі витрати 0,5 л/га навесні наступного року: ярі зернові, ярий ріпак, кукурудзу, сорго, соняшник, картоплю, люцерну, цибулю, цукрові буряки, льон, капусту;
- при нормі витрати 0,7 л/га та при опадах не менше як 300 мм за цей період 11 місяців: ярі зернові, ярий ріпак, кукурудзу, сорго, соняшник, картоплю, цибулю, цукрові буряки, льон, капусту;
- не раніше ніж через 14 місяців: сочевицю, нут, сою, кормові боби, горох, моркву, люцерну.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:







- Не застосовувати препарат на зернових із підсівом конюшини, люцерни або інших бобових
- Не допускати знесення робочого розчину препарату на сусідні поля, зайняті під чутливими дводольними культурами



Примекстра® Голд

СТАРТ БЕЗ БУР'ЯНІВ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ВРОЖАЮ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Примекстра® Голд 720 SC, к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	400 г/л S-метолахлору, 320 г/л атразину
	ХІМІЧНА ГРУПА	Хлорацетаміди, триазини
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	20 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Висока селективність для кукурудзи
- ✓ Комплексний контроль основних однорічних злакових і дводольних бур'янів
- ✓ Тривалий період захисної дії (6–8 тижнів)
- ✓ Висока гнучкість у застосуванні (до сівби, одночасно з висівом, до сходів або по сходах культури)
- ✓ Можливість використовувати на батьківських формах кукурудзи



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га
КУКУРУДЗА СОРГО*	Однорічні злакові і дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до сівби, після сівби або по сходах у фазах від 3 до 5 листків у культурі	2,5–3,5

* Обов'язкова обробка насіння антидотом Концеп III.


СУМІСНІСТЬ: Препарат можна змішувати з іншими загальноживими засобами захисту рослин на відповідних культурах. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.

Не рекомендується змішувати з мікроелементами, зокрема з цинком у будь-якій формі.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Обприскування до появи сходів — 300–350 л/га.

КОМЕНТАРІ: При посходовому застосуванні на кукурудзі й сорго фаза розвитку бур'янів не повинна перевищувати 2 справжні листки. Не рекомендується застосовувати, якщо очікуються приморозки протягом 2–3 днів.

У разі недостатньої вологи (або її відсутності) та при сильних вітрах, які можуть знести верхній шар ґрунту разом із препаратом, рекомендовано заробку в ґрунт на глибину 3–5 см.









Ефективність препарату



ЗАХИЩАЄ КОМПЛЕКСНО І БЕЗПЕЧНО

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Примекстра® TZ Голд 500 SC, к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	312,5 г/л S-метолахлору, 187,5 г/л тербутилазину
	ХІМІЧНА ГРУПА	Хлорацетаміди, триазини
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	20 л, 100 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Комплексний контроль основних однорічних бур'янів
- ✓ Тривалий період захисної дії (6–8 тижнів)
- ✓ Відсутність фітотоксичності на соняшник і сою порівняно з гербіцидами на основі ацетохлору
- ✓ Можливість застосовувати на батьківських формах культури
- ✓ Відсутність проблем післядії та резистентності



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га
КУКУРУДЗА	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до посіву, після посіву або по сходах у фазах від 3 до 5 листків у культури	4,0–4,5
СОРГО*		Обприскування ґрунту до сходів культури	4,5
СОНЯШНИК**, КАРТОПЛЯ			
СОЯ**			
ТОМАТИ РОЗСАДНІ	Однорічні і багаторічні злакові, пасльонові, амброзія	Обприскування ґрунту до висаджування розсади	4,0–4,5

* Обов'язкова обробка насіння антидотом Концеп III.

** На легких (слабогумусних) ґрунтах рекомендується зменшувати норму внесення препарату до 3,0 л/га.

СУМІСНІСТЬ: Можна змішувати з іншими загальнозживаними засобами захисту рослин на відповідних культурах. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність. Не рекомендується змішувати з мікроелементами, зокрема з цинком у будь-якій формі.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Щоб покращити дію препарату, рекомендується вносити під передпосівну культивуацію або під «Європак», але не глибше, ніж на 5 см. При застосуванні по сходах бур'янів не допускається переростання злакових і дводольних бур'янів до фази більше 2-х листків. При застосуванні препарату під час несприятливих погодних умов (приморозки, посуха тощо) ефективність препарату може знизитись.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО

РОЗЧИНУ: Обприскування до появи сходів — 300–350 л/га.

КОМЕНТАРІ: При посходовому застосуванні на кукурудзі й сорго фаза розвитку бур'янів не повинна перевищувати 2 справжні листки. Не рекомендується застосовувати, якщо очікуються приморозки протягом 2–3 днів.

У разі недостатньої вологи (або її відсутності) та при сильних вітрах, які можуть знести верхній шар ґрунту разом із препаратом, рекомендовано заробку в ґрунт на глибину 3–5 см.

Якщо через великі опади молоді рослини сої, соняшнику залишаються підтопленими водою в період дії гербіциду або на них потрапляє препарат унаслідок відбивання з поверхні ґрунту, це може призвести до пошкодження або загибелі молодих рослин.











Реглон® Ейр

АВІАСТАНДАРТ З ДЕСИКАЦІЇ СІЛЬГОСПКУЛЬТУР

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Реглон® Ейр 200 SL, РК
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	200 г/л диквату іону
	ХІМІЧНА ГРУПА	Похідні біпіридилію
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Розчинний концентрат
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	20 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Спеціально розроблена формуляція для авіаобробки
- ✓ Комбінація сурфактантів у формуляції препарату гарантує оптимальну фракцію краплі під час внесення
- ✓ Надзвичайно швидка дія (не змивається опадами вже через 30 хв. після обробки)
- ✓ Пришвидшує досягання і робить його рівномірним по всіх органах рослини, припиняє розвиток хвороб

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
РІПАК	Десикація	Обприскування посівів при побурінні 70 % стручків у культури	1,0–2,25	1/7
СОНЯШНИК		Обприскування у фазі початку побуріння кошиків		1/4–6
СОЯ		Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього й середнього ярусів у культури		1/6
КАРТОПЛЯ		За 7–10 днів до збирання або в період закінчення формування бульб (на дуже облиствених сортах повторна обробка через 3–5 днів після першої)	1,0–1,5	1–2/7
СОРГО		Обприскування посівів у фазі воскової стиглості	2,0–3,0	1/4–6
РИС		Обприскування посівів у фазі повної стиглості	1,0–1,5	1/5







ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Для проведення десикації рекомендується використовувати лише такі типи літаків, гвинти і крила яких викликають мінімум турбулентності повітря. Гелікоптери краще використовувати лише на великих площах, де немає небезпеки потрапляння робочого розчину на сусідні культури через знесення. Приготований розчин треба використати протягом доби. Десикацію краще проводити у вечірній час або в похмуру погоду.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Верхня межа температури, рекомендованої до застосування робочого розчину **Реглон® Ейр**, становить +25 °С.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 50–100 л/га.

ДЕСИКАНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ПРОФЕСІОНАЛІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Реглон® Форте 200 SL, РК
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	200 г/л диквату іону
	ХІМІЧНА ГРУПА	Похідні біпіридилію
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Розчинний концентрат
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	10 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Удосконалена формуляція для наземного застосування
- ✓ Рівномірне пришвидшення досягання по всіх органах рослини та припинення розвитку хвороб
- ✓ Знижує вологість насіння, зменшуючи витрати на сушіння
- ✓ Надзвичайно швидка дія (не змивається опадами вже через 30 хв. після обробки)



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
СОНЯШНИК	Десикація	Обприскування у фазі початку побуріння кошиків	1,5–2,25	1/4–6
РІПАК ЯРИЙ ТА ОЗИМИЙ		Обприскування посівів при побурінні 70 % стручків у культури		1/5–10
СОЯ		Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів у культури		1/6
КАРТОПЛЯ (ПРОДОВОЛЬЧА, НАСІННЄВА)	Десикація	Обприскування в період закінчення формування бульб і огрубіння шкірки картоплі	1,2–1,5	1/10
	Десикація (сильно облиствені сорти)	Обприскування в період закінчення формування бульб і огрубіння шкірки з інтервалом між обробками 3–5 днів		2/10
	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів за 2–3 дні до появи масових сходів картоплі	1,2–2,0	1/–
САДИ ТА ВИНОГРАДНИКИ	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Спрямоване обприскування вегетуючих бур'янів навесні або влітку	1,3–1,7	2/–

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Десикацію краще проводити у вечірній час або в похмуру погоду.

Для проведення десикації рекомендується використовувати самохідні або тракторні обприскувачі. Приготований розчин треба використати протягом доби.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Верхня межа температури при проведенні десикації не повинна перевищувати +25 °С.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 250–400 л/га.









Рекомендовано засіб індивідуального захисту
Наприклад:
Повнолицьова маска з фільтром 3М 6000 + 3М 2125 (P2)



ШВИДКИЙ НЕСЕЛЕКТИВНИЙ КОНТАКТНИЙ ДЕСИКАНТ І ГЕРБІЦИД

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Реглон® Супер 150 SL, PK
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	150 г/л диквату іону
	ХІМІЧНА ГРУПА	Похідні біпіридилію
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Розчинний концентрат
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	10 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Надзвичайно швидка дія (не змивається опадами вже через 30 хв. після обробки)
- ✓ Безпечний для культури, людини і довкілля
- ✓ Пришвидшує досягання
- ✓ Знищує небажану рослинність при застосуванні у якості гербіциду суцільної дії в посівах овочевих культур



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
СОНЯШНИК*	Десикація	Обприскування у фазі початку побуріння кошиків	2,0–3,0	1/4–6
ГОРОХ		Обприскування в період пожовтіння нижніх стручків і при вологості зерна до 45 %		1/7
ЛЮЦЕРНА (НАСІННЄВІ ПОСІВИ)		Обприскування при побурінні 85–90 % бобів	3,0	1/7
СОРГО (НАСІННЄВІ ПОСІВИ)		Обприскування в період воскової стиглості насіння	4,0	1/4–6
МОРКВА (НАСІННЄВІ ПОСІВИ)		Обприскування в період початку повної стиглості насіння в зонтиках другого порядку при вологості загальної маси насіння не більше як 50 %	2,5–3,0	1/5–10
РИС		Обприскування посівів у фазі повної стиглості рослин за 5 діб до збирання	2,0	1/5
ЛЬОН		Обприскування посівів у фазі ранньої жовтої стиглості у культури	2,0–3,0	1/7–10
РІПАК ЯРИЙ І ОЗИМИЙ		Обприскування посівів при побурінні 70 % стручків у культури		1/5–10
СОЯ		Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього й середнього ярусів у культури		1/6

* У тому числі й авіаметодом.

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
БУРЯКИ ЦУКРОВІ (НАСІННЄВІ ПОСІВИ)	Десикація	Обприскування в період побуріння 30–40 % клубочків	4,0–6,0	1/10
БУРЯКИ СТОЛОВІ, КОРМОВІ (НАСІННЄВІ ПОСІВИ)		Обприскування в період побуріння 30–40 % клубочків		1/8
КОНЮШИНА ЧЕРВОНА (НАСІННЄВІ ПОСІВИ)		Обприскування при побурінні 75–80 % голівок	3,0–4,0	1/5–7
РЕДЬКА (НАСІННЄВІ ПОСІВИ)		Обприскування в період воскової стиглості насіння	4,0–5,0	1/10
БОБИ КОРМОВІ (НАСІННЄВІ ПОСІВИ)		Обприскування в період, коли насіння нижніх бобів жовте, а насіннєвий рубчик чорний		1/8–10
ТУРНЕПС (НАСІННЄВІ ПОСІВИ)		Обприскування в період воскової стиглості за вологості насіння 40–50 %	3,0–4,0	1/6–7
КАПУСТА (НАСІННЄВІ ПОСІВИ)		Обприскування в період біологічної стиглості насіння при його вологості не більше як 50 %	2,0–3,0	1/5–10
КАРТОПЛЯ		Обприскування посівів за 10 днів до збирання культури	1,5–2,0	1/10
ХМІЛЬ	Спрямоване обприскування вегетуючих бур'янів за висоти культури 4–5 м	1/5–7		
ЦИБУЛЯ	Обприскування до появи сходів культури	2,0–4,0		1/не встановлюється

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 250–400 л/га.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Десикацію краще проводити у вечірній час або в похмуру погоду. Приготовлений розчин використати протягом доби.









**Твіст™**

Arylex™ active

ГЕРБИЦИД

НОВИЙ ЗАХИСТ ВІД БУР'ЯНІВ АКТИВОВАНО!

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Твіст™ 250, в. г.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	130,3 г/кг галауксифен-метилу + 125 г/кг флорасуламу + 88,8 г/кг антидоту (клоквінтосет-мексилу)
	ХІМІЧНА ГРУПА	Арилпіколілати + триазолпіримідини
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Вододисперсні гранули
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	0,5 кг

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

Інноваційне рішення для антирезистентних систем захисту з альтернативним механізмом дії активного інгредієнта **Arylex™ active**

- ✓ Максимально дієвий гербицид для контролю підмаренника чіпкого, лободи білої, амброзії полинолистої та фумарії
- ✓ Синергія діючих речовин забезпечує вдосконалений контроль дводольних бур'янів, у т. ч. стійких до сульфонілсечовин, імідазолінонів, азолів, а також вероніки, кропиви, герані
- ✓ Стабільний контроль бур'янів у нестабільних кліматичних умовах
- ✓ Ідеальний партнер для бакових сумішей із грамініцидами
- ✓ Підходить для весняного й осіннього застосування

**ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ**

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА І ЯРА ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ І ЯРИЙ	Однорічні й окремі багаторічні дводольні бур'яни	Від 2–3 листків до прапорцевого листа включно	40–50 г/га + ПАР неіонного типу*	Однократно / не встановлюється

* При застосуванні Твіст™ слід обов'язково додавати ад'ювант неіонного типу в нормі згідно з рекомендаціями виробника.

СУМІСНІСТЬ: У бакових сумішах гербицид **Твіст™** сумісний із більшістю пестицидів. При використанні бакових сумішей пестицидів потрібно дотримуватися рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату — компонента бакової суміші. У кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.

Для комплексного контролю однорічних злакових і дводольних бур'янів рекомендується змішувати з гербицидом **Аксіал®** та іншими грамініцидами.

Гербицид **Твіст™** можна використовувати в сумішах із фунгіцидами, інсектицидами (крім фосфорорганічних).

Сумісний із фунгіцидами **Амістар® Екстра**, **Амістар® Тріо**, **Тілт®**, **Тілт® Турбо**, **Альто® Супер**, **Елатус® Ріа**; інсектицидами **Енжіо®**, **Карате® Зеон**.

Твіст™ можна використовувати в сумішах з рідкими азотними добривами

й регуляторами росту, крім регуляторів, які містять хлормекват-хлорид.

Не рекомендується змішувати з будь-якими продуктами, що містять глюфосинат амонію та бор.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ:

Твіст™ починає працювати вже за середньодобової температури +5 °С. Оптимальний температурний діапазон застосування — +8...25 °С.

На відміну від більшості гербицидів — регуляторів росту, дія галауксифен-метилу істотно не залежить від температур.

Контроль може бути ефективний і за холодних (неактивні періоди росту бур'янів), і за теплих умов з активним ростом.

Не рекомендується використовувати препарат, коли рослини перебу-



вають у стресовому стані, та проводити обприскування, якщо очікуються заморозки або безпосередньо після морозів.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО

РОЗЧИНУ: 150–200 л

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ:

Продукт має три способи дії на бур'яни:

- Блокує дію ферментів при синтезі амінокислот
- Викликає блокаду ауксину, тобто гормонів, відповідальних за ріст рослини
- Спотворює процес дихання в клітинах рослин

Твіст™ забезпечує високу ефективність у боротьбі з найширшим

спектром широколистяних бур'янів, серед яких і важкоконтрольовані: кропива, жабрій, лобода, підмаренник чіпкий, амброзія, фумарія, герань.

Простоту у використанні забезпечує інноваційна рецептура — високотехнологічна формуляція (GoDRI™ RDT™) двох діючих речовин із різними механізмами дії та додаванням антидоту.

Переваги технології GoDRI™ RDT™:

- швидка розчинність навіть у холодній воді
- активна дисперсія після розчинності
- висока сумісність із більшістю продуктів
- проста у використанні упаковка й точне вимірювання
- використання за низької і високої температури

АЛГОРИТМ ВИБОРУ НОРМИ



Типові однорічні дводольні бур'яни на ранніх стадіях розвитку — 40 г/га

(5 г/га галауксифен-метилу + 5 г/га флорасуламу + 4,4 г/га клоквінтосету)




Висока забур'яненість, перерослі та багаторічні бур'яни — 50 г/га

(6,25 г/га галауксифен-метилу + 6,25 г/га флорасуламу + 8,8 г/га клоквінтосету)



Використання ПАР обов'язкове



Оптимальна фаза застосування гербіциду визначається фазою розвитку бур'янів — ВВСН 12–14 при їх активному рості та за висоти до 10 см



Наявність двох діючих речовин з різними механізмами дії дозволяє досягти надійного рівня контролю у разі змішаної забур'яненості



Рекомендована норма витрати препарату залежить від типу забур'яненості, стадії розвитку бур'янів, густоти культурних рослин та кліматичних умов до, під час і після обприскування


РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИБОРУ ГЕРБІЦИДУ



Дербі® 175 SC

ГЕРБІЦИД

ЗЕРНОВІ ПІСЛЯ
соняшнику
та ІМІ-ріпаку



Твіст™

Arylex™ active

ГЕРБІЦИД

ЗЕРНОВІ ПІСЛЯ
гороху, соняшнику,
кукурудзи та зернових

ВІДСУТНІСТЬ ОБМЕЖЕНЬ У СІВОЗМІНІ

Галауксифен-метил і флорасулам швидко розкладаються в ґрунті й рослинних рештках і, як правило, не зберігаються так довго, щоб вплинути на врожай наступного сезону. Як і для багатьох сполук, здатних до мікробіологічного розкладу, для руйнування потрібні достатні вологість і температура.

КОМЕНТАРІ:






- Чергуйте застосування **Твіст™** із різними групами гербіцидів, які контролюють одні й ті самі бур'яни.
- Бур'яни на момент застосування повинні активно вегетувати і не перебувати в стані стресу.
- Не рекомендується використовувати для контролю ІМІ-падалиці ріпаку.
- Рекомендовано нейтральний або слаболужний рН води.
- Якщо очікуються опади, обробка має бути не менше ніж за 1 годину до дощу.



Ураган Форте®

УРАГАННА ДІЯ ПРОТИ БУР'ЯНІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Ураган Форте® 500 SL, в. р. к.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	500 г/л калійної солі гліфосату
	ХІМІЧНА ГРУПА	Похідні гліцину
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Водорозчинний концентрат
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	20 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Найвища розчинність серед гліфосатів
- ✓ Надзвичайно швидка дія (завдяки новому змочувачу)
- ✓ Не змивається опадами вже через 30 хв. після обробки
- ✓ Зменшена норма витрати
- ✓ Діє майже вдвічі швидше, ніж інші гліфосати

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га
ПЛОДОВІ ТА ВИНОГРАДНИКИ	Однорічні злакові і дводольні бур'яни	Спрямоване обприскування вегетуючих бур'янів навесні або влітку	2,0
ПАРИ		Обприскування бур'янів у період їх активного росту	
ПАРИ	Багаторічні злакові і дводольні бур'яни	Спрямоване обприскування вегетуючих бур'янів навесні або влітку	4,0
ПЛОДОВІ ТА ВИНОГРАДНИКИ		Обприскування вегетуючих бур'янів навесні за 2 тижні до висівання (до обприскування припинити всі механічні обробки, крім ранньовесняного закриття вологи)	
ПОЛЯ, ПРИЗНАЧЕНІ ПІД ПОСІВИ СОНЯШНИКУ, РІПАКУ, ЛЮЦЕРНИ, БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ	Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів	1,5–3,0
ПОЛЯ, ПРИЗНАЧЕНІ ПІД ПОСІВИ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ, КУКУРУДЗИ, СОНЯШНИКУ, РИЦИНИ, ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, ОВОЧЕВИХ, СОЇ, ЛЬОНУ	Однорічні і багаторічні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів	2,0–4,0
ЗЕРНОВІ	Однорічні і багаторічні бур'яни	Обприскування посівів за 2 тижні до збирання (для підсушування і знищення бур'янів)	1,5–2,0
ВІДКРИТІ КОЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНІ І ЗРОШУВАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА ЇХНІ УЗБІЧЧЯ	Однорічні і багаторічні, зокрема гідрофітні, бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів	4,0




Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га
ЗЕМЛІ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (СМУГИ ВІДЧУЖЕННЯ ЛЕП, ГАЗО- І НАФТОПРОВІДІВ, УЗБІЧЧЯ ДОРІГ, ЗАЛІЗНИЧНІ НАСИПИ, АЕРОДРОМИ)	Однорічні і багаторічні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів	2,0–4,0
ПЛОЩІ, ПРИЗНАЧЕНІ ПІД ПОСІВИ РИСУ	Багаторічні злакові і дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів за 7–10 днів до посіву рису	
ПЛОЩІ, ПРИЗНАЧЕНІ ПІД ПОСАДКУ ХМЕЛЮ	Злакові і дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів	

СУМІСНІСТЬ: Можна змішувати із загальноживаними пестицидами на відповідних культурах, наприклад з гербіцидом **Діален Супер®**. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Препарат слід застосовувати за сприятливих погодних умов і коли бур'яни перебувають у стадії активного росту. Не рекомендується проводити обприскування, коли бур'яни перебувають у стресовому стані.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 100–150 л/га.











Фюзілад Форте®

ШВИДКИЙ І БЕЗПЕЧНИЙ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Фюзілад Форте® 150 ЕС, к. е.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	150 г/л флуазифоп-П-бутилу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Похідні арилоксифеноксипропіонової кислоти (ФОПи)
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	20 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Швидке проникнення й поширення в рослинах бур'янів
- ✓ Нефітотоксичний для дводольних культур
- ✓ Гнучке застосування (можна вносити в будь-якій фазі культури)
- ✓ Підсилення дії гербіцидів-партнерів при застосуванні в сумішах
- ✓ Технологія ISOlink підсилює ефективність препарату

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га
МОРКВА, ТОМАТИ, ОГІРКИ, ЦИБУЛЯ (ПЕРО, РІПКА)	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур'янів)	0,5*–1,0
	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'янів 10–15 см)	1,0–2,0
БУРЯКИ ЦУКРОВІ	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур'янів)	0,5*–1,0
	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'янів 10–15 см)	1,0–2,0
РІПАК ОЗИМИЙ І ЯРИЙ	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур'янів)	0,5*–1,0
	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'янів 10–15 см)	1,0–2,0
КАРТОПЛЯ	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур'янів)	0,5*–1,0
	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'янів 10–15 см)	1,0–2,0
КАПУСТА	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур'янів)	0,5*–1,0
	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'янів 10–15 см)	1,0–2,0

* Внесення у фазі «шильця» в однорічних злакових бур'янів.



Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га
ЛЬОН-ДОВГУНЕЦЬ	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур'янів)	0,5*–1,0
	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'янів 10–15 см)	1,0–2,0
СОНЯШНИК, ГОРОХ, СОЯ	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур'янів)	0,5*–1,0
	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'янів 10–15 см)	1,0–2,0
ХМІЛЬНИКИ	Однорічні і багаторічні злакові бур'яни	Обприскування за висоти бур'янів 5–15 см (незалежно від фази розвитку культури)	1,0–2,0
ВИНОГРАДНИКИ	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'янів 10–15 см)	2,0
ГРЕЧКА	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур'янів)	0,5*–1,0
	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур'янів 10–15 см)	1,0–2,0

* Внесення у фазі «шильця» в однорічних злакових бур'янів.

СУМІСНІСТЬ: Препарат можна застосовувати окремо і в сумішах з гербіцидами проти дводольних бур'янів. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність. Не рекомендується змішувати з інсектицидами, фунгіцидами (зокрема стробілуринової групи), добривами та мікроелементами.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Препарат містить сурфактанти, тому для ефективного застосування важливо дотримуватися концентрації робочого розчину.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Норма витрати робочої рідини не повинна перевищувати 100–150 л/га.

КОМЕНТАРІ: При застосуванні на горосі і сої не рекомендується використовувати в баковій суміші з МЦПА і бентазоном. При застосуванні на соняшнику рекомендується обробляти до 8-го листка культури.



БІОСТИМУЛЯТОРИ

Квантіс®, Р.....	68
Як Квантіс® впливає на рослину.....	69
Ізабїон®, Р.....	70
Що таке біостимулятори.....	71



НОВІ ВИКЛИКИ — НОВІ РІШЕННЯ



Зміни клімату вже давно стали реальністю і щороку завдають чимало труднощів та змушують шукати альтернативні підходи й адаптуватися до нових умов задля досягнення поставлених цілей.

У майбутньому біостимулятори стануть важливим елементом для вирішення цього непростого завдання. Саме тому розуміння, як найкраще використовувати біостимулятори сьогодні, забезпечить перевагу вже завтра і дозволить краще підготуватися до майбутніх викликів.



Зростає також увага до захисту довкілля, зменшення пестицидного навантаження і водночас отримання безпечної продукції зі збереженням її якості й кількості.







НОВИЙ



 **Квантіс®**

ЕФЕКТИВНІСТЬ, ВАРТА ДОВІРИ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Квантіс®, Р
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	684 г/л (52 % сухої речовини) амінокислоти, пептиди, макро- і мікроелементи
	ХІМІЧНА ГРУПА	Органічне добриво
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Розчин
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: IV (малонебезпечний)
	УПАКОВКА	10 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

Квантіс® — це біостимулятор-антистресант для виробників польових культур, що забезпечує стабільні результати й знижує втрати врожаю, спричинені абіотичними стресами та фітотоксичністю ЗЗР

- ✓ Стимулятор росту природного походження, який швидко проникає в рослину шляхом простої дифузії
- ✓ Активізує власні захисні механізми рослини та підвищує опір до дії несприятливих абіотичних чинників
- ✓ Складники препарату відіграють важливу роль в осморегуляції та збереженні тургору в клітинах рослин в умовах стресу
- ✓ Унікальна рецептура, що містить набір найважливіших амінокислот для польових культур, пептиди, макро- і мікроелементи
- ✓ Покращує засвоєння елементів живлення при сумісному використанні

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА	Підвищення стійкості рослин до дії несприятливих умов	Обприскування в період вегетації	1,0–2,0	2/–
СОНЯШНИК				
КУКУРУДЗА				
РІПАК ОЗИМИЙ				

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та регуляторів росту. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність. Не сумісний з препаратами на основі міді.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 150–300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

За 1–5 днів до настання стресу.

Під час дії стресового чинника (в періоди повернення холодів).


Через 2–3 дні після настання стресового чинника (фітотоксичність ЗЗР, повернення холодів, градобій та інші абіотичні чинники).

ПРОФІЛАКТИЧНО, ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

КОМЕНТАРІ: **Квантіс®** — це біостимулятор, який забезпечує стабільні результати при використанні в системі захисту сільськогосподарських культур, знижуючи втрати врожаю, що можуть бути викликані тепловим стресом і дефіцитом вологи, поверненням холодів, фітотоксичністю засобів захисту рослин та механічними пошкодженнями.

Як Квантіс® впливає на рослину

Принцип дії **Квантіс®** проти стресу ґрунтується на вивченні транскриптоміки, метаболоміки та фізіологічних процесів у рослині. Застосування **Квантіс®** до настання абіотичного стресу запускає власні захисні механізми, що дозволяє підготувати рослину до стресу. Природні компоненти, які входять до складу **Квантіс®**, діють безпосередньо як антиоксиданти й осмопротектанти і протистоять небажаному впливу стресових умов на клітини рослини. Це дає змогу зберегти нормальні фізіологічні процеси в клітинах рослин включно з фотосинтезом для дальшого продукування білків, необхідних для росту й розвитку.





БІОСТИМУЛЯТОР ВАШОГО ВРОЖАЮ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Ізабіон®, Р.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	625 г/л пептидів і амінокислот, в тому числі 100 г/л вільних амінокислот
	ХІМІЧНА ГРУПА	Набір амінокислот, макро- і мікроелементів
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Розчин
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ



- ✓ Амінокислоти тваринного походження краще засвоюються і швидше проникають у тканини рослини
- ✓ Діє миттєво завдяки вільним амінокислотам
- ✓ Зареєстровано для листового й кореневого підживлення
- ✓ Діє одночасно на приживлюваність рослин, збільшення кількості й покращення якості продукції та є найшвидшим антистресантом для рослини при будь-яких стресах
- ✓ Найконцентрованіший з усіх аналогічних продуктів
- ✓ Покращує запилення і зав'язування плодів
- ✓ Неперевершена дія на відновлення рослин після стресових ситуацій (морози, засуха, градобій)

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Фаза внесення	Норма витрати, л/га
ТРоянди відкритого ґрунту	Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 14 діб)	3,0–5,0
ТРоянди закритого ґрунту	Кореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — початок інтенсивного росту пагонів, через 7 діб, наступне — через 14 діб)	3,0–4,0
ГВОЗДИКА відкритого ґрунту	Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 15 діб)	3,0–5,0
ГВОЗДИКА закритого ґрунту	Кореневе підживлення в період вегетації (перше — після висадки на постійне місце, наступні — через 15 діб)	3,0–4,0
ТОМАТИ відкритого ґрунту	Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — формування плодів)	2,0–5,0
ТОМАТИ закритого ґрунту	Кореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — період бутонізації, третє — формування плодів)	3,0–5,0
ОГІРКИ відкритого ґрунту	Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — через 15–20 діб)	3,0–5,0
ОГІРКИ закритого ґрунту	Кореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — період бутонізації, третє — формування плодів)	2,0–5,0
ВИНОГРАД	Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням, друге — фаза «ягода-рисина», третє — перед змиканням ягід у гроні)	2,0–3,0
САДИ	Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням, друге — перед червневим осипанням плодів, третє — початок достигання плодів)	2,0–3,0
КАРТОПЛЯ	Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — через 15 діб, третє — на початку інтенсивного формування бульб)	2,0–5,0

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

- Сумісний із пестицидами й добривами
- Унікати використання з мідьвмісними фунгіцидами
- **Ізабїон**[®] можна вносити через 4 дні після застосування міді
- Мідь можна використовувати через 3 дні після застосування **Ізабїон**[®]
- Використання з мінеральними оліями зменшує ефективність препарату **Ізабїон**[®]


Що таке біостимулятори?

Біостимулятори — це речовини, що застосовуються для підвищення стійкості рослин до дії абіотичного стресу завдяки стимулюванню природних захисних механізмів рослин, результатом якого є зменшення втрат урожаю та збереження його якості

ЩО ТАКЕ АБІОТИЧНИЙ СТРЕС?

Абіотичний стрес — це фізичні, хімічні й інші неорганічні чинники навколишнього середовища, що завдають шкоди рослинам, такі як дефіцит води, екстремальні температури, сонячна радіація, засолення ґрунту та ін.

ЧИННИКИ, ЗДАТНІ ВИКЛИКАТИ АБІОТИЧНИЙ СТРЕС У РОСЛИН



ІНСЕКТИЦИДИ

Актара® 25 WG, в. г.	74	Люфокс® 105 EC, к. е.....	87
Актеллік® 500 EC, к. е.....	76	Матч® 050 EC, к. е.....	88
Ампліго® 150 ZC, ФК.....	78	Нуредін™ Супер KE	90
Вертимек® 018 EC, KE.....	80	Пленум® 50 WG, ВГ	92
Воліам Флексі® 300 SC, КС	81	Проклейм® 5 SG, р. г.	93
Енжіо® 247 SC, к. с.....	82	Форс® 1,5 G, г.....	94
Карате® Зеон 050 CS, мк. с.	84	Про інсектициди	95
Лірум® 78 SC, к. с.....	86		







Актара®

ЗАХИСТ ВАШОГО ВРОЖАЮ ПОДОВЖЕНО

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Актара® 25 WG, в. г.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	250 г/кг тіаметоксаму
	ХІМІЧНА ГРУПА	Неонікотинοїди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Вододисперсні гранули
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	0,25 кг



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Тривалий захисний період (21–60 днів залежно від норми і способу застосування)
- ✓ Широкий спектр дії — зареєстрований у світі проти більш ніж 100 видів шкідників
- ✓ Найвища системність за рахунок високої розчинності діючої речовини в рослині
- ✓ Безпечніший для користувачів, ніж більшість інших інсектицидів
- ✓ Ефективний у боротьбі з ґрунтовими шкідниками
- ✓ «Вігор»-ефект при ґрунтовому застосуванні

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, кг/га	Кратність обробок / Термін очікування
ПШЕНИЦЯ*	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, трипси	Обприскування в період вегетації	0,10–0,14	2/20
КАПУСТА, ТОМАТ, БАКЛАЖАН, ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ	Попелиці, хрестоцвіті блішки, дротяники, несправжні дротяники	Замочування коренів розсади перед висадкою на постійне місце	1,5–2,0 г/л води на 250 рослин	–/–
ТЮТЮН	Личинки хрущів, ковалики (дротяники), піщаний мідляк, кравчик-головач, капустянки			
КАРТОПЛЯ	Колорадський жук	Внесення в рядки при висадці бульб	0,8	1/20
КАПУСТА, ТОМАТ, БАКЛАЖАН	Личинки хрущів, ковалики (дротяники), піщаний мідляк, кравчик-головач, капустянки	Внесення з поливною водою при крапельному зрошенні	0,6	1/–
ПОЛУНИЦЯ**		Полив рослин 0,25-процентним розчином	3,6	
ГІРКОКАШТАН	Каштанова мінуюча міль	Ін'єкція іплікатором у стовбури (через 10–15 см на висоті 1,0–1,5 м) до початку руху соку та закорковування отвору герметиком	1 г/отвір	1/–

* У тому числі й авіаметодом.

** Після збирання врожаю.



Рекомендовано засіб індивідуального захисту
Наприклад:
Напівмаска з фільтром ЗМ 2128



Перед застосуванням уважно прочитайте тарну етикетку

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, кг/га	Кратність обробок / Термін очікування
СОСНА ЗВИЧАЙНА (САДЖАНЦІ)	Личинки хрущів, ковалики (дротяники), піщаний мідляк, кравчик-головач, капустянки	Замочування коренів перед висадкою	300 г на 10 л води	1/-
		Полив рослин 0,25-процентним розчином	5,0	1/-
БУРЯКИ ЦУКРОВІ	Звичайний і сірий бурякові довгоносики, чорний довгоносик, блішки, щитоноски, піщаний мідляк, листкова бурякова попелиця	Обприскування в період вегетації	0,08	2/-
ГОРОХ	Горохова попелиця, гороховий зерноїд	Обприскування в період вегетації. Забороняється вживати зелений горошок	0,10	2/30
ЯБЛУНЯ	Бруньковий довгоносик, букарки, казарки, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач	Обприскування у фазі розпускання бруньок (рожевого бутона)	0,14	2/14
	Яблуневий плодовий пильщик, попелиці	Обприскування після цвітіння		

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Вчасна подача робочого розчину інсектициду в поливному циклі забезпечує правильне розміщення розчину **Актара® 25 WG** в кореневій зоні. У результаті коренева система рослин майже повністю засвоює діючу речовину і її концентрація в клітинному соку буде достатньо для ефективного знищення шкідників.

Особливо це позначається на тривалості захисної дії.

Вчасність подачі робочого розчину **Актара® 25 WG** розраховується дуже просто і залежить від загальної тривалості поливу. Якщо полив триває більше як 2 години, загальний час слід поділити на чотири і внести робочий розчин інсектициду в третій частині циклу. Якщо ж тривалість поливу менше як 2 години, її слід поділити на три і внести препарат в другій третині.

СУМІСНІСТЬ: Може застосовуватися в бакових сумішах з більшістю інсектицидів, фунгіцидів та з деякими гербіцидами. У кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність щодо випадання осаду.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

- Оптимальні години для проведення захисних робіт — з 6:00 до 9:00 або з 19:00 до 23:00 в безвітряну суху погоду при температурі не вище за +25 °С
- Об'єм робочого розчину залежить від культури та обладнання
- Захисна зона для вильоту бджіл — не менше як 4 км
- Терміни обмеження для вильоту бджіл — не менше як 4 доби

РОЗЧИННІСТЬ: На відміну від інших неонікотиноїдів, **Актара® 25 WG** має оптимальний ступінь розчинності у воді, а отже, й у клітинному соку. Це зумовлює високу системну активність інсектициду і дієвий захист молодого приросту.



«ВІГОР»-ЕФЕКТ: За умов ґрунтового використання **Актара® 25 WG** впливає на рослину як неспецифічний регулятор росту, зумовлюючи потужніший розвиток кореневої системи. Цей стимулювальний вплив названо «вігор»-ефектом, або «ефектом життєвої сили».

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 100–200 л/га для польових культур, 200–400 л/га для овочевих культур відкритого ґрунту, 400–800 л/га для культур захищеного ґрунту, 800–1200 л/га для плодово-ягідних культур залежно від об'єму крони дерева.







Картопля, томати, баклажани, перець солодкий (колорадський жук), капуста (попелиці) — 0,06–0,08 кг/га.



Актеллік®

ШКІДНИКАМ ВХІД ЗАБОРОНЕНО

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Актеллік® 500 ЕС, к. е.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	500 г/л піриміфос-метилу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Фосфорорганічні сполуки
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Ефективно і швидко контролює широкий спектр шкідників
- ✓ За рахунок фумігантної і трансламінарної активності знищує прихованоживучих шкідників
- ✓ Акарицидні властивості стримують розвиток кліщів
- ✓ Найбільш безпечний фосфорорганічний інсектицид для довкілля і людей

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
СОЯ	Кліщі, попелиці, трипси	1,2–2,0	2/30
БУРЯКИ ЦУКРОВІ	Довгоносики, мертвоїди, блішки, листкова бурякова попелиця	1,0–2,0	2/20
ЧЕРЕШНЯ	Вишнева муха	0,8–1,2	1/20
ПЕРСИК	Попелиці, східна плодожерка		1/50
БАКЛАЖАН	Попелиці, колорадський жук	0,8	2/20
ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ	Попелиці, колорадський жук	0,3–1,5	
ОГІРКИ І ТОМАТИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ	Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси	15,0–20,0 мл / 10 л води	3/3
ОГІРКИ І ТОМАТИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ	Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючі мухи, комарик		
ПОЛУНИЦЯ, МАЛИНА	Попелиці, жуки, вогнівки, листовійки, п'ядуни, галиці, пильщики	0,6	2/–
ЧОРНА СМОРОДИНА, АҒРУС		1,5	2/–
КУКУРУДЗА (АВІАМЕТОДОМ)	Стебловий кукурудзяний метелик, попелиці	1,2–2,0	2/15
ВИНОГРАДНИКИ (МАТОЧНИКИ ПІДЩЕПНИХ СОРТІВ)	Листкова філоксера	3,0	2/–



Культура	Спектр дії	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ	Листовійки, кліщі, попелиці, трипси	0,5–1,5	4/20
ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ		2,4–3,6	4/3
БАГАТОРІЧНІ ТРАВИ (НАСІННЄВІ ПОСІВИ), ЛЮЦЕРНА ФУРАЖНА, СЕЛЕНА, ШАВЛІЯ МУСКАТНА	Довгоносики, товстонижки, клопи, попелиці, трипси, шавлієвий довгоносик, вогнівки, лучний метелик, совки, галиці	1,0–1,5	2/20
ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ*	Комплекс шкідників*	0,6–1,2*	1–2/20–70*

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БОРОТБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ ЗАПАСІВ

Об'єкт, що обробляється	Цільовий об'єкт	Спосіб обробки	Норма витрати	Кратність обробок / Термін очікування
НЕЗАВАНТАЖЕНІ СКЛАДСЬКІ ПРИМІЩЕННЯ	Шкідники запасів	Обприскування стін, стелі й підлоги (обробка вологим способом). Норма використання води: метал — 30 мл/м ² , штукатурка — 70 мл/м ² , деревина/цемент — 50 мл/м ² , цегла — 150 мл/м ²	0,5 мл/м ²	1/–
		Дезінсекція приміщення за допомогою генератора гарячого або холодного туману (обробка аерозольним способом). Норма витрати носія (гасу або парафінової олії) — 100 мл на 100 м ³	0,04 мл/м ³	
ПРИСКЛАДСЬКА ТЕРИТОРІЯ		Обробка вологим способом (до 400 мл робочої рідини на 1 м ²)	0,8 мл/м ²	
ЗЕРНО ПРОДОВОЛЬЧЕ, НАСІННЄВЕ, ФУРАЖНЕ		Кількість робочого розчину на 1 тону зерна — 0,5–2 л. Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м	16 мл/т	

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДЕЗІНСЕКЦІЇ ЗЕРНА: Обробку проводять при стандартній вологості зерна. Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Для польових культур, овочів, плодово-ягідних культур — від +10 °С до +25 °С, для дезінсекції зерна — від +6 °С до +20 °С.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 200–400 л/га для наземного обприскування польових культур, 50–100 л/га для застосування авіа методом, 400–800 л/га для культур захищеного ґрунту, 800–1200 л/га для плодово-ягідних культур залежно від об'єму крони дерева.







КОМЕНТАРІ: Допуск людей та завантаження складів — після провітрювання протягом 2 діб по закінченні експозиції.


Реалізація зерна на продовольчі й фуражні цілі — за наявності залишків препарату не вище МДР, у зерні для приготування продуктів дитячого харчування — за відсутності піриміфос-метилу.



БЛИСКАВИЧНА ДІЯ ПРОТИ ШКІДНИКІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Ампліго® 150 ЗС, ФК
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	100 г/л хлорантраніліпролу, 50 г/л лямбда-цигалотрину
	ХІМІЧНА ГРУПА	Антраніламіди, синтетичні піретроїди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Змішана препаративна форма КС і СК
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Висока ефективність проти шкідників у ширшому діапазоні температур, ніж в інших інсектицидів
- ✓ Інноваційна формуляція забезпечує стійкість до УФ-випромінювання та запобігає змиванню дощем уже навіть через годину після обробки
- ✓ Овіцідна дія
- ✓ Висока ефективність на гусениць незалежно від їхнього віку протягом усього періоду захисної дії
- ✓ Висока початкова токсичність, так званий нокдаун-ефект проти гусениць лускокрилих
- ✓ Різний механізм дії запобігає виникненню резистентності

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
КУКУРУДЗА*	Бавовникова совка, стебловий кукурудзяний метелик	Обприскування в період вегетації	0,2–0,3	2/30
СОРГО	Бавовникова совка, стебловий кукурудзяний метелик, трипси, попелиці		0,3–0,4	
ЯБЛУНЯ	Плодожерки, листовійки, квіткоїди, букарка, казарка, попелиці, пильщик		0,3–0,4	3/30
СОНЯШНИК*	Лучний метелик, бавовникова совка		0,2–0,3	2/30
ТОМАТИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ	Бавовникова совка, попелиці та цикади		0,4	2/20
КАПУСТА	Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця, білани, капустяна міль, капустяна совка		0,3–0,4	
КАРТОПЛЯ	Колорадський жук, попелиці та цикади		0,15–0,2	
СОЯ	Бавовникова совка, люцернова совка, акацієва вогнівка, чортополохівка, попелиці		0,2–0,4	2/30
РІПАК ОЗИМИЙ	Капустяна міль, листогризучі совки, озима совка, білани	0,2–0,3		

* У тому числі авіаметодом.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Для досягнення максимальної ефективності проти лускокрилих шкідників обприскування слід проводити в період яйцекладки — початку відродження личинок (при появі перших гусениць).

З метою досягнення максимальної ефективності **Ампліго**® на ріпаку до робочого розчину рекомендовано додавати ад'юванти органосиліконової групи.

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю пестицидів, але в кожному окремому випадку препарати, які змішуються, слід перевіряти на сумісність.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 200–400 л/га — наземним обприскувачем для польових і овочевих культур, 50–100 л/га — авіаційним методом, 800–1200 л/га для яблуні залежно від об'єму крони дерева.











Вертимек®

НЕ ЗАЛИШАЄ ШАНСІВ КЛІЩАМ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Вертимек® 018 ЕС, КЕ
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	18 г/л абамектину
	ХІМІЧНА ГРУПА	Авермектини
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат, що емульгується
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	1 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Ефективно контролює всі види кліщів, мінерів, трипсів і медяниць
- ✓ Неперевершена трансламінарна дія забезпечує стійкість до змивання дощем, високий рівень контролю шкідників та найдовший період захисної дії серед акарицидів
- ✓ За рахунок чітко вираженої кишкової і помірної контактної дії препарат ефективно захищає від шкідників, але залишається безпечним для корисної ентомофауни

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
СОЯ	Павутинні кліщі, трипси	Обприскування в період вегетації	0,6–1,0	2/30
ЯБЛУНЯ	Кліщі, попелиці, медяниця		1,0–1,5	3/14
ГРУША			1,0	3/14
ПОЛУНИЦЯ	Кліщі, трипси, попелиці, колорадський жук		0,5–1,0	2/7
ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ, БАКЛАЖАН			0,7–1,0	
ОГІРОК	Кліщі, білокрилки, попелиці, трипси		0,75–3,0	3/20
ХМІЛЬНИКИ	Павутинний кліщ, хмелева попелиця		1,0–1,5	2/14
ВИНОГРАД	Кліщі, зудень, листкова філоксера		1,0–1,5	2/14
ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ	Кліщі	1,0–1,5	2/14	

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Наземне обприскування в період вегетації на хмільниках:







- за висоти рослин 2–4 м та витраті робочого розчину 500 л/га — 0,75 л/га препарату;
- за висоти рослин 6–7 м та витраті робочого розчину 1000–2000 л/га — 3,0 л/га препарату.

ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ: Щоб запобігти виникненню резистентності, не слід використовувати позачергово (тричі поспіль) з іншими препаратами з хімічної групи авермектинів. Для підвищення ефективності препарату проти шкідників бажано застосовувати робочий розчин уранці, ввечері або в похмуру погоду.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 200–400 л/га для сої, суниці й овочевих культур відкритого ґрунту, 400–800 л/га для культур захищеного ґрунту, 800–1200 л/га для яблуні залежно від об'єму крони дерева.

ЗРУЧНА ДОСКОНАЛІСТЬ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Воліам Флексі® 300 SC, KC
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	200 г/л тіаметоксаму, 100 г/л хлорантраніліпролу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Неонікотиноїди, антраніламід
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	1 л

**ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ**

- ✓ Комбінація двох діючих речовин неперевершено контролює всі види сисних і листогризучих шкідників
- ✓ Тривала захисна дія — до 20–25 днів
- ✓ Зручний у використанні
- ✓ Висока трансламінарна і системна дії
- ✓ Стійкий до змивання дощем

**ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ**

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
КАПУСТА	Капустяний листоїд, капустяна попелиця, капустяні клопи, капустяні блішки, стебловий і насінневий прихованохоботники, капустяна муха, капустяний білан, капустяна міль, ріпаковий білан, ріпаковий пильщик, листогризучі совки	Обприскування в період вегетації	0,3–0,4	2/20
ТОМАТИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ	Листогризучі совки, колорадський жук, тютюновий трипс, картопляна міль, картопляна совка			2/14
ТОМАТИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ	Листогризучі совки, попелиці, тютюновий трипс			2/7
ВИНОГРАДНИКИ	Гронова листовійка, скосар кримський, совки		0,3–0,5	2/35
ЯБЛУНЯ	Бударка, казарка, попелиці, яблуневий квіткоїд, плодожерки, листовійки, довгоносик сірий бруньковий, яблуневий плодовий пильщик, совки	3/20		

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ: Оптимальні години для проведення захисних робіт — з 6:00 до 9:00 або з 19:00 до 23:00 у безвітряну суху погоду при температурі не вище за +25 °С. Захисна зона для вильоту бджіл — не менше як 4 км. Терміни обмеження для вильоту бджіл — не менше як 4 доби.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 200 л/га для овочевих культур відкритого ґрунту; 500–1000 л/га для культур захищеного ґрунту; 800–1200 л/га для плодово-ягідних культур залежно від об'єму крони дерева; 600–800 л/га для виноградників; 600–1000 л/га для плодово-ягідних культур.



Рекомендовано засіб індивідуального захисту
Наприклад:
Напівмаска з фільтром 3М 2128



ПОДВІЙНА ВПЕВНЕНІСТЬ У РЕЗУЛЬТАТІ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Енжіо® 247 SC, KC
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	141 г/л тіаметоксаму, 106 г/л лямбда-цигалотрину
	ХІМІЧНА ГРУПА	Неонікотиноїди, піретроїди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	5 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Поєднання потужного нокдаун-ефекту з тривалим періодом захисту внаслідок вираженої системної дії та якісної токсикації рослин
- ✓ Ефективний проти широкого спектра шкідників, зокрема проти хлібного туруна та інших прихованоживучих, незалежно від погодних умов
- ✓ Унікальна технологія зеон-капсуляції забезпечує стійкість до УФ-випромінювання та запобігає змиванню опадами уже навіть через годину після обробки
- ✓ Зручний і безпечний у бакових сумішах
- ✓ Дві діючі речовини з різними механізмами дії унеможливають виникнення резистентності

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА*	Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, цикадки	Обприскування в період вегетації	0,18	2/20
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА	Хлібний турун		0,25–0,4	1/–
ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ	Попелиці, хлібні клопи, п'явиці, блішки, трипси, цикадки, ячмінний мінер, хлібні жуки		0,18–0,22	2/20
ЯЧМІНЬ ЯРИЙ	Злакові мухи, цикадки, п'явиці, попелиці, трипси, блішки, ячмінний мінер		1/20	
БУРЯКИ ЦУКРОВІ	Звичайний і сірий бурякові довгоносики, щитоноски, блішки, листкова бурякова попелиця		0,18	2/20
ВИНОГРАДНИКИ	Листкова філоксера, багатоїдний трубкокрут, скосар кримський			

* У тому числі авіаметодом.



Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ГОРОХ	Горохова попелиця, горохова зернівка, горохова плодожерка	Обприскування в період вегетації	0,18	2/20
ЯБЛУНЯ	Сірий бруньковий довгоносик (брунькоїд), казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач, яблунева зелена попелиця			
КАРТОПЛЯ	Колорадський жук			
ЦИБУЛЯ	Цибулева муха, трипси		0,18	2/14
КАПУСТА	Хрестоцвіті блішки, капустина попелиця, білани, капустина міль, капустина совка		0,18	2/14
ТОМАТИ	Колорадський жук, велика картопляна попелиця		0,18	2/20
СОНЯШНИК	Геліхризова попелиця, шипоноско соняшникова		0,18	2/-
СОРГО	Злакові попелиці		0,2–0,25	2/30
	Стебловий кукурудзяний метелик		0,18	2/-
ХМІЛЬНИКИ	Хмелева попелиця, великий люцерновий довгоносик, хмелева блішка, зелена цикадка, стебловий метелик		0,18	2/-
ЗЕМЛІ НЕСІЛЬСЬКОГОС-ПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ	Саранові (личинки молодших віків)	0,18	2/-	
САДЖАНЦІ ХВОЙНИХ ПОРІД	Соснові пильщики (звичайний і рудий), златки, сосновий підкоровий клоп	0,18	2/-	

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Не застосовувати в екстремальних погодних умовах, коли комахи перебувають у неактивному стані. **Енжіо**® досить ефективний при порівняно низьких температурах, на відміну від інших інсектицидів. Проте оптимальна температура застосування — від +8 °С до +25 °С.

Для досягнення високої ефективності проти видів попелиць на польових культурах потрібно забезпечити завчасну токсикацію рослин до початку заселення. З огляду на це **Енжіо**® слід застосовувати профілактично, за 5–7 днів до моменту появи колоній попелиць на рослинах (для визначення ймовірності й часу заселення посівів зернових злакових культур у конкретних регіонах рекомендовано користуватися сервісом прогнозу вірогідності появи шкідливих організмів від компанії «Сингента» agrorognoz.com.ua) або при появі перших крилатих самиць-перселенок попелиць.

ЗЕОН-ТЕХНОЛОГІЯ: Препаративну форму **Енжіо**® виготовлено за зеон-технологією. Це концентрат мікрокапсульованої суспензії, що забезпечує подовжену дію піретроїдного складника за рахунок його фотостабільності та стійкості препарату до опадів.

СУМІСНІСТЬ: **Енжіо**® можна змішувати із загальнозживаними гербіцидами, фунгіцидами, регуляторами росту рослин на відповідних культурах. При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватись рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші. За відсутності таких рекомендацій препарати слід перевіряти на сумісність експериментальним способом.







РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 150–200 л/га для польових культур, 200–400 л/га для овочевих культур відкритого ґрунту, 400–800 л/га для культур захищеного ґрунту, 800–1200 л/га для плодово-ягідних культур залежно від об'єму крони дерева, 600–800 л/га для виноградарників.



Карате® Зеон

МІКРОКАПСУЛИ З МАКРОЕФЕКТОМ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Карате® Зеон 050 CS, СК
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	50 г/л лямбда-цигалотрину
	ХІМІЧНА ГРУПА	Піретроїди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Мікрокапсульована водна суспензія
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Контролює широкий спектр шкідників, серед яких певні види кліщів
- ✓ Має високу початкову ефективність — нокдаун-ефект
- ✓ Унікальна технологія зеон-капсуляції забезпечує кращу стабільність за будь-яких погодних умов і тривалішу дію за рахунок фотостабільності діючої речовини

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА*	Хлібні жуки, блішки, трипси, п'явиці, клоп шкідлива черепашка, попелиці, озима совка	Обприскування в період вегетації	0,15–0,3	2/20
ПШЕНИЦЯ ЯРА	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, хлібні жуки, пшеничний трипс		0,15–0,2	1/20
ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ І ЯРИЙ	Блішки, п'явиці, пшеничний трипс, хлібні клопи, злакові попелиці		0,15–0,3	2/30
РІПАК	Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, клопи, попелиці		0,15	2/14
БУРЯКИ ЦУКРОВІ	Щитоноски, блішки, попелиці		0,125–0,15	1/20
ГОРОХ	Горохова попелиця, гороховий зерноїд		0,125	2/14
КУКУРУДЗА	Стебловий кукурудзяний метелик Західний кукурудзяний жук		0,2–0,3	2/30
СОРГО	Попелиці, цикадки, стебловий кукурудзяний метелик		0,2	2/20
РИС	Рисовий комарик, ячмінний мінер		0,2	1/–
ЦИБУЛЯ	Цибулева муха			2/10

* У тому числі авіаметодом.



Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ЯБЛУНЯ	Яблунова плодожерка, листовійки	Обприскування в період вегетації	0,4	2/14
КАРТОПЛЯ	Комплекс шкідників		0,1	2/14
ТОМАТИ, БАКЛАЖАНИ				1/7
ОГІРКИ	Попелиці, трипси		0,3	1/14
ПЕРСИК	Східна плодожерка		0,15	2/14
ДИНЯ	Динна муха		0,15–0,2	2/20
ВИНОГРАД	Листовійки, ріпаковий квіткоїд		0,15	2/14
ЛЬОН-ДОВГУНЕЦЬ	Блішки		0,15–0,4	1/–
РІЗНОТРАВ'Я (ДИКА РОСЛИННІСТЬ)	Стадні й нестадні саранові			

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю пестицидів. При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватись рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші. За відсутності таких рекомендацій препарати слід перевіряти на сумісність експериментальним способом.

Партнер для фосфорорганічних сполук: використання **Карате® Зеон** у суміші з препаратами на основі фосфорорганічних сполук (наприклад, з **Актеллік®**) має певну синергічну дію і підвищує ефективність проти цільових об'єктів порівняно з окремим внесенням препаратів.

Використання в саду. **Карате® Зеон**, на відміну від інших піретроїдних сполук, має акарицидну дію на певні види кліщів.

МІКРОКАПСУЛЯЦІЯ ЗА ЗЕОН-ТЕХНОЛОГІЄЮ: Мікрокапсуляція за зеон-технологією зумовлює більшість переваг препарату, адже за рахунок полімерних капсул **Карате® Зеон** стає безпечнішим для користувачів і фотостабільнішим, а його захисний термін подовжується до 7–8 днів.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: **Карате® Зеон** слід застосовувати при температурі не вище за +25 °С.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 200–400 л/га для польових і овочевих культур, 800–1000 л/га для виноградників, 600–1000 л/га для садів.











Лірум®

СТРАЙК ШКІДНИКАМ У САДУ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Лірум® 78 SC, к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	60 г/л циантраніліпролу, 18 г/л абаментину
	ХІМІЧНА ГРУПА	Діаміди, авермектини
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	5 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Унікальний продукт, який поєднує властивості інсектициду й акарициду
- ✓ Трансламінарна дія: повністю проникає в рослинні тканини протягом двох годин. Завдяки цьому ефективність не залежить від високих температур і дощу
- ✓ Відмінно контролює лускокрилих, усі види кліщів, мінерів, трипсів і медяниць
- ✓ Високоєфективний за будь-яких, зокрема високих (понад +35 °С), температур
- ✓ Забезпечує подовжений захист рослини (ефективний проти личинок, які відродилися з оброблених яєць)
- ✓ Швидке припинення живлення для шкідників і тривала захисна дія — 20 днів
- ✓ Не має фітотоксичності на чутливих культурах і сортах, не утворює на плодах «сітку»
- ✓ Комбінація двох діючих речовин забезпечує неперевершений контроль усіх видів сисних і листогризухих шкідників
- ✓ Нове рішення проти плодожерки 2–3-го покоління, мінуючих молей та кліщів з додатковою профілактичною дією на попелиць



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ЯБЛУНЯ	Кліщі, яблунова плодожерка, листовійки, мінуючі молі, попелиці	Обприскування в період вегетації	1,2–1,5	2/14
КАПУСТА, ЦИБУЛЯ	Трипс		1,25–1,5	3/14

СУМІСНІСТЬ: Препарат можна змішувати з іншими загальнозживаними пестицидами на відповідній культурі. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:

Для яблуні — 600–1000 л/га залежно від об'єму крони дерева. Для овочів — 200–400 л/га.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ:

Оптимальний час для проведення захисних робіт — з 6:00 до 9:00 або з 20:00 до 24:00 у безвітряну суху погоду, за температури не вище ніж +25 °С.







СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: Для застосування препарату рекомендуються тракторні вентиляторні обприскувачі. Обладнання для обприскування має бути ретельно відкаліброване перед використанням з урахуванням швидкості пересування обприскувача, швидкості подачі розчину і рівномірності його розподілу. Відрегулюйте об'єм робочої рідини згідно з нормою витрат на культурі. Слід уникати використання великих об'ємів робочої рідини з метою мінімального забруднення ґрунту.





ШИРОКИЙ КРОК ДО ЯКОСТІ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Люфокс® 105 ЕС, к. е.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	75 г/л феноксикарбу, 30 г/л люфенурону
	ХІМІЧНА ГРУПА	Карбамати, бензаміди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Висока ефективність проти шкідників за рахунок поєднання двох діючих речовин
- ✓ Потужна овіцидна дія (на яйцекладку до 5–7 днів)
- ✓ Має ларвіцидну дію — порушує процеси линьки гусени
- ✓ Має стерилізуючий ефект на імаго (при безпосередньому контакті)
- ✓ Не має фітотоксичної дії (не утворює «сітки» навіть на плодах високочутливих сортів)
- ✓ Безпечний для людей і корисної ентомофауни
- ✓ Неперевершена дія на першу генерацію плодожерок і листовійок



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ГРУША	Яблунева плодожерка, грушева плодожерка, грушева медяниця, щитівки, кліщі	Обприскування в період вегетації, у фазі розпускання бруньок — рожевий бутон	1,0	2/30
ЯБЛУНЯ	Плодожерка, листовійки, кліщі, щитівки	Обприскування в період вегетації		
ВИНОГРАД	Гронова листовійка, 1 генерація		0,5	
	Гронова листовійка, 2–3 генерації			

ОПТИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН ЗАСТОСУВАННЯ: Для досягнення найвищої ефективності **Люфокс**® рекомендується вносити під час піку льоту шкідників (яблунева і грушева плодожерки), тобто за 3–5 днів до початку масової яйцекладки.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:

1000 л/га — сади. У разі зменшення використання рекомендованого об'єму води (залежно від об'єму крони) норму використання препарату зменшувати не рекомендується.







600–800 л/га для виноградників.





ОБИРАЙ БЕЗПЕКУ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Матч® 050 ЕС, к. е.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	50 г/л люфенурону
	ХІМІЧНА ГРУПА	Бензаміди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Має потужну ларвіцидну дію і стерилізуючий ефект на імаго, а також овіцидну дію на свіжу яйцекладку (до 48 годин)
- ✓ Стійкий до змивання дощем
- ✓ Має сильну і подовжену трансламінарну активність
- ✓ Не має фітотоксичної дії (не утворює «сітки» навіть на плодах високочутливих сортів)
- ✓ Безпечний для людей і корисної ентомофауни

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ЯБЛУНЯ	Плодожерки, листовійки, молі	Обприскування в період вегетації	1,0	3/30
ВИНОГРАДНИКИ	Гронова листовійка			
КАПУСТА	Білани, капустяна совка, капустяна міль		0,4	2/14
ТОМАТИ	Совка карадрина та інші види			
РІЗНОТРАВ'Я, ДИКА РОСЛИННІСТЬ	Нестадні саранові, личинки 1–3 віків	0,15	1/–	

ОПТИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН ЗАСТОСУВАННЯ: Для досягнення найвищої ефективності від використання **Матч®** препарат рекомендується вносити безпосередньо перед початком масової яйцекладки — у період відродження личинок шкідника.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:

1000 л/га — сади. У разі зменшення використання рекомендованого об'єму води (залежно від об'єму крони) норму використання препарату зменшувати не рекомендується.

250–300 л/га — капуста, томати.

600–800 л/га — виноградники.



НОВИЙ









Нуредін™ Супер

КЕ

КОМБІНОВАНИЙ ІНСЕКТИЦИД ШИРОКОГО СПЕКТРА ДІЇ ДЛЯ БОРОТЬБИ З БАГАТЬМА ВИДАМИ ГРИЗУЧИХ І СИСНИХ ШКІДНИКІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Нуредін™ Супер КЕ
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	400 г/л хлорпірифосу, 20 г/л біфентрину
	ХІМІЧНА ГРУПА	Фосфорорганічні сполуки + піретроїди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	КЕ (концентрат, що емульгується)
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II, алерген
	УПАКОВКА	5 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Поєднання нокдаун-ефекту з подовженим періодом захисної дії
- ✓ Наявність «важкої» парової фази (фумігантного ефекту), що дозволяє контролювати прихованоживучих шкідників у поверхневому шарі ґрунту та в інших важкодоступних місцях
- ✓ Універсальне антирезистентне рішення на багатьох культурах завдяки комбінації двох діючих речовин із різних хімічних груп
- ✓ Підвищена термостабільність — можливість контролювати шкідників в неоптимальні терміни (при понижених температурах середовища)
- ✓ Виражена акарицидна дія проти широкого спектра рослинотних кліщів (в обох активних сполук)



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
КУКУРУДЗА*	Стебловий кукурудзяний метелик, лучний метелик, бавовникова совка	Обприскування в період вегетації	0,75–1,25	2/30
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА, ЯЧМІНЬ ЯРИЙ	П'явиці, попелиці, клоп-черепашка	Обприскування в період вегетації	0,4–1,0	1/30
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА	Хлібна жужелиця		1,0	1/30
СОНЯШНИК*	Бавовникова совка, лучний метелик, стебловий кукурудзяний метелик, соняшникова вогнівка, соняшникова шипоноська, попелиці	Обприскування в період вегетації	0,75–1,25	2/30
ЦУКРОВІ БУРЯКИ	Довгоносики, щитоноски	Обприскування сходів культури	0,8	1/40
СОЯ	Акацієва вогнівка, соєва плоджерка, совки, клопи, п'ядуни, трипси, кліщі	Обприскування в період вегетації	0,75–1,25	1/30
РІПАК	Хрестоцвіті блішки, прихованохоботники, ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик		0,4–0,75	2/30

* У тому числі авіаметодом.

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ЯБЛУНЯ	Зелена яблунова попелиця, листовійки	Обприскування в період вегетації	1,0–1,25	2/20
	Сірий бруньковий довгоносик (брунькоїд), казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблунева плоджерка, мінуючі молі		1,25–1,5	2/20
ВИНОГРАД	Гронова листовійка		0,75–1,25	2/30
	Павутинні кліщі			1/30

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:

500–1000 л/га — для яблуні, винограду.

200–400 л/га — наземними обприскувачами для польових культур.

50–100 л/га — авіаційним методом.

СУМІСНІСТЬ: Препарат можна змішувати з багатьма пестицидами, крім сульфонілсечовинних гербіцидів, грамініцидів та високолузних речовин. Перед приготуванням бакової суміші з окремих препаратів у кожному конкретному випадку слід попередньо перевіряти їх фізико-хімічну сумісність у малій посудині.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ: Оптимальний час для проведення обробок — з 6:00 до 9:00 або з 20:00 до 24:00 у безвітряну суху погоду.

Інсектицидна дія препарату починається вже від температури +8 °С. Оптимальний температурний режим для досягнення максимальної ефективності — +10...25 °С (коли шкідливі комахи найактивніші). Обприскування рослин при температурі вище за +15 °С істотно посилює фумігантну активність препарату. Препарат не слід застосовувати при температурі вище за +25 °С.

У рекомендованих нормах витрати препарат не є фітотоксичним для оброблюваних культур.

Препарат токсичний для бджіл, тому його не слід застосовувати під час цвітіння комахозапильних рослин/культур.





БЕЗКОМПРОМІСНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІПАКОВОГО КВІТКОЇДА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Пленум® 50 WG, ВГ
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	500 г/кг піметрозину
	ХІМІЧНА ГРУПА	Піридинкарбоксаміди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Гранули, що диспергуються у воді
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	1 кг

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Новий клас інсектицидів з унікальним механізмом дії — запобігає виникненню резистентності до інших хімічних груп
- ✓ Ефективно працює по популяціях шкідників, резистентних до піретроїдів і неонікотиноїдів
- ✓ Має відлякувальну дію на жуків ріпакового квіткоїда — зберігає посіви від повторного заселення
- ✓ Знищує шкідника за умови раннього заселення при обробці по бутонах ще до їх розкриття — зберігає майбутній урожай
- ✓ Має високу термостабільність — здатний ефективно працювати навіть за високих денних температур


ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, кг/га	Кратність обробок / Термін очікування
РІПАК ОЗИМИЙ І ЯРИЙ	Ріпаковий квіткоїд	Обприскування в період вегетації, починаючи від фази зеленого бутона й до жовтого бутона	0,15–0,25	1/–

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ: Пленум® — інноваційний контактний-системний інсектицид для тривалого захисту озимого і ярого ріпаку від ріпакового квіткоїда з високою ефективністю в широкому діапазоні температур.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Оптимальна температура застосування — від +10 °C до +25 °C.







РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 200–300 л/га.



Проклейм®

НАДІЙНИЙ ІНСЕКТИЦИД ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Проклейм® 5 SG, р. г.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	50 г/кг емаметину бензоату
	ХІМІЧНА ГРУПА	Авермектини
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Водорозчинні гранули
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	1 кг



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Захист від приховано- і відкритоживучих лускокрилих шкідників
- ✓ Починає діяти з фази яйця — має пряму овіцидну дію
- ✓ Проникає в рослину протягом двох годин, утворюючи резервуари з діючою речовиною
- ✓ Ефективність не залежить від високих температур, дощу та кислотності робочого розчину
- ✓ Короткий термін очікування
- ✓ Сумісний з біозахистом
- ✓ Найефективніша дія на 2-гу і 3-тю генерації плодожерки та листовійки



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, кг/га	Кратність обробок / Термін очікування
ЯБЛУНЯ	Плодожерки, листовійки, мінуючі молі	Обприскування в період вегетації	0,4–0,5	2/14
ВИНОГРАД	Гронова листовійка		0,3–0,4	
КАПУСТА	Капустяна міль, капустяна совка, капустяний і ріпаковий білани		0,2–0,3	
ТОМАТИ ВІДКРИТОГО Й ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ	Бавовникова совка, листогризучі совки, трипси		0,3–0,4	2/5
ПЕРСИК	Плодожерки, листовійки, мінуючі молі		0,4–0,5	2/14
ЧЕРЕШНЯ	Вишнева муха, листовійки, молі		0,4–0,5	2/14

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ: Трансламіна́рний інсектицид природного походження, проникаючи всередину рослинних тканин, утворює резервуари, які містять емаметин бензоат. Завдяки цьому ефективність препарату не залежить від високих температур і дощу та забезпечує захист рослин від пошкоджень до 15 діб.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 250–300 л/га для овочевих культур відкритого ґрунту, 400–800 л/га для овочевих культур закритого ґрунту, 800–1200 л/га для садів залежно від об'єму крони дерева, 600–800 л/га для виноградників. Для підвищення ефективності препарату проти шкідників бажано застосовувати робочий розчин уранці, ввечері або в похмуру погоду.

Найкращий період застосування проти плодожерки та листовійки — початок відродження гусениць









Рекомендовано засіб індивідуального захисту
Наприклад:
Повнолицьова маска з фільтром ЗМ 6035 РЗ

syngenta



ПОТУЖНИЙ ЗАХИСТ СХОДІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Форс® 1,5 G, г.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	15 г/кг тефлутрину
	ХІМІЧНА ГРУПА	Піретроїди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Гранули
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	20 кг



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Захищає від усіх ґрунтових шкідників, крім нематод
- ✓ Гарантує високу польову схожість насіння (не має фітотоксичності)
- ✓ Тривала захисна дія (до 30–50 днів залежно від норми витрати)
- ✓ Не розчиняється у воді і не вимивається в нижні шари ґрунту

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, кг/га	Кратність обробок / Термін очікування
ЦУКРОВІ БУРЯКИ	Комплекс ґрунтових шкідників, бурякова крихітка	Внесення в ґрунт при сівбі культури	4,5–6,0	1/–
ПОЛУНИЦЯ	Комплекс ґрунтових шкідників (личинки ґрунтових шкідників — хрущів, коваликів)	Внесення гранульованого препарату в лунки (в рядок) при висадці розсади	10,0–12,0	1/30
КАРТОПЛЯ	Комплекс ґрунтових шкідників	Внесення в ґрунт при сівбі культури	5,0–15,0	1/30
ТОМАТИ, КАПУСТА			5,0–8,0	
РІПАК				
СОНЯШНИК				
СОЯ	Дротяники		6,0–8,0	1/–
КУКУРУДЗА	Західний кукурудзяний жук, ґрунтові шкідники		12,0–15,0	

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Для правильного (якісного) застосування препарату **Форс® 1,5 G** рекомендується використовувати спеціальні аплікатори.



Про інсектициди

Живлення комах вегетативними або генеративними органами рослин призводить як до прямих утрат урожаю і зниження його якості, так і до поширення ними вірусних і грибкових хвороб. Контроль шкідників за допомогою інсектицидів запобігає цим утратам

Залежно від шляхів потрапляння в організм комах інсектициди поділяють на три групи — кишкові, контактні, фуміганти. Ця класифікація досить умовна, адже більшість інсектицидів може потрапляти в організм комах кількома шляхами, проте домінує, як правило, один, а решта побічні. Знання шляху потрапляння інсектициду в організм комах допомагає максимально ефективно визначити час застосування препарату проти найвразливішої стадії розвитку комах. Знання механізму дії інсектициду допомагає організувати науково обґрунтовану ротацію інсектицидів або їх сумішей проти певних шкідників з метою запобігти виникненню у них резистентності. Залежно від механізму дії інсектициди поділяють на групи (див. табл. Механізм дії основних класів інсектицидів).

Ротацію інсектицидів у часі проти одного і того самого шкідника, а також планування бакових сумішей слід проводити з урахуванням наведеної таблиці, яку складено згідно з рекомендаціями Комітету з протидії виникненню резистентності до інсектицидів (IRAC). При цьому що більша різниця в номерах групи інсектицидів, то менший ризик виникнення резистентності.

МЕХАНІЗМ ДІЇ ОСНОВНИХ КЛАСІВ ІНСЕКТИЦИДІВ

IRAC група	Механізм дії	Хімічна група	Діюча речовина	Інсектициди компанії «Сингента»
1B	Інгібітори ацетилхолінестерази	Фосфорорганічні сполуки	Піриміфос-метил	Актеллік®
			Хлорпірифос	Нуредін™ Супер KE
3A	Модулятор натрієвих каналів	Піретроїди	Лямбда-цигалотрин	Ампліго®, Енжіо®, Карате® Зеон
			Тефлутрин	Форс® 1,5 G
			Біфентрин	Нуредін™ Супер KE
4A	Антагоністи нікотинічних ацетилхолінових рецепторів	Неонікотиноїди	Тіаметоксам	Актара® 25 WG, Енжіо®, Воліам Флексі®
6	Активатор хлор каналів	Авермектини	Емабектин бензоату	Проклейм®
			Абабектин	Вертимек®, Лірум®
7B	Імітатор ювенільного гормону комах	Феноксикарб	Феноксикарб	Люфокс®
9	Селективні блокатори живлення	Піридинкарбоксаміди	Піметрозин	Пленум®
15	Інгібітори синтезу хітину типу 0	Бензоїламіди	Люфенурон	Люфокс®, Матч®
28	Модулятор ріанодін рецепторів	Діаміди (антраніламіди)	Хлорантраніліпрол	Ампліго®, Воліам Флексі®
			Циантраніліпрол	Лірум®

РЕТАРДАНТИ

Моддус® 250 EC, к. е.....	98
Сетар® 375 SC, к. с.....	99
Сетар® будує та лікує	100
Про ретарданти	101













АРХИТЕКТОР ПОСІВІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Моддус® 250 ЕС, к. е.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	250 г/л трінексапак-етилу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Циклогександіони
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Покращує розвиток кореневої системи та збільшує кількість цукрів у рослині
- ✓ Посилює стійкість стебла до вилягання за рахунок скорочення довжини міжвузлів і потовщення стінок стебла
- ✓ Покращує засвоєння вологи протягом вегетації в посушливих умовах
- ✓ Дозволяє ефективніше використати генетичний потенціал культури

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА	Інгібування росту рослин, підвищення врожайності	Обприскування в період вегетації	0,4–0,6*
ЯЧМІНЬ ЯРИЙ			0,4–0,6*
ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ			0,4–0,8*

* Можливе дробне внесення.

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю пестицидів. Безпечно для культури можна використовувати в бакових сумішах з гербіцидами **Дербі®**, **Пріма™ Форте**, **Пік®**, **Логран®**, фунгіцидами **Амістар® Екстра**, **Амістар® Тріо**, **Елатус® Ріа**, **Тілт® Турбо**, **Тілт®**, **Альто® Супер**, **Міравіс® Нео**, інсектицидами **Енжіо®**, **Карате® Зеон**.

При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватися рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ: Не рекомендується застосовувати **Моддус®** у стресових умовах розвитку рослин (посуха, температурний стрес, гербіцидне пригнічення).

Осіньне застосування:

- Додає цукрів у вузлах кущення на 2,5 % на суху речовину
- Додає маси кореневої системи рослин на 15 %
- Збільшує коефіцієнт кущення на 20 %

Весняне застосування:

- Гармонізує продуктивне кущення
- Запобігає виляганням
- Підвищує стійкість рослин до стресів

Проти вилягання оптимальна фаза застосування — поява 1-го вузла ВВСН 31. Норми: пшениця — 0,4–0,6 л/га, ячмінь — 0,4–0,8 л/га.

Для скорочення підколосового міжвузля доцільна повторна обробка для ячменю у фазі підпрапорцевого листка ВВСН 37 у нормі 0,2 л/га.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Від +8 °С, але не вище за +25 °С.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 200–300 л/га.



Рекомендовано засіб індивідуального захисту
Наприклад:
Повнолицьова маска з фільтром та префільтром
ЗМ 6000 + 6059 + 5925 (P2)



Перед застосуванням уважно прочитайте тарну етикетку



БУДУЄ ТА ЛІКУЄ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Сетар® 375 SC, к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	250 г/л дифеноконазолу, 125 г/л паклобутразолу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Триазоли
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Відмінне рішення для першої обробки соняшнику
- ✓ Забезпечує кращу зимівлю озимого ріпаку
- ✓ Синхронізує цвітіння та дозрівання ріпаку
- ✓ Безпечний для урожаю — відсутні залишки діючих речовин у насінні



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
РІПАК ЯРИЙ	Одночасне цвітіння, фомоз, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	0,3–0,5	1–2 / не встановлюється
РІПАК ОЗИМИЙ	Одночасне цвітіння, інгібування росту рослини та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов	Осіньне внесення у фазі 4–5 листків Навесні — у фазі видовження стебла, за висоти рослин 15–25 см		
СОНЯШНИК	Фомоз, септоріоз, альтернаріоз, регуляція ростових процесів	Обприскування в період вегетації		

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю фунгіцидів, інсектицидів та добривами. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ: Сетар® інгібує ріст вегетативних органів, не порушуючи процес накопичення поживних речовин. Унаслідок цього у ріпаку краще розвивається коренева система і суттєво збільшується накопичення різних пластичних речовин, що сприяє кращій зимівлі культури та підвищенню врожайності. Як фунгіцид Сетар® має найкращий ефект контролю фомозу, знищує збудників інших хвороб ріпаку. Діючі речовини препарату мають системну дію, рослина поглинає їх протягом двох годин.

На соняшнику Сетар® має відмінну ефективність проти основних плямистостей листя — септоріозу, альтернаріозу та фомозу. Як регулятор росту Сетар® сприяє кращому розвитку кореневої системи, потовщенню стебла та вповільнює ріст рослин у висоту.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Оптимальна температура для застосування від +8 °C до +25 °C.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 200–400 л/га.



Рекомендовано засіб індивідуального захисту
Наприклад:
Повнолицьова маска з фільтром та предфільтром
ЗМ 6000 + 6059 + 5925 (P2)

Сетар® будує та лікує

Сетар® — це гармонійне поєднання фунгіциду і регулятора росту, що допомагає ріпаку добре перезимувати та примножити свій потенціал.


- ✓ Ефективно захищає від хвороб
- ✓ Регулює ростові процеси, робить рослину коренастою і стійкою до зимових стресів
- ✓ Додає маси кореневої системи — до 30 %
- ✓ Додає антифризу — цукрів до 3,5 %, що покращує морозостійкість

Одна з ключових переваг Сетар® — діючі речовини Сетар® не залишаються в продукції, отже, не буде жодних проблем з експортом ріпаку, на відміну від окремих росторегуляторів, залишки яких в урожаї не допускаються для експорту в країни ЄС (наприклад, хлормекватхлорид, який може накопичуватися в насінні ріпаку більше як 2 мг/кг).

Сетар® — справді комплексне рішення для застосування на соняшнику.

Серед особливостей і переваг на соняшнику варто виділити такі:

1. Дифеноконазол, який міститься в **Сетар®**, відмінно контролює основних збудників захворювань, характерних для ранніх стадій розвитку соняшнику, — септоріозу, альтернаріозу й фомозу.
Тому Сетар®, крім впливу на морфологію рослини, забезпечує повноцінний фунгіцидний захист.
2. **Сетар®** за принципом дії — інгібітор синтезу гіберелінових кислот, тобто гормонів росту. Наслідком зміни гормонального балансу в рослині є сповільнення їхнього росту у висоту.
Результат перерозподілу пластичних речовин — зміцнення стебла й кращий розвиток кореневої системи.
3. Оптимальна фаза розвитку рослин для застосування першого фунгіциду і для регуляторів росту — фаза 6–8 листочків.



4. Безпеку **Сетар®** для соняшнику підтверджено роками випробувань у різних агрокліматичних зонах.
5. Ефективність ретардантів на соняшнику залежить від багатьох чинників, як-от особливості гібрида, фон мінерального живлення, кількість опадів, густота посіву.

Чому Сетар® було зареєстровано на соняшнику?

Розширення реєстрації **Сетар®** на соняшник — наслідок підвищення інтенсивності технології вирощування соняшнику, збільшення кількості використовуваних добрив та зростання тиску захворювань на ранніх стадіях розвитку. За таких умов потрібен не тільки надійний фунгіцидний захист, а й вплив на морфологію рослин для збереження й реалізації потенціалу врожайності та підвищення стійкості до несприятливих умов.

Про ретарданти

Серед регуляторів росту (ретардантів) на ринку України відомі ретарданти зернових і ретарданти для ріпаку та соняшнику. Вони належать до різних хімічних груп і застосовуються на різних культурах, але більшість із них має аналогічний механізм дії. Останній тісно пов'язано з гормонами росту рослин — гіберелінами. Гібереліни відповідають за ріст і розтягування стебла рослин. На зернових ці сполуки зумовлюють так званий інтеркалярний (вставковий) ріст та відповідають за довжину стебла між сусідніми міжвузлями. Ретарданти, які застосовуються на зернових культурах, впливають на різні етапи біосинтезу гіберелінів, унаслідок чого цей процес зупиняється і відстань між міжвузлями скорочується

Моддус[®] з'явився в портфелі компанії «Сингента» в Україні 2010 року. На відміну від препаратів на основі хлормекват-хлориду й азолів, діюча речовина препарату **Моддус**[®] — тринексипак-етил — зупиняє синтез гіберелінів на найранішому етапі. Завдяки цьому у культури істотно потовщуються стінки соломини, відстань між міжвузлями скорочується, що спричиняє активний розвиток кореневої системи. Саме ця риса вирізняє **Моддус**[®] серед інших регуляторів росту зернових. Рослина стає міцнішою, що перешкоджає вилягання, а за рахунок збільшення об'єму кореневої системи набагато покращується засвоєння поживних речовин і вологи з ґрунту. Вилягання посівів викликають два головні чинники. Перший пов'язано з довжиною, міцністю й діаметром стебла: що воно тонше і меншого діаметра, то швидше проявляється так зване стеблове вилягання. Другий чинник — міцність, кількість (об'єм) і довжина кореневої системи. Погано розвинена коренева система зернових зумовлює кореневе вилягання. При застосуванні препарату **Моддус**[®] нічого подібного не відбувається. Навпаки, його дію спрямовано на:

- ✓ скорочення і зміцнення стебла,
- ✓ покращення і збільшення кореневої системи,
- ✓ економію вологи протягом вегетації в посушливих умовах,
- ✓ покращене накопичення цукрів (для покращення зимостійкості та стійкості до інших стресових умов).


Моддус[®] зареєстровано на озимій пшениці та озимому і ярому ячмені. Норма застосування — 0,2–0,8 л/га. Чому така велика різниця? Річ у тім, що **Моддус**[®] рекомендовано застосовувати не тільки одноразово (як правило, у кінці фази кушіння зернових), а й дробно. Скажімо, на озимій пшениці й озимому ячменю популярне внесення 0,2–0,4 л/га у фазі кінець кушіння — початок виходу в трубку і вдруге 0,2 л/га перед самою появою прапорцевого листка.

ФУНГІЦИДИ

Альто® Супер 330 EC, к. е.	106	Міравіс® Нео 300 SE, CE	122
Амістар® Екстра 280 SC, к. с.	107	Міравіс® 200 SC, к. с.	124
Амістар® Голд 250 SC, КС	108	Міравіс® Прайм 400 SC, к. с.	126
Тести, що наглядно демонструють різницю застосування Амістар®-технології та генериків	110	Ревус® Топ 500 EC, к. с.	127
Оригінальна Амістар®-технологія чи аналоги та генерики?	111	Орондіс® Ультра 280 SC, к. с.	128
Амістар® Тріо 255 EC, к. е.	112	Ридоміл® Голд МЦ 68 WG, в. г.	130
Діналі® 90 DC, КД	113	Ріас™ 300 EC, KE	131
Елатус® Ріа	114	Світч® 62,5 WG, в. г.	132
Факти про Елатус® Ріа	115	Скор® 250 EC, к. е.	133
Квадріс® 250 SC, к. с.	116	Тілт® 250 EC, к. е.	134
Квадріс® Топ 325 SC, к. с.	117	Тілт® Турбо 575 EC, KE	135
Магнелло® 350 EC, KE	118	Тіовіт Джет® 80 WG, в. г.	136
Пергадо® R 270 WG, ВГ	119	Топаз® 100 EC, к. е.	137
Новітня розробка з найширшим спектром контрольованих збудників на різних культурах — АДЕПІДІН™	120	Хорус® 75 WG, в. г.	138
		Циделі™ Топ 140 DC, КД	140
		Ширлан™ 500 SC, к. с.	141
		Юніформ® 446 SE, CE	142
		Про фунгіциди	144







Новий рівень захисту колоса вже у сезоні 2023











Альто® Супер

ЕТАЛОН ВАШОГО ДОБРОБУТУ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Альто® Супер 330 ЕС, к. е.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	80 г/л ципроконазолу, 250 г/л пропіконазолу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Триазоли
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	20 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Широкий спектр контрольованих хвороб
- ✓ Швидка лікувальна й викорінювальна дія дозволяє попередити проникнення збудника та зупинити його розвиток навіть після ураження рослини
- ✓ Містить високосистемні діючі речовини, які швидко проникають і поширюються по всій рослині, захищаючи нові листки

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА*	Бура, стеблова й жовта іржа, борошниста роса, церкоспорельоз, гельмінтоспориоз, септоріоз листя, септоріоз і фузаріоз колосу	Обприскування в період вегетації	0,4–0,5	2/30
ЯЧМІНЬ ЯРИЙ*	Бура іржа, борошниста роса, плямистості листя			
БУРЯКИ ЦУКРОВІ*	Церкоспороз, борошниста роса		0,5	

* У тому числі авіаметодом.

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю пестицидів. Безпечно для культури можна використовувати в бакових сумішах з гербіцидами **Дербі®**, **Пріма™ Форте**, **Пік®**, **Логран®**, інсектицидами **Енжіо®**, **Карате® Зеон**, регулятором росту **Моддус®**.

При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватися рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Найвища ефективність **Альто® Супер** досягається при застосуванні його на початкових стадіях розвитку хвороби.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Використовувати в діапазоні температур від +12 °С до +25 °С.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Штанговий обприскувач — 150–200 л/га, авіаобприскування — не менше як 50 л/га.



Рекомендовано засіб індивідуального захисту







Наприклад:
Повнолицьова маска з фільтром 3М 6059 ABEK1 + 3М 5935 P3



Перед застосуванням уважно прочитайте тарну етикетку

ЕКСТРА ВРОЖАЙ, ЕКСТРА ЯКІСТЬ, ЕКСТРА ПРИБУТОК

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Амістар® Екстра 280 SC, к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	80 г/л ципроконазолу, 200 г/л азоксистробіну
	ХІМІЧНА ГРУПА	Триазоли, стробілурини
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Превентивна дія проти широкого спектра хвороб
- ✓ Забезпечує подовження вегетації рослини, що збільшує урожайність
- ✓ Відмінна фотостабільність і тривалий період захисту



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
КУКУРУДЗА	Гельмінтоспоріозна й інші плямистості листя, іржа, фузаріоз, пухирчаста сажка	Обприскування в період вегетації	0,5–0,75	2/–
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА	Септоріоз, борошниста роса, бура листкова іржа, фузаріоз і септоріоз колосу, альтернаріоз			2/30
ЯЧМІНЬ ЯРИЙ	Борошниста роса, сітчаста, темно-бура, смугаста, облямівкова плямистості, септоріоз			2/–
БУРЯКИ ЦУКРОВІ	Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз		2/30	
РІПАК*	Фомоз, альтернаріоз, біла й сіра гнилі, пероноспороз		0,75–1,0	1–2/–
СОНЯШНИК	Фомоз, альтернаріоз, септоріоз, фомопсис, іржа, пероноспороз, борошниста роса		0,5–0,75	2/–
СОЯ	Пероноспороз, борошниста роса, фузаріоз, іржа			2/–
ГОРОХ І ГОРОХ ОВОЧЕВИЙ	Пероноспороз, борошниста роса, іржа, фузаріоз, аскохітоз			2/–

* У тому числі й авіаметодом.

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю пестицидів. Безпечно для культури можна використовувати в бакових сумішах з гербіцидами **Дербі®**, **Пріма™ Форте**, **Пік®**, **Логран®**, інсектицидами **Енжіо®**, **Карате® Зеон**, регулятором росту **Моддус®**. При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватися рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Найвища ефективність **Амістар® Екстра** досягається при застосуванні його на початкових стадіях розвитку хвороби.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Використовувати в діапазоні температур від +12 °С до +25 °С.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Штанговий обприскувач — 150–200 л/га.



Сервіс «Налаштування обприскувачів та перевірка якості внесення». Див. с. 167.

Сервіс «Прогнозування вірогідності появи хвороб і шкідників за допомогою метеорологічних предикторів». Див. с. 166.

Сервіс «Фітоекспертиза рослинного матеріалу». Див. с. 157.



Рекомендовано засіб індивідуального захисту
Наприклад:
Повнолицьова маска з фільтром 3М 6035 P3



ПЕРЕВІРЕНО.
ТЕХНОЛОГІЯ
Амістар



Амістар® Голд



ПЕРЕВІРЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВАШОГО ПОЛЯ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Амістар® Голд 250 SC, КС
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	125 г/л азоксистробіну, 125 г/л дифеноконазолу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Стробілурини, триазоли
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Надійний захист соняшнику, ріпаку, сої та цукрових буряків проти широкого спектра хвороб
- ✓ Тривалий захисний період
- ✓ Неперевершений профілактичний і лікувальний ефект завдяки трансламінарній і системній дії

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
СОНЯШНИК*	Альтернاریоз, фомоз, іржа, септоріоз, фомопсис, біла гниль	Обприскування в період вегетації	0,5–1,0	2/30
ЦУКРОВИЙ БУРЯК	Борошниста роса, церкоспороз, рамуляріоз, фомоз			
СОЯ	Борошниста роса, септоріоз, антракноз, аскохітоз, альтернاریоз, церкоспороз			
РІПАК ОЗИМИЙ	Фомоз, альтернاریоз, циліндроспоріоз, склеротиніоз, сіра гниль, борошниста роса		0,75–1,0	

* У тому числі авіаметодом.

Примітка: при авіаобробці регламенти застосування залишаються ті самі, що й для наземного внесення.

СУМІСНІСТЬ: Амістар® Голд можна змішувати з іншими загальнозживаними пестицидами на відповідній культурі.


Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 200–300 л при наземній обробці.


СПЕКТР ДІЇ: Амістар® Голд контролює всі основні грибкові хвороби соняшнику.



Фомоз




Септоріоз




Альтернاریоз



Фомопсис



Біла гниль



Іржа




ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: **Амістар® Голд** — фунгіцид із системною дією для застосування на соняшнику, ріпаку, сої та цукровому буряку, має захисну і лікувальну дію. Обприскування найкраще проводити профілактично або при появі перших ознак хвороби. Не рекомендується проводити обробки по вологій листовій поверхні або якщо очікуються опади протягом 2,5–3 годин після обробки. Робочий розчин треба використати протягом 24 годин після приготування. Терміни виходу працівників на оброблені території: для проведення механізованих робіт — 3 доби, для ручних робіт — 7 діб.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Використовувати при температурі не вище за +25 °С.

ДІЄ НА ВСІ СТАДІЇ РОЗВИТКУ ХВОРОБИ

Етапи розвитку збудників хвороби

Проростання спор



Превентивна дія

Завдяки азоксистробіну найвища ефективність дії досягається при превентивних обробках, до моменту зараження


Проникнення збудника в клітину




Лікувальна дія

Має виражену лікувальну дію проти більшості збудників хвороб, яка проявляється у знищенні патогену (на ранніх стадіях розвитку захворювання) і блокуванні дальшого розвитку хвороби (на пізніших стадіях)

Розвиток міцелію, поява візуальних симптомів





Спороутворення



Антиспорулянтна дія

Амістар-технологія, на відміну від інших фунгіцидів, чинить на збудників хвороб антиспорулянтну дію

АМІСТАР® ГОЛД – ІНВЕСТИЦІЯ, ЩО ОКУПАЄТЬСЯ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ!



Тести, що наглядно демонструють різницю застосування Амістар®-технології та генериків


РОЗМІР ЧАСТИНОК МАЄ ЗНАЧЕННЯ



Рецептура технології Амістар® дозволяє:

- ✓ Запобігти засміченню фільтрів і розпилювачів
- ✓ Скоротити шкідливий вплив на оператора й довкілля
- ✓ Максимально посилити дію фунгіциду


ПІНОУТВОРЕННЯ МАЄ ЗНАЧЕННЯ



Рецептура технології Амістар® дозволяє скоротити:

- ✓ Час приготування розчину
- ✓ Вплив на оператора й довкілля
- ✓ Час очищення обприскувачів



СТІЙКІСТЬ ДО ХОЛОДУ МАЄ ЗНАЧЕННЯ




Обидва продукти зберігалися протягом 24 годин за температури -10°C

Рецептура технології Амістар® покликана:

- ✓ Запобігти замерзанню
- ✓ Зберегти ефективність



СТАБІЛЬНІСТЬ ПРИ ЗБЕРІГАННІ МАЄ ЗНАЧЕННЯ



2 тижні за температури $+54^{\circ}\text{C}$, що симулює зберігання протягом двох років

Рецептура Амістар® покликана:

- ✓ Запобігати сепарації
- ✓ Зекономити час оператора
- ✓ Максимально підсилити дію фунгіциду

Оригінальна Амістар®-технологія чи аналоги та генерики?

ПЕРЕВІРЕНО.
ТЕХНОЛОГІЯ
Амістар®

На які проблеми ми можемо наразитися, застосовуючи препарати-аналоги?



Гірша ефективність порівняно з оригінальною Амістар®-технологією, що підтверджують результати досліджень



Нижча врожайність як наслідок гіршої ефективності й тривалості захисної дії



Прямі збитки, що не здатна компенсувати нижча вартість обробки порівняно з оригінальним продуктом



Недопрацьована і нестабільна формуляція може призвести до проблем під час застосування такого продукту: блокування розпилювачів, випадання в осад, надмірне піноутворення і навіть фітотоксичність на культуру



Безпека. Для кожного оригінального препарату обов'язкова наявність паспорта безпеки, де вказано рівні токсичності та класифікація за впливом складників препарату, спосіб надання першої медичної допомоги в разі контакту чи отруєння. Що ж стосується препаратів-аналогів, то така інформація у них просто відсутня, а отже, ми не володіємо ймовірними даними про складники такого препарату і ступінь їхньої токсичності для персоналу (агронома, механізатора, заправника та ін.) чи навколишнього середовища загалом. Питання безпеки стосується і залишків складників препарату в урожаї, всебічну перевірку яких проходять оригінальні продукти



ДО ТОГО Ж ВИ НЕ ОТРИМУЄТЕ:

- Гарантій оригінального виробника.
- Якісного технічного супроводу.
- Додаткових технічних, лабораторних і фінансових сервісів.
- Упевненості в продукті, що використовується

**Пам'ятайте, тільки Амістар® працює як Амістар®!
Обирайте оригінальні продукти.**

ПЕРЕВІРЕНО.
ТЕХНОЛОГІЯ
Амістар



Амістар® Тріо



КОНЦЕНТРОВАНА ДІЯ ТРЬОХ ПОТУЖНИХ КОМПОНЕНТІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Амістар® Тріо 255 ЕС, к. е.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	30 г/л ципроконазолу, 125 г/л пропіконазолу, 100 г/л азоксистробіну
	ХІМІЧНА ГРУПА	Триазоли, стробілурини
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Надійно захищає рослину від основного спектра хвороб
- ✓ Збалансована превентивна й лікувальна дія, яка забезпечує тривалий період захисту
- ✓ Завдяки фізіологічному впливу на рослину забезпечує додаткову урожайність та покращує якість

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА	Борошниста роса, іржасті хвороби, септоріоз листя й колосу, фузаріоз колосу	Обприскування в період вегетації	1,0	2/30
ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ	Гельмінтоспоріози, борошниста роса		1,2	
ЯЧМІНЬ ЯРИЙ	Борошниста роса, сітчаста, темно-бура, смугаста, облямівкова плямистості, іржа		1,0	
РИС	Пірикуляріоз, ризоктоніоз, гельмінтоспоріоз, рамуляріоз, опік листка, альтернاریоз, церкоспороз, гниль листових піхів. Покращує засвоєння ґрунтової води в посушливих умовах, стимулюючи розвиток кореневої системи	Обприскування посівів у фазі куцїння, появи прапорцевого листка, 75 % цвітіння у рису	1,2	3/30

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю пестицидів. Безпечно для зернових культур можна використовувати в бакових сумішах з гербіцидами **Дербі®**, **Пріма™ Форте**, **Пік®**, **Логран®**, інсектицидами **Енжіо®**, **Карате® Зеон**, регулятором росту **Моддус®**.

При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватися рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Фунгіцид має захисну і лікувальну дію. Використання препарату **Амістар® Тріо** сприяє підвищенню урожайності і покращенню якості зерна шляхом активізації резервів рослини: зростає ефективність використання вологи, призупиняється старіння рослини за рахунок пролонгації фотосинтезу (ефект озеленення), покращується азотний обмін.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Використовувати при температурі не вище за +25 °С.







РЕКМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Штанговий обприскувач — 150–200 л/га, авіаобприскування — не менше як 50 л/га.





ЗБЕРЕЖИ КОЖНУ ЯГОДУ В ГРОНІ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Діналі® 90 DC, КД
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	60 г/л дифеноконазолу, 30 г/л цифлуфенаміду
	ХІМІЧНА ГРУПА	Триазоли, амідоксими
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат, що диспергується
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Найкращий системний препарат для захисту винограду від комплексу хвороб із лікувальним ефектом
- ✓ Властива газова фаза (до 4 см від місця потрапляння краплі)
- ✓ Подовжена профілактична, лікувальна й залишкова активність (до 30–40 днів)
- ✓ Поєднання двох діючих речовин унеможливує виникнення резистентності
- ✓ Стійкість до змивання дощем і високих температур
- ✓ Найкращий період для внесення — кінець цвітіння винограду



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ВИНОГРАД	Оїдіум, чорна гниль, краснуха	Обприскування в період вегетації	0,6–0,7	3/30

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: Високоєфективний проти оїдіуму, чорної гнилі і краснухи на винограді. Цифлуфенамід діє системно. Він поглинається через листя й акропетально переміщується в потоці транспірації в ксилему, де проходить трансламінарне розподілення у тканинах рослини. Ефективний проти всіх штамів хвороб, стійких до стробілуринів, морфолінів, триазолів. Лікувальні властивості дифеноконазолу підсилюють лікувальні властивості цифлуфенаміду. Це дозволяє ефективно захищати рослини не тільки в профілактичних цілях, а й при високому інфекційному фоні. При температурі +25 °C має газовий вплив на збудників хвороб до 4 см від місця потрапляння. Не впливає на зовнішній вигляд, ферментацію й органолептичні показники винограду.







РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 600–800 л/га.





РЕВОЛЮЦІЯ СТАНДАРТІВ У КОНТРОЛІ ХВОРОБ ЛИСТЯ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Елатус® P1a, 358 KE
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	Солатенол™ — 83,33 г/л, 66,67 г/л ципроконазолу, 208,33 г/л пропіконазолу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Карбоксаміди, триазоли
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Найвища активність у контролі септоріозу та іржі
- ✓ Тривалий період захисної дії
- ✓ Гарантована прибавка врожайності
- ✓ Висока ефективність проти широкого спектра хвороб
- ✓ Чітко виражена лікувальна дія
- ✓ Безпечне використання в бакових сумішах

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА	Іржа, септоріоз, піренофороз листя, борошніста роса	Обприскування в період вегетації	0,4–0,6	1/30
ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ І ЯРИЙ	Іржа, сітчаста, темно-бура та облямівкова плямистості, борошніста роса			
ЖИТО ОЗИМЕ	Іржа, септоріоз, ринхоспоріоз, борошніста роса, піренофороз, аскохітоз, гельмінтоспоріоз			

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю пестицидів. Безпечно для культури можна використовувати в бакових сумішах з гербіцидами **Дербі®**, **Пріма™ Форте**, **Пік®**, **Логран®**, інсектицидами **Енжіо®**, **Карате® Зеон**, регулятором росту **Моддус®**.

При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватися рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Використовувати в діапазоні температур від +12 °С до +25 °С.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 100–300 л/га.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ: Термін застосування препарату **Елатус® P1a** — від фази другого міжвузля до цвітіння культури (ВВСН 32–69). Обробку проводити профілактично або при перших ознаках розвитку хвороб.





ІВАН ПОДОЛЯН
Головний агроном ТОВ «Прогрес»

«Раніше ми застосовували фунгіциди на основі триазолів та стробілуринів, але ж **Елатус® P1a** – нове покоління фунгіцидів на основі нової діючої речовини Солатенол™, до якої у збудників хвороб немає резистентності»

Урожай озимої пшениці – 7–8 т/га
Волинь



ВІТАЛІЙ ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ
Головний агроном СТОВ «Агросвіт»

«Період захисту в **Елатус® P1a** довший порівняно з аналогами, застосовуємо його з 2018 року»

Урожай озимої пшениці першого-другого класу – 7 т/га
Київщина



ЄВГЕН ГЛУГАН
Директор ТОВ ім. Мічуріна
(ПП «Ахерман Зернопром»)

«Друге внесення фунгіциду (по прапорцевому листку) проводилося **Елатус® P1a**, що забезпечило захист посівів аж до збирання врожаю: від поверхні ґрунту і до верхівки всі рослини стояли зелені, а листові апарати не мали жодної плями – ідеальне видовище для агронома»

Урожайність озимої пшениці – 4,5 т/га
Одещина



ВІКТОР СВІР
Голова господарства СВК ім. Фрунзе

«**Елатус® P1a** захистив прапорцевий листок пшениці від хвороб, а ми отримали якісне зерно»

Урожай озимої пшениці – 6,5 т/га
Харківщина



Рекомендовано засіб індивідуального захисту
Наприклад:
Повнолицьова маска з фільтром 3М 6059 ABEK1 +
3М 5935 P3

syngenta®



ЕФЕКТИВНИЙ І БЕЗПЕЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДІЇ НА ХВОРОБИ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Квадріс® 250 SC, к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	250 г/л азоксистробіну
	ХІМІЧНА ГРУПА	Стробілурини
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	1 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Ефективний проти 4-х класів грибів: *Ascomycetes*, *Basidiomycetes*, *Deuteromycetes*, *Oomycetes*
- ✓ Новий унікальний механізм дії забезпечує відсутність перехресної стійкості патогенів
- ✓ Знищує як гіфи, так і спори гриба
- ✓ Безпечний для рослин, споживачів і довкілля (терміни очікування для овочів становлять лише 5 днів)

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ВИНОГРАД	Мілдью, оїдіум, сіра гниль, чорна плямистість, інфекційне засихання	Обприскування до та після цвітіння	0,8	3/25
ОГРОК	Пероноспороз, борошниста роса, антракноз, аскохітоз	Від 5 листків до початку цвітіння, після цвітіння Обробка в період вегетації, профілактично або при появі перших ознак хвороб	0,6	3/5
ТОМАТ	Фітофтороз, альтернаріоз, бура плямистість			2/14
ЦИБУЛЯ	Пероноспороз, фузаріозне в'янення			1/7
КАПУСТА	Збудники гнилей при зберіганні		0,8–1,2	3/14
ХМІЛЬНИКИ	Несправжня борошниста роса		0,8	2/7
ГОРОХ ОВОЧЕВИЙ	Пероноспороз, борошниста роса, аскохітоз		0,6	
КАРТОПЛЯ	Фітофтороз, альтернаріоз			

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю фунгіцидів та інсектицидів. Рекомендується застосовувати в комплексній системі захисту з фунгіцидами Ридоміл® Голд МЦ, Топаз®. У кожному конкретному випадку слід проводити тести на сумісність. Бакові суміші з гербіцидами не рекомендовано, бо не збігаються терміни застосування.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Суттєво підвищується фунгіцидна ефективність при застосуванні двічі поспіль.







РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 600–800 л/га — виноград, 200–400 л/га — овочі.

Концентрація робочого розчину: виноград — 0,1 %, овочі — 0,15–0,25 %.



КРАЩЕ, НІЖ ПРОСТО ЗАХИСТ!
ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ПРОТИ ВСІХ ВИДІВ АЛЬТЕРНАРІЇ, СТЕМФІЛІЇ ТА ООМІЦЕТІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Квадріс® Топ 325 SC, к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	200 г/л азоксистробіну, 125 г/л дифеноконазолу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Стробілурини, триазоли
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Високоєфективний проти всіх видів альтернарії, стемфілії та ооміцетів
- ✓ Лікувальна, профілактична й антиспорулянтна дії
- ✓ Озеленувальний ефект, що впливає на зав'язуваність плодів і якість урожаю
- ✓ Зниження впливу негативних стресових чинників на рослину
- ✓ Тривалий захист і готове антирезистентне рішення
- ✓ Ефективний проти антракнозу при застосуванні на ранніх стадіях розвитку хвороби
- ✓ Оптимальна норма використання
- ✓ Короткий термін очікування
- ✓ Рослини краще переносять брак вологи в ґрунті і повітряну посуху



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ТОМАТИ	Альтернаріоз, фітофтороз, септоріоз	Обробка в період вегетації, профілактично або при появі перших ознак хвороби	0,75–1,0	3/14
КАРТОПЛЯ	Альтернаріоз, фітофтороз			
ЦИБУЛЯ	Пероноспороз, альтернаріоз, стемфіліоз			
ЧАСНИК	Пероноспороз, альтернаріоз, ризоктоніоз, іржа			

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю фунгіцидів та інсектицидів. Рекомендується застосовувати в комплексній системі захисту з фунгіцидами-**Міравіс® 200, Квадріс®, Ридоміл® Голд МЦ, Топаз®**. Баккові суміші з гербіцидами не рекомендовано, тому що не збігаються терміни застосування.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: Не проводити обробки по вологій листовій поверхні або при очікуванні опадів через 2,5–3 години після обробки. Не допускати знесення на інші культури.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 250–300 л/га.



Рекомендовано засіб індивідуального захисту
Наприклад:
Повнолицьова маска з фільтром 3М 6059 АВЕК1 +
3М 5925 Р2











Магнелло®



ЕКСПЕРТ З КОНТРОЛЮ ФУЗАРІОЗУ І СЕПТОРІОЗУ КОЛОСУ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Магнелло® 350 ЕС, КЕ
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	100 г/л дифеноконазолу, 250 г/л тебуконазолу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Триазоли
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л

**ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ**

- ✓ Максимальний захист від фузаріозу і септоріозу колосу
- ✓ Знижує ризик накопичення мікотоксинів
- ✓ Формуляцію розроблено спеціально для обробки по колосу
- ✓ Ефективно захищає верхні листки від піренофорозу і септоріозу

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА	Септоріоз, піренофороз, альтернаріоз, Іржа, піренофороз	Обприскування в період вегетації	0,5–1,0	2/30
	Фузаріоз колосу		0,75–1,0	
ЯЧМІНЬ ЯРИЙ ТА ОЗИМИЙ	Сітчаста плямистість, іржа, альтернаріоз		0,5–1,0	
	Фузаріоз колосу		0,75–1,0	

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю пестицидів. При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватися рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Від +10 °С до +25 °С.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Препарат рекомендується як максимально дієвий для захисту листового апарату і генеративних органів. Має відмінну ефективність проти захворювань колосу, особливо фузаріозу. Оптимальний термін обробки для захисту колосу — початок цвітіння.







РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Штанговий обприскувач — 100–400 л/га.





ПРОСТИЙ І НАДІЙНИЙ МІДЬВМІСНИЙ ФУНГІЦИД

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Пергадо® R 270 WG, ВГ
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	25 г/кг мандіпропаміду, 245 г/кг оксихлориду міді
	ХІМІЧНА ГРУПА	Манделаміди, неорганічні сполуки
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Гранули, що диспергуються у воді
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 кг



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Утворює захисний «екран» під кутикулою ягоди й листка, забезпечуючи відмінний захист від хвороб
- ✓ Ефективність не залежить від погодних умов
- ✓ Профілактика зараження бактеріальними хворобами
- ✓ Не впливає на ферментацію і смакові властивості вина
- ✓ Має захисну, лікувальну й антиспорулянтну дію



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, кг/га	Кратність обробок / Термін очікування
ВИНОГРАДНИКИ	Мілдью, антракноз	Обприскування в період вегетації	4,0–5,0	3/30
ЦИБУЛЯ	Пероноспороз, профілактика бактеріальних інфекцій			3/14
ТОМАТ	Фітофтороз, альтернаріоз, профілактика бактеріальних інфекцій			3/30

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

Виноград

Пергадо® R завдяки формуванню захисного «екрана» під кутикулою забезпечує найкращий порівняно з усіма іншими фунгіцидами захист суцвіть і ягід. Тому оптимальний термін для застосування препарату — фази висування й розрихлення суцвіть (одночасний захист від антракнозу, мілдью, краснухи, чорної гнилі) та ягода «рисина» — змикання ягід у грона. Найвища ефективність досягається при застосуванні **Пергадо® R** у період ягода «рисина» — змикання ягід у грона після препарату **Ридоміл® Голд МЦ**.

Цибуля, томат

Пергадо® R формує під кутикулою листка захисний «екран», який «росте» разом з листком і в такий спосіб попереджує зараження пероноспорозом незалежно від погодних умов. Найбільша ефективність досягається при застосуванні **Пергадо® R** після **Ридоміл® Голд МЦ**.

Препарат містить мідь, тому його доцільно використовувати для профілактики бактеріозів у другій половині вегетації або після граду, злив, пилкових бур, у разі пошкоджень комахами.

Потрійна дія на патоген

Захисна дія — максимальна ефективність досягається при профілактичному використанні (до зараження культури). Лікувальна дія — використанні через 28–48 годин після зараження. Антиспорулянтна дія — при обробці до утворення спор.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 600–800 л/га для виноградарників, 200–400 л/га для овочевих культур.

Новітня розробка з найширшим спектром контрольованих збудників на різних культурах — АДЕПІДИН™

Останніми роками ринок фунгіцидів активно завойовують препарати, у складі яких є діюча речовина з класу SDHI. Уперше SDHI продукт (діюча речовина) було представлено світовій аграрній спільноті ще 1966 року як протруйник із вибіркоvim впливом на патогени. Новим етапом розвитку цього класу можна вважати 2000-ні, коли з'явилися надзвичайно ефективні діючі речовини.

За останні двадцять років у світі розроблено більше як десяток діючих речовин, що використовуються на польових, овочевих, плодово-ягідних та інших культурах, із різними напрямками й способами застосування.

Загалом за 55 років (до 2021-го) розвитку хімічної групи карбоксамідів (SDHI) на світовому ринку було представлено майже два десятки діючих речовин. У всіх у них є спільна особливість — це вплив на клітину гриба, а саме на фермент сукцинатдегідрогенази (СДГ) (у ланцюгу мітохондріального дихання). Такий вплив інгібіторів на процес мітохондріального дихання критичний для розвитку патогену.

1. Препарати на основі цієї діючої речовини відрізняються від інших препаратів із групи SDHI своїми властивостями. АДЕПІДИН™ — єдиний представник нової підгрупи карбоксамідів — N-метокси-(фенілетил)-піразолкарбоксамідів.
2. Від першого синтезу до виходу на ринок було пройдено шлях тривалістю понад вісім років.
3. Було проаналізовано більше як 9000 різних синтезованих молекул для того, щоб отримати одну з відмінними характеристиками й неперевершеною ефективністю в контролі хвороб на різних культурах (найширший спектр контрольованих хвороб серед усіх відомих діючих речовин).

АДЕПІДИН™ — ШЛЯХ ДОВЖИНОЮ У 8 РОКІВ



Головні переваги використання продуктів на основі технології АДЕПІДИН™

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ



АДЕПІДИН™ — це унікальний SDHI фунгіцид із найширшим спектром дії для захисту від хвороб польових, овочевих, плодово-ягідних та інших культур



Унікальна ефективність у контролі піренофорозу, плямистостей (сітчастої, темно-бурої, смугастої), фузаріозів, септоріозів, парші, альтернаріозу, гнилей та ін.




Рівномірний розподіл у листі для оптимального захисту протягом тривалого часу



Висока сумісність із восковим шаром листя та плодів, фотостабільність, стійкість до змиванням дощем



Пролонгований захист, який дозволяє скоротити кількість фунгіцидних обробок у системах захисту овочевих і плодово-ягідних культур



У СВІТІ АДЕПІДИН™ ЗАСТОСОВУЮТЬ НА:



зернових (пшениця, ячмінь, жито, овес, тритикале та ін.)



ріпаку



плодово-ягідних культурах, у садах і виноградниках



бобових (соя, горох, нут, сочевиця та ін.)



соняшнику



арахісі



кукурудзі (зокрема цукрової)



цукровому буряку



бавовні



овочевих культурах







НОВИЙ



Miravic® Neo

ДОСВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

 ПОВНА НАЗВА	Miravic® Neo 300 SE, CE
 ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	75 г/л АДЕПІДИНУ™, 100 г/л азоксистробіну, 125 г/л пропіконазолу
 ХІМІЧНА ГРУПА	Карбоксаміди, стробілурини, триазоли
 ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Суспензійна емульсія
 КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
 УПАКОВКА	5 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Перший у підкласі N-метокси-карбоксамідів з найвищим потенціалом ефективності серед SDHI
- ✓ Унікальна ефективність у контролі піренофорозу, плямистостей (сітчастої, темно-бурої, смугастої) та септоріозів
- ✓ Новий стандарт ефективного контролю різних видів фузаріозу
- ✓ Відмінна сумісність із восковим шаром листя та фотостабільність
- ✓ Рівномірний розподіл у листі для оптимального захисту протягом тривалого часу
- ✓ Неперевершена стійкість до змивання опадами



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ОЗИМА ПШЕНИЦЯ	Борошниста роса, септоріоз листя, септоріоз колосу, бура листова іржа, піренофороз, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	0,5–1,0	1/30 днів
ОЗИМИЙ І ЯРИЙ ЯЧМІНЬ	Сітчаста плямистість, смугаста плямистість, темно-бура плямистість, ринхоспороз, іржа, борошниста роса, альтернаріоз			



СУМІСНІСТЬ: Препарат можна змішувати з іншими загальнозживаними пестицидами на відповідній культурі. Сумісний із більшістю фунгіцидів та інсектицидів. У кожному конкретному випадку слід проводити тести на сумісність.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Оптимальна температура застосування +12...24 °С.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 100–300 л/га.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ:

Міравіс® Нео — фунгіцид із системною дією для застосування на озимій пшениці, ярому й озимому ячмені, має захисну і лікувальну дію. Обприскування краще проводити профілактично або при появі перших ознак хвороби. Термін застосування препарату **Міравіс® Нео** — від фази другого міжвузля до цвітіння культури (ВВСН 32–69).

Не рекомендується проводити обробку при вологій листовій поверхні або якщо очікуються опади протягом 1,5–2 години після обробки.

Робочий розчин слід використати протягом 24 годин після приготування.

ТЕРМІН ВИХОДУ НА ОБРОБЛЕНІ ПЛОЩІ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ПОСІВАМИ: Для проведення механічних робіт — 3 дні, для проведення ручних робіт — не регламентуються. Слід уникати застосування фунгіциду за високих температур (вище за +25 °С) та низької вологості повітря — (нижче за 40 %).

Обприскування проводити в ранкові або вечірні години в безвітряну погоду. Не допускати знесення препарату на сусідні культури. Після роботи з препаратом ретельно промити бак, штанги та форсунки обприскувача.

КОМПОНЕНТИ НОВОГО ПРОДУКТУ МІРАВІС® НЕО

АДЕПІДИН™



Азоксистробін



Пропіконазол

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ З РІЗНИХ КЛАСІВ

- Три різні механізми дії
- Сприяє ефективній боротьбі з хворобами
- Відмінна стратегія боротьби з резистентністю

НОВИЙ



ВИЩА ЛІГА ПЛОДОВООВОЧІВНИЦТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Міравіс® 200 SC, к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	200 г/л АДЕПІДИНУ™
	ХІМІЧНА ГРУПА	Карбоксаміди (SDHI)
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація BOO3: III
	УПАКОВКА	1 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

Найвищий біохімічний потенціал серед класу SDHI продуктів

- ✓ Містить унікальний карбоксамід із хімічної групи N-метокси-піразол-карбоксамідів
- ✓ Новий унікальний механізм дії
- ✓ Тривалий захист від ключових хвороб
- ✓ Трансламінарний ефект із локально-системною дією, що забезпечує пролонгований захист
- ✓ Основа антирезистентної стратегії — унікальний партнер для бакових сумішей
- ✓ Неперевершена стійкість до змивання опадами
- ✓ Ефективний у складних погодних умовах (до +35 °С) та при вологості понад 80 %
- ✓ Не викликає фітотоксичності



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, кг/га	Кратність обробок / Термін очікування
ЯБЛУНЯ	Парша, борошниста роса, моніліоз плодів, альтернаріоз	У період вегетації	0,2–0,25	2/40 днів
ЧЕРЕШНЯ	Кокомікоз, моніліальний опік, борошниста роса		0,4–0,5	2/40 днів
ПЕРСИК	Кучерявість листя		0,75	2/40 днів
	Клястероспоріоз, моніліальний опік, борошниста роса		0,5	2/40 днів
КАРТОПЛЯ	Альтернаріоз		0,15–0,25	2/20 днів
ТОМАТИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ	Альтернаріоз		0,25–0,35	3/3–7 днів
ТОМАТИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ	Альтернаріоз		0,25–0,35	2/20 днів

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, кг/га	Кратність обробок / Термін очікування
ЦИБУЛЯ	Альтернаріоз, стемфіліоз	У період вегетації	0,4–0,5	2/20 днів
ОГІРОК ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ	Борошниста роса		0,25–0,35	2/3 дні
КАПУСТА	Альтернаріоз		0,25–0,35	2/20 днів
МОРКВА	Борошниста роса, альтернаріоз		0,25–0,35	2/20 днів
КАВУН	Борошниста роса		0,25–0,35	2/20 днів

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Діюча речовина препарату **Miravic®** майже повністю абсорбується рослиною протягом 1 години. Потрапляючи на рослину, АДЕПІДИН™ рівномірно розподіляється в тканинах листка і пересувається акропетально, крім того, чимала його кількість міцно зв'язується з восковим шаром і не змивається опадами. Такий розподіл діючих речовин зумовлює тривалу фунгіцидну активність і високу ефективність **Miravic®**.

Тривалість захисного періоду залежить від норми продукту, термінів застосування препарату, ступеня інфікованості рослин на момент обробки і може становити від 10–14 днів.

Щоб досягнути кращого ефекту, фунгіцид рекомендується застосовувати профілактично або при перших ознаках розвитку хвороби.

1. Застосовувати профілактично або в період початку зараження рослини ключовими патогенами.
2. Рекомендується чергувати використання **Miravic®** з фунгіцидами інших хімічних груп (**Циделі™ Топ, Скор®, Хорус®, Ревус® Топ, Квадріс® Топ**) або з контактними фунгіцидами.
3. Якщо в системах захисту саду більше як 12 фунгіцидних обробок, максимальна кількість застосувань препаратів із групи SDHI — не більше ніж 4 рази за сезон, згідно з рекомендаціями FRAC.
4. **Miravic®** — надійний засіб для запобігання резистентності до основних збудників грибкових хвороб завдяки використанню унікальної молекули АДЕПІДИН™, яка не має аналогів на ринку

СУМІСНІСТЬ: Препарат можна змішувати з іншими загальноживаними пестицидами на відповідній культурі. Сумісний із більшістю фунгіцидів та інсектицидів. У кожному конкретному випадку слід проводити тести на сумісність.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Сади — 800–1200 л/га; овочі відкритий ґрунт — 200–400 л/га; овочі закритий ґрунт — 400–800 л/га.

ОПТИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: +12...24 °С.









НОВИЙ



Міравіс® Прайм

ВИЩА ЛІГА ВІНОГРАДАРСТВА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Міравіс® Прайм 400 SC, к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	250 г/л флудиоксонілу + 150 г/л АДЕПІДИНУ™
	ХІМІЧНА ГРУПА	Фенілпіроли, карбоксаміди (SDHI)
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	5 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

Тривалий захист від ключових хвороб винограду

- ✓ Найвищий біохімічний потенціал серед класу SDHI продуктів
- ✓ Новий унікальний механізм дії, трансламінарний ефект із локально-системною дією, що забезпечує пролонгований період захисту
- ✓ Унікальний карбоксамід з хімічної групи N-метокси-піразол карбоксамідів
- ✓ Універсальний склад забезпечує захист від унікального спектра хвороб: сірої гнилі, оїдіуму, антракнозу, альтернаріозу
- ✓ Новий механізм дії
- ✓ Основа антирезистентної стратегії для контролю хвороб винограду
- ✓ Стійкість до змивання опадами
- ✓ Ефективний у складних погодних умовах (до 35 °С) і за вологості понад 80 %
- ✓ Не викликає фітотоксичності



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ВИНОГРАД	Сіра гниль, оїдіум, антракноз, альтернаріоз	У період вегетації	0,8–1,2	2/40 днів

СУМІСНІСТЬ: Препарат можна змішувати з іншими загальнозживаними пестицидами на відповідній культурі.

ОПТИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: +12...24 °С.







РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 600–800 л/га.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ: Діюча речовина АДЕПІДИН™ швидко проникає у восковий наліт та рівномірно розподіляється в ньому, а також у тканину листка, де виявляє системну активність. Флудиоксоніл має контактну-поверхневу дію, що забезпечує надійний захист від проростання міцелію. Завдяки такому поєднанню суттєво розширюється спектр контролю основних захворювань винограду, а також унеможливується виникнення резистентності.

Міравіс® Прайм рекомендується вносити у фазу початок скидання чохликів і до фази початок змикання ягід у гроні.

Використовуйте **Міравіс® Прайм** профілактично, це дозволить збільшити термін високої ефективності препарату.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Ревус® Топ 500 ЕС, к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	250 г/л мандіпропаміду, 250 г/л дифеноконазолу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Манделаміди, триазоли
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	За ВООЗ не класифікується (не становить небезпеку в разі дотримання регламентів застосування)
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Поєднання двох діючих речовин гарантує найвищу ефективність проти альтернаріозу і фітофторозу
- ✓ Висока стійкість до змивання — захищає врожай навіть в умовах, сприятливих для розвитку хвороб
- ✓ Відмінна профілактична і лікувальна дія завдяки високій трансламінарній і системній активності



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ТОМАТИ	Альтернаріоз, фітофтороз	Обприскування в період вегетації	0,6	4/14
КАРТОПЛЯ	Альтернаріоз, фітофтороз		0,5–0,6	

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: В інтегрованих системах захисту рекомендується застосовувати на початку цвітіння картоплі та при масовому цвітінні томата. Сумісний із більшістю фунгіцидів та інсектицидів, проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.


Особливості застосування на картоплі. Мандіпропамід має профілактичний і лікувальний ефект у боротьбі з фітофторозом. Завдяки трансламінарній активності він закріплюється у восковому нальоті листка, забезпечуючи максимальний захист проти зараження фітофторозом. Зупиняє проростання зооспор і спорогенів, пригнічує утворення гаусторій, ріст міцелію і спороношення.

Дифеноконазол швидко поширюється по всій рослині і знищує збудника альтернаріозу завдяки своїй системності, забезпечуючи захисну і лікувальну дію. Зупиняє ріст міцелію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ НА КАРТОПЛІ: Ревус® Топ має лікувальну і превентивну дію, тому рекомендується застосовувати препарат профілактично або при перших симптомах хвороб, щоб уникнути поширення хвороби і зараження всього врожаю.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 200–300 л/га.







НОВИЙ



Орондіс® Ультра

КЛЮЧОВИЙ ІНСТРУМЕНТ У КОНТРОЛІ ООМІЦЕТІВ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Орондіс® Ультра 280 SC, к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	30 г/л оксатіапіпроліну + 250 г/л мандіпропаміду
	ХІМІЧНА ГРУПА	Піперидиніл-тіазол-ізоксазоліни + манделаміди
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

Відмінна профілактична та лікувальна фунгіцидна активність, яка контролює всі ключові стадії життєвого циклу збудника

- ✓ Топ у класі фунгіцидів для контролю ооміцетів
- ✓ Новий потужний механізм дії
- ✓ Препарат містить дві діючі речовини нового покоління, що дозволяє використовувати менші норми витрати порівняно з іншими фунгіцидами без втрати ефективності
- ✓ Системне і трансламіна́рне поширення в тканинах рослин забезпечує захист молодих пагонів рослини
- ✓ Максимальний ефект досягається при профілактичному застосуванні під час активного росту рослини та формування врожаю
- ✓ Стейкий до змивання опадами
- ✓ Тривалий контроль цільових об'єктів
- ✓ Основа антирезистентної стратегії



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, кг/га	Кратність обробок / Термін очікування
ВИНОГРАД	Мілдью	Обприскування в період вегетації	0,67	2/30
ТОМАТ, ЗАКРИТИЙ ҐРУНТ	Фітофтороз		0,4	2/14
ТОМАТ, ВІДКРИТИЙ ҐРУНТ	Фітофтороз		0,4	2/20
ЦИБУЛЯ	Пероноспороз		0,5–0,6	2/20

СУМІСНІСТЬ: Препарат можна змішувати з іншими загальнозживаними пестицидами на відповідній культурі. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Виноград — 600–800 л/га; овочі відкритий ґрунт — 200–400 л/га; овочі закритий ґрунт — 400–800 л/га.

ОПТИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: +12...24 °С.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ: Фунгіцид **Орондіс® Ультра** має два механізми дії: трансламінарну й акропетальну (системну), — що дозволяє компонентам препарату переміщуватись як по поверхні й у середині листка, так і вгору до нового приросту по ксилемі рослини. Обидва механізми дії працюють одночасно в тандемі для захисту рослини. Це особливо важливо в період активних ростових процесів.

Орондіс® Ультра запобігає вивільненню і проростанню зооспор і спорангіїв, руйнуючи зв'язувальний білок, необхідний для розвитку грибних патогенів.

- Оксатіапіпролін націлено на ооміцети на важливих етапах їхнього життєвого циклу, і він найефективніший на ключових етапах, як-от споруляція, проростання зооспор і початок зараження. Зупинка патогену в ці періоди знижує ймовірність розвитку наступних циклів хвороби.
- Мандіпропамід має трансламінарну дію: утворює захисний «екран» під кутикулою ягоди й листя, забезпечує відмінний захист від хвороб, особливо в період активного росту. За даними FRAC, мандіпропамід, який входить до складу препарату, віднесено до підгрупи Н5 / FRAC код 40 та класифіковано як «низький ризик виникнення резистентності», що робить продукт лідером у боротьбі проти фітопатогенів з класу ооміцетів.
- Мандіпропамід як партнер у складі **Орондіс® Ультра** суттєво зменшує імовірність крос-резистентності.

Фунгіцид **Орондіс® Ультра** майже повністю проникає в рослину, тому він не змивається під час опадів. Така стійкість до дощу в поєднанні з тривалою захисною дією забезпечує відмінну гнучкість у застосуванні препарату.

Орондіс® Ультра, за результатами дослідів, має вищий ступінь захисту молодого приросту від *Plasmopara viticola* (мілдью), *Phytophthora* spp. (фітофторозу) та *Peronospora destructor* (пероноспорозу).





ОСНОВА ФУНГІЦИДНОГО ЗАХИСТУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Ридоміл® Голд МЦ 68 WG, в. г.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	640 г/кг манкоцебу, 40 г/кг металаксилу-М
	ХІМІЧНА ГРУПА	Феніламіди / дитіокарбамати
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Вододисперсні гранули
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 кг



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Біологічно найефективніша комбінація системного і контактного фунгіцидів: надійний захист проти хвороб навіть за несприятливих погодних умов
- ✓ Профілактична і лікувальна дії
- ✓ Захист нового приросту і бульб

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, кг/га	Кратність обробок / Термін очікування
ВИНОГРАД	Мілдью, чорна плямистість	Обприскування в період вегетації	2,5	3/25
КАРТОПЛЯ І ТОМАТИ	Фітофтороз, альтернаріоз		2,5	3/14
ОГІРКИ	Пероноспороз		2,5	3/10
ХМІЛЬ	Несправжня борошниста роса		2,5	3/20
РІПАК ОЗИМИЙ	Пероноспороз, альтернаріоз		2,5	3/30
ТЮТЮН	Пероноспороз		2,5	3/14
ЦИБУЛЯ (КРИМ НА ПЕРО)	Несправжня борошниста роса		2,5	3/30
ЧАСНИК	Пероноспороз, альтернаріоз		2,5	4/30

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю фунгіцидів та інсектицидів, проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність.

ТЕРМІНИ ЗАСТОСУВАННЯ: Рекомендується застосовувати в комплексній системі захисту з фунгіцидами **Квадріс®**, **Топаз®**, **Скор®**.

У разі виникнення ризику сильного розвитку хвороби витримувати коротші інтервали між обробками до 10 днів.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 600–800 л/га — виноград, хміль, 300–450 л/га — картопля, овочі, 150–200 л/га — польові культури.



ВИСОКА СИСТЕМНІСТЬ, УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Piac™ 300 EC, KE
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	150 г/л дифеноконазолу, 150 г/л пропіконазолу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Триазоли
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Посилена дія проти пірикуляріозу
- ✓ Тривалий період захисної дії, посилена лікувальна дія
- ✓ Висока системність і тривалий захисний ефект



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
РИС (НАЗЕМНИМ І АВІАМЕТОДОМ)	Пірикуляріоз, ризоктоніоз та інші плямистості листя	Обприскування в період вегетації	0,5–0,75	2
СОНЯШНИК (НАЗЕМНИМ І АВІАМЕТОДОМ)	Фомоз, альтернаріоз, сіра гниль, септоріоз		0,5–0,8	2/30

СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний із більшістю пестицидів, але в кожному конкретному випадку слід перевіряти на сумісність.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 50–200 л/га залежно від типу обробки.









Рекомендовано засіб індивідуального захисту
Наприклад:
Повнолицьова маска з фільтром 3М 6059 АВЕК1 +
3М 5935 РЗ



НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ У БОРОТЬБІ ІЗ СІРОЮ ГНИЛЛЮ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Світч® 62,5 WG, в. г.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	375 г/л ципродинілу, 250 г/л флудиоксонілу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Анілінопіримідини, фенілпіроли
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Вододисперсні гранули
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	1 кг



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Двокомпонентний фунгіцид контактно-проникної дії
- ✓ Контролює головних збудників хвороб, які спричиняють гниття плодів і ягід при зберіганні (плодова гниль, сіра гниль, інші хвороби)
- ✓ Короткий термін очікування
- ✓ Препарат, який вдало захищає плоди і ягоди від комплексу хвороб (моніліоз, клястероспоріоз, кокомікоз, кучерявість листя персика, парша та різні види плямистості) під час вегетації
- ✓ Покращує лежкість плодів при зберіганні

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, кг/га	Кратність обробок / Термін очікування
ГРУША, ЯБЛУНЯ, ПЕРСИК, АБРИКОС, СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ	Хвороби плодів під час їх зберігання у сховищах, парша, альтернаріоз, кокомікоз	Обприскування в період вегетації до збирання врожаю	0,75–1,0	1/15
АБРИКОС, ПЕРСИК, СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ, ГРУША	Моніліоз, сиза пліснява, гниль, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль, клястероспоріоз	Обприскування в період вегетації		2/20
ПОЛУНИЦЯ	Сіра гниль ягід, бура і біла плямистості листя, борошниста роса	Обприскування в період вегетації: перед цвітінням	0,75	2/7
		Після масового цвітіння	0,75–1,0	
ЧОРНИЦЯ САДОВА (ЛОХИНА)	Антракноз, моніліоз, плямистості, хвороби ягід під час зберігання	Після масового цвітіння	0,75–1,0	2/30
ВИНОГРАДНИКИ	Сіра гниль, мілдью	Обприскування в період вегетації	0,75–1,0	1–2/7
ТОМАТИ Й ОГІРКИ ВІДКРИТОГО І ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ	Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі)			2/10
ТРОЯНДИ ВІДКРИТОГО І ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ	Фузаріозна, альтернаріозна та сіра гнилі			2/15

ТЕРМІНИ ЗАСТОСУВАННЯ:

Виноград: початок змикання ягід у грона, початок дозрівання плодів, перед збиранням.

Полуниця: період цвітіння, після масового цвітіння, перед збиранням.







Яблуня, груша, персик: перед збиранням, після граду та механічних пошкоджень.

Томати, огірки, троянди відкритого й закритого ґрунту: в період вегетації.



ЗАХИСТ ВІД ПАРШІ, ПЕРЕВІРЕНИЙ ЧАСОМ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Скор® 250 ЕС, к. е.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	250 г/л дифеноконазолу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Триазоли
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	1 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Найкращий системний препарат для захисту яблуні, персика, томатів, картоплі від комплексу хвороб з лікувальним ефектом
- ✓ Висока профілактична й лікувальна активність
- ✓ Стоп-ефект завдяки системній дії
- ✓ Швидке проникнення у тканини рослини (протягом 2-х годин), не змивається дощем після обробки
- ✓ Покращує якість продукції, збільшує кількість плодоутворень
- ✓ Ідеальний партнер у сумішах для комплексного захисту (найкраща бакова суміш проти комплексу хвороб Скор® + Хорус®)



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ЯБЛУНЯ	Парша, борошниста роса, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	0,15–0,2	4/20
ГРУША				4/30
ПЕРСИК	Кучерявість листя, парша, борошниста роса	Обприскування в період вегетації за появи перших ознак захворювання	0,2	2/30
ТОМАТИ	Альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	0,5–0,6	3/14
КАРТОПЛЯ				2/14

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: Високоєфективний проти борошнистої роси при помірному ураженні. При сильному ураженні **Скор®** слід змішувати з препаратом **Топаз®**. Слід дотримуватися інтервалу між обробками у 10–12 днів. Кількість обробок і інтервали між ними залежать від прогнозу розвитку хвороби та сприятливих для розвитку патогену погодних умов. Щоб уникнути проявів резистентності, після дворазової обробки препаратом **Скор®** наступні обробки слід проводити препаратами інших хімічних груп.







РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 800–1200 л/га — для плодово-ягідних культур, 300–400 л/га — для овочевих культур.





ТРАДИЦІЯ ЗАХИСТУ ЗЕРНОВИХ І РІПАКУ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Тілт® 250 ЕС, к. е.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	250 г/л пропіконазолу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Триазоли
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Збалансоване співвідношення ефективності та вартості обробки
- ✓ Рентабельний фунгіцидний захист при низькому рівні вологозабезпечення



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норм витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
РІПАК ОЗИМИЙ	Інгібування росту та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов	Обприскування у фазі 5 листків	0,5	2/30
ПШЕНИЦЯ	Борошниста роса, іржа (види), септоріоз листя і колосу, альтернarios, фузаріоз колосу	Обприскування в період вегетації		
ЯЧМІНЬ	Сітчаста, темно-бура, смугаста, облямівкова плямистості, борошниста роса, іржа			
РИС	Пірикуляріоз			

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю пестицидів. Безпечно для культури можна використовувати в бакових сумішах з гербіцидами **Дербі**®, **Пріма**™ **Форте**, **Пік**®, **Логран**®, інсектицидами **Енжіо**®, **Карате**® **Зеон**, регулятором росту **Моддус**®.

При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватися рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

Зернові культури. Препарат максимально ефективний при проведенні обробок профілактично або при появі перших ознак розвитку хвороб.

У системі фунгіцидного захисту **Тілт**® найдоцільніше застосовувати для першої обробки: озима пшениця — кущіння і вихід у трубку, ярий ячмінь — під час кущіння. Озимий ячмінь починає хворіти на ранніх етапах розвитку рослини, тому бажано першу обробку провести ще восени.

Ріпак. Осіння обробка з нормою 0,5 л/га проводиться у фазі 5 листків культури (з розрахунку 0,1 л/га препарату на 1 листок). Можливе також ранньовесняне застосування для покращення розвитку кореневої системи та попередження розвитку хвороб.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Використовувати при температурі не вище за +25 °С.







РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 150–200 л/га.





ПЕРЕМОГА НАД ХВОРОБАМИ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Тілт® Турбо 575 ЕС, КЕ
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	450 г/л фенпропідину, 125 г/л пропіконазолу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Морфоліни, триазолі
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	5 л

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Неперевершений стоп-ефект та унікальна лікувальна дія проти борошнистої роси
- ✓ Дієвий при низьких температурах
- ✓ Зупиняє розвиток комплексу збудників листових захворювань пшениці і ячменю на початкових стадіях
- ✓ Потужна дистанційна дія завдяки паровій фазі фенпропідину



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА І ЯРА	Борошниста роса, септоріоз, піренофороз, іржа (види), фузаріоз, ризоктоніоз	Обприскування в період вегетації	0,8–1,0	2/–
ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ І ЯРИЙ	Борошниста роса, іржа, гелмінтоспоріози, піренофороз, ринхоспоріоз, фузаріоз, рамуляріоз, септоріоз та інші плямистості			

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю пестицидів. Безпечно для культури можна використовувати в бакових сумішах з гербіцидами **Дербі®**, **Пріма™ Форте**, **Пік®**, **Логран®**, інсектицидами **Енжіо®**, **Карате® Зеон**, регулятором росту **Моддус®**.

При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватися рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Ефективний при застосуванні в нестабільних погодних умовах ранньої весни і восени. Препарат максимально ефективний при проведенні обробок профілактично або при появі перших ознак розвитку хвороб. При плануванні фунгіцидного захисту рекомендуємо використовувати в першу обробку восени або навесні. Застосування **Тілт® Турбо** восени дозволяє суттєво покращити фітосанітарний стан посівів озимих зернових, особливо в разі загрози розвитку плямистостей листя.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: Можна використовувати при температурі від +6 °С.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 150–200 л/га.











Тіовіт Джет®

ІДЕАЛЬНА ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА СІРКИ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Тіовіт Джет® 80 WG, в. г.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	800 г/кг сірки
	ХІМІЧНА ГРУПА	Неорганічні сполуки
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Вододисперсні гранули
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	20 кг



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Особлива препаративна форма забезпечує покращене прилипання до оброблюваної поверхні
- ✓ Висока активність газової фази
- ✓ Оптимальний розмір частин діючої речовини, що не викликає фітотоксичності
- ✓ При максимальних нормах стримує розвиток кліщів

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, кг/га	Кратність обробок / Термін очікування
ВИНОГРАДНИКИ*	Оїдій, павутинні кліщі	Обприскування в період вегетації	5,0–8,0	4/30
ЯБЛУНЯ ТА ГРУША*	Борошниста роса, плодові кліщі		8,0	
РІПАК	Борошниста роса, альтернаріоз		6,0–8,0	2/30
ОГІРКИ	Борошниста роса, звичайний павутинний кліщ		3,0–5,0	3/14
КАПУСТА (ЗАКРИТИЙ ҐРУНТ)	Кила капусти	Обприскування ґрунту в теплицях перед висадкою розсади	100	1/–

* Побічна дія на кліщів (при нормі 8 кг/га).

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Відсутність частинок сірки менше за 1 мікрон у препаративній формі зводить до мінімуму можливість виникнення фітотоксичності.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 800–1200 л/га для плодово-ягідних культур (залежно від об'єму крони), 150–200 л/га для польових культур, 300–400 л/га для овочевих культур, 600–800 л/га для виноградарників.

Припиніть обробку до того, як плоди почнуть набирати характерного забарвлення!

Не використовуйте **Тіовіт Джет®** раніше, ніж через 14 днів після застосування препаратів на олійній основі!

Не проводьте обробки по вологому листю!

При змішуванні з фосфорорганічними препаратами слід неодмінно перевіряти на сумісність.





ШВИДКИЙ ЗАХИСТ ВІД БОРОШНИСТОЇ РОСИ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Топаз® 100 ЕС, к. е.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	100 г/л пенконазолу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Триазоли
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат емульсії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	1 л, 5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Подовжена тривалість дії
- ✓ Системна дія допомагає захистити всі частини рослини: швидке поглинання зменшує ризик змивання дощем
- ✓ Захисна і лікувальна дія
- ✓ Ідеальний партнер у сумішах для комплексного захисту



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ОГІРКИ (ВІДКРИТИЙ ҐРУНТ)	Борошниста роса	Обприскування в період вегетації	0,125–0,15	2/20
ОГІРКИ (ЗАКРИТИЙ ҐРУНТ)	Борошниста роса		0,25	3/3
ВИНОГРАДНИКИ	Оідіум		0,15–0,25	4/20
ЧОРНА СМОРОДИНА (РОЗСАДНИКИ, МАТОЧНИКИ)	Борошниста роса		0,3–0,4	4/–
ЧОРНА СМОРОДИНА	Американська борошниста роса	Обприскування в період вегетації 0,025–0,05 %	0,2–0,4	4/20
ВИШНЯ (МАТОЧНИКИ)	Кокомікоз	Обприскування в період вегетації 0,05 %	0,3–0,4	2/–
ПЕРСИК	Борошниста роса, гниль плодів	Обприскування в період вегетації	0,4	2/20
ЯБЛУНЯ	Борошниста роса		0,3–0,4	4/20
ПОЛУНИЦЯ		Обприскування в період вегетації 0,05 %	0,3–0,5	2/–
МАЛИНА (РОЗСАДНИКИ)	Пурпурова плямистість (дідимельоз), сіра гниль	Обприскування в період вегетації 0,05–0,1 %	0,3–0,6	2/–

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕПАРАТУ: Завдяки системній дії препарату **Топаз®** діюча речовина переміщується по рослині акропетально, трансламінарно і базипетально. За рахунок швидкого засвоєння рослиною (30 хв.) і системної дії **Топаз®** має виражений стоп-ефект та лікувальні властивості, навіть якщо зараження відбулося за три дні до внесення препарату. Високоєфективний проти чорної, аспергільозної та чорної пліснявоподібної гнилей ягід винограду (за даними Національного інституту винограду і вина «Магарач»).

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 800–1200 л/га для плодово-ягідних культур (залежно від об'єму крони), 300–400 л/га для овочевих культур, 600–800 л/га для виноградників.



Хорус®

ВИРІШАЛЬНИЙ ЧИННИК У БОРОТБІ З ХВОРОБАМИ НА ПЛОДОВИХ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Хорус® 75 WG, в. г.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	750 г/кг ципродинілу
	ХІМІЧНА ГРУПА	Анілінопіримідини
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Вододисперсні гранули
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	1 кг



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Високоєфективний захист при низьких температурах
- ✓ Захисна і викорінювальна дії
- ✓ Неперевершена дія для захисту від комплексу хвороб при різких перепадах температур
- ✓ Діє проти зимуючих стадій збудників хвороб
- ✓ Не змивається дощем після обробки
- ✓ Покращує якість продукції, продовжує зберігання
- ✓ Найкраща бакова суміш проти комплексу хвороб — Скор® + Хорус®

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, кг/га	Кратність обробок / Термін очікування	
ЯБЛУНЯ	Парша, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	0,2	4/30	
	Моніліоз		0,25		
ГРУША	Парша		0,2		
	Моніліоз		0,25–0,3		
СЛИВА	Моніліоз, клястероспоріоз				
ПЕРСИК	Моніліоз, кучерявість листя, клястероспоріоз				0,2–0,3
АБРИКОС	Моніліоз, клястероспоріоз				
ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ	Моніліоз, кокомікоз, клястероспоріоз		0,25–0,3	3/30	
ВИНОГРАДНИКИ	Мілдью, оїдіум, сіра гниль		0,5–0,7	3/7	

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, кг/га	Кратність обробок / Термін очікування
ПОЛУНИЦЯ	Борошниста роса, біла і бура плямистості, сіра гниль	Обприскування в період вегетації до цвітіння	0,7	1/7
		Обприскування в період вегетації після цвітіння	0,4	
СОНЯШНИК	Сіра гниль	Обприскування в період вегетації	0,75	1/-
ГАЗОННІ ТРАВИ	Плямистості листя		0,6	2/-

ОПТИМАЛЬНІ ТЕРМІНИ ЗАСТОСУВАННЯ: Від фази зеленого конуса до цвітіння при температурі від +5 °С до +10 °С. Не впливає на комах-запилювачів, ґрунтові організми та корисну ентомо- й акарифауну. Слід проводити ранню обробку з профілактичною метою. В сумішах з іншими препаратами неодмінно перевіряти на сумісність.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 800–1200 л/га — плодово-ягідні (залежно від об'єму крони), 200–250 л/га — польові культури, 600–800 л/га — виноградники.











Циделі™ Топ

АСОЦІАЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Циделі™ Топ 140 DC, КД
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	125 г/л дифеноконазолу, 15 г/л цифлufenаміду
	ХІМІЧНА ГРУПА	Триазоли, амідоксими
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат, що диспергується
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Двокомпонентний системний препарат для захисту насаджень яблуні від комплексу хвороб (парші, борошнистої роси) з лікувальним ефектом
- ✓ Цифлufenамід — новий механізм дії борошністоросяних грибів
- ✓ Подовжена профілактична, лікувальна й залишкова активність (до 30–40 днів)
- ✓ Потужна трансламінарна дія
- ✓ Поєднання двох діючих речовин унеможлиблює виникнення резистентності
- ✓ Найкращі періоди для застосування на яблуні — фаза рожевого бутона і фаза «грецький горіх»

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ЯБЛУНЯ	Парша, борошниста роса	У період вегетації	0,5–0,7	2/14
ОГІРКИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ	Борошниста роса		0,8–1,0	2/14
ОГІРКИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ				
ТОМАТИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ	Борошниста роса, альтернаріоз			
МОРКВА				

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 600–1000 л/га — яблуня (залежно від об'єму крони) й огірки закритого ґрунту (залежно від вегетативної маси), 200–400 л/га — овочі відкритого ґрунту.



Дифеноконазол — речовина, яка проникає в структуру листків. Припиняє розвиток грибків, проникаючи в структуру листків і гаусторій та перериваючи біосинтез стеринів в оболонках клітин, що призводить до порушення функції мембрани, витоку вмісту цитоплазми і загибелі гіфів.

Цифлufenамід — це новий механізм дії, що пригнічує:




- 1) формування апресорію;
- 2) розвиток міцеліїв та розростання колоній;
- 3) утворення спор.





КОНТАКТНИЙ ФУНГІЦИД З УНІКАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Ширлан™ 500 SC, к. с.
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	500 г/л флуазинаму
	ХІМІЧНА ГРУПА	Динітроаніліни
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Концентрат суспензії
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	5 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Зупиняє проростання спор і зооспор, появу апресоріїв, ріст гіфів гриба, а також спороутворення на живих і неживих тканинах
- ✓ Блокує рухомість зооспор на поверхні ґрунту
- ✓ Широкий спектр активності: захист як рослини, так і бульб при зберіганні
- ✓ Відмінний елемент антирезистентних рішень
- ✓ Тривала дія і надійний захист проти хвороб навіть за несприятливих погодних умов



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ЦИБУЛЯ	Пероноспороз	Обприскування в період вегетації	0,4	3/10
ТОМАТИ	Альтернاریоз, фітофтороз		0,3–0,4	4/10
КАРТОПЛЯ	Альтернاریоз, фітофтороз		4/7	

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю фунгіцидів та інсектицидів, проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність. Може використовуватися з десикантом **Реглон® Супер** при проведенні десикації картоплі й цибулі.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: При інтенсивному рості культури слід застосовувати максимальні норми препарату для захисту молодих листків і пагонів.

Картопля: першу обробку проводити за висоти рослин 15–20 см, другу — перед початком усихання бадилля.

Томати, цибуля: обприскування проводити профілактично при настанні сприятливих для розвитку і поширення хвороб погодних умов.







РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 300–400 л/га.



Юніформ®

УНІВЕРСАЛЬНА ВАКЦИНА ДЛЯ ЗДОРОВОГО ВРОЖАЮ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Юніформ® 446 SE, SE
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	322 г/л азоксистробіну, 124 г/л металаксилу-М
	ХІМІЧНА ГРУПА	Стробілурини, феніламіді
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Суспензійна емульсія
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: II
	УПАКОВКА	1 л



ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Просте вирішення проблем із кореневими хворобами
- ✓ Пригнічення широкого спектра патогенів
- ✓ Захищаючи кореневу систему, захищає всю рослину
- ✓ Має системно-лікувальну дію
- ✓ Підвищує стресостійкість рослини в посушливих умовах

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	Кратність обробок / Термін очікування
ТОМАТИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ	Комплекс корневих захворювань (фузаріоз, пітім, ризоктоніоз та ін.)	У період вегетації з поливною водою через системи крапельного зрошення	0,4–0,9	2/7
ТОМАТИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ			0,25–0,45 л на 1 м ³ води	2/5
ОГІРКИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ			0,4–0,9	2/7
ОГІРКИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ			0,25–0,45 л на 1 м ³ води	2/5
КАВУН			0,4–0,9	3/30
ЦИБУЛЯ			0,5+0,5+0,5	3/30
КАРТОПЛЯ	Ризоктоніоз, срібляста парша, антракноз, фітофтороз	Обприскування дна борозни під час садіння	1,5	1/30

СУМІСНІСТЬ: Сумісний із більшістю інсектицидів, регуляторів росту рослин. У кожному конкретному випадку слід проводити тести на сумісність.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Вчасна подача робочого розчину в поливному циклі забезпечує правильне розміщення фунгіциду в кореневій зоні. На легких ґрунтах його треба вносити протягом третьої чверті, на важких — протягом другої третини поливного циклу.

Застосування на помідорах починається від фази другого справжнього листка.




ҐРУНТОВЕ ВНЕСЕННЯ ФУНГІЦИДІВ: Фунгіцид, який вноситься в ґрунт, повинен добре розчинятися у воді, слабо поглинатися ґрунтом і мати середню швидкість розкладання.


Діючі речовини	Розчинність у воді, мг/л	Поглинання ґрунтом, мг/г	Період напіврозкладу (ДТ50), дні
РЕЧОВИНИ, МОЖЛИВІ ДЛЯ ҐРУНТОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ	> 1	< 1000	20–60
АЗОКСИСТРОБІН (ЮНІФОРМ®)	6	500	68
ФЛУДИОКСОНІЛ (МАКСИМ®)	1,8	1600	18
ПЕНЦИКУРОН	0,3	> 1 000	37,7

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ҐРУНТОВОГО ВНЕСЕННЯ ЮНІФОРМ®

- Обприскування дна борозни при посадці бульб за допомогою двох форсунок, установлених на картоплесаджалку
- Заробка препарату по всьому ґрунтовому профілю гребеня
- Перший розпилювач обприскує ґрунт на дні борозни перед падінням бульби
- Другий розпилювач обприскує стінки борозни після падіння бульби при її закритті
- Факел розпилу форсунок слід відрегулювати так, щоб ширина захвату оброблюваної поверхні дна борозни становила 15–20 см



Правильна установка розпилювача — 45–55 градусів від вертикалі



Перетин осей факелів розпилу — найоптимальніше місце

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ НА КАРТОПЛІ

- Відмінна системна дія дозволяє повністю захищати не тільки кореневу систему, а й прикореневу частину рослини від посадки до цвітіння
- Найширший спектр пригнічуваних збудників хвороб, знезаражує ґрунт, корені і стебла
- Найефективніші діючі речовини для внесення в ґрунт при посадці
- Готове антирезистентне рішення завдяки двом діючим речовинам із різних класів
- Якісний урожай, вільний від хвороб
- Зберігає максимальну кількість рослин на гектарі

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО

РОЗЧИНУ: 80–200 л/га — на картоплі.

Європейська назва — Амістар-технологія — походить від того, що у Європі назву Amistar має фунгіцид із вмістом азоксистробіну (250 г/л). В Україні йому відповідає **Квадріс®**.

Фунгіциди **Амістар® Екстра** й **Амістар® Тріо**, зареєстровані в Україні, крім азоксистробіну, містять також діючі речовини з хімічної групи триазолів — пропіконазол і ципроконазол. **Амістар® Екстра** й **Амістар® Тріо** на картоплі застосовувати не можна, по-перше, тому що вони не мають офіційної реєстрації, а по-друге, діючі речовини з хімічної групи триазолів на початкових фазах розвитку паростків завдають їм істотного фітотоксичного впливу. В результаті пригнічується їхній ріст, затримується не тільки поява сходів, а й ріст рослин у початковий період.

В Україні компанія «Сингента» для внесення в ґрунт при садінні картоплі пропонує лише один продукт із вмістом азоксистробіну — **Юніформ®**



Про фунгіциди

Фунгіциди — речовини, які використовуються для захисту рослин від збудників грибкових хвороб. Можливість вилікувати рослини від грибкових захворювань шляхом обробки препаратами листя й кореневої системи відкрили ще у XIX столітті, коли вперше було обґрунтовано походження грибкових хвороб і створено перші неорганічні захисні фунгіциди — бордоську рідину та ін.

Фунгіциди для обробки рослин поділяють на захисні й лікувальні (викорінювальні). Захисні фунгіциди використовують для профілактики (превентивно або до ураження хворобою). Лікувальними фунгіцидами називають речовини, обробка якими після проникнення збудника пригнічує розвиток патогену в рослині. Фунгіциди відрізняються також своїми системними властивостями. Фунгіциди системної дії — це фунгіциди, які проникають всередину рослини, поширюються по судинній системі і пригнічують розвиток збудника унаслідок безпосередньої дії на нього або в результаті обміну речовин у рослині. Натомість при обробці рослин контактними фунгіцидами вони залишаються на поверхні рослини і викликають загибель збудника безпосередньо при контакті з ним. Фунгіциди системної дії в багатьох випадках мають і захисну, і лікувальну дію, а контактні — лише захисну. Рослини швидко поглинають фунгіциди системної дії, тому їхня ефективність меншою мірою, ніж у контактних, залежить від опадів. Хвороби рослин викликає величезна кількість патогенів. Тому щоб вирішити весь комплекс проблем захисту рослин від хвороб (зокрема, для зменшення вірогідності виникнення резистентності до них), потрібен широкий спектр фунгіцидів і їх комбінацій, які застосовуються і послідовно, і по чергово.

Сьогодні компанія «Сингента» пропонує велику кількість діючих речовин із різних хімічних класів та їх комбінації в препаратах:

- ✓ Триазоли (**Тілт®**, **Альто® Супер**, **Скор®**, **Топаз®**, **Циделі™ Топ**)
- ✓ Морфоліни (**Тілт® Турбо**)
- ✓ Феніламіді (**Ридоміл® Голд МЦ**, **Юніформ®**)
- ✓ Анілінопіримідини (**Хорус®**)
- ✓ Стробілурини (**Квадріс®**, **Амістар® Екстра**, **Амістар® Тріо**, **Амістар® Голд**)
- ✓ Динітроаніліни (**Ширлан™**)
- ✓ Карбоксаміди (**Елатус® Ріа**, **Міравіс®**, **Міравіс® Прайм**, **Міравіс® Нео**)
- ✓ Амідоксими (**Діналі®**, **Циделі™ Топ**)
- ✓ Піперидинил-тіазол-ізоксазоліни (**Орондіс® Ультра**)
- ✓ Фенілпіроли (**Світч®**, **Міравіс® Прайм**)

Карбоксаміди, або SDHI — інгібітори сукцинатдегідрогенази. Завдяки яскраво вираженим ліпофільним властивостям діючі речовини міцно зв'язуються з восковим шаром і повільно проникають у тканини рослин, забезпечуючи ефективний і тривалий захист. Саме завдяки таким властивостям діючі речовини цієї групи ефективно контролюють широкий спектр хвороб на багатьох культурах. Карбоксаміди слід застосовувати профілактично або на початкових етапах розвитку хвороб, що забезпечить тривалий захист і допоможе знизити ризик розвитку резистентності. Ще одна особливість карбоксамідів — виражений фізіологічний (озеленювальний) ефект.

На особливу увагу заслуговують також фунгіциди з класу стробілуринів, їх розроблено з метою підвищити ефективність захисту рослин від патогенів різних класів (*Oomycetes*, *Basidiomycetes*, *Deuteromycetes*, *Ascomycetes*), тобто від більшості хвороб (борошнистої роси, фітофторозу, ринхоспоріозу, іржі, сірої гнилі, плямистостей, інших захворювань). Особливість цього класу — фізіологічний вплив на рослину.

Варта уваги також група морфолінів. За механізмом дії це інгібітори синтезу стеролів, які дають швидкий стоп-ефект на збудників листових хвороб (особливо борошносторосяних) навіть в умовах нестабільного температурного режиму. Морфоліни починають діяти при температурі від +6 °С, що дозволяє максимально рано зупинити розвиток хвороби.

Компанія «Сингента» пропонує клієнтам останні розробки фунгіцидних компонентів — нові діючі речовини з хімічних груп карбоксамідів (**Елатус® Ріа**, **Міравіс®**) та амідоксими (**Діналі®**, **Циделі™ Топ**) або піперидинил-тіазол-ізоксазолінів (**Орондіс® Ультра**).

Цифлуфенамід ефективний проти всіх штамів хвороб, стійких до стробілуринів, морфолінів, триазолів тощо. Вони діють системно: їх поглинає листя і вони акропетально переміщуються в потоці транспірації у ксилему, де відбувається їх трансламінальний розподіл у тканинах рослини.

МЕХАНІЗМ ДІЇ ОСНОВНИХ КЛАСІВ ФУНГІЦИДІВ

FRAC код	Механізм дії	Хімічна група	Діюча речовина	Препарат	Ризик резистентності	Принцип дії
3	Біосинтез стеролу в мембрані (C14-диметилази)	Триазоли	Ципроконазол	Альто® Супер Амістар® Екстра Амістар® Тріо Магнелло® Елатус® Ріа	Середній	Системний
			Дифеноконазол	Амістар® Голд Діналі® Квадріс® Топ Ревус® Топ Ріас™ Сетар® Скор® Циделі™ Топ		
			Пропіконазол	Міравіс® Нео Ріас™ Тілт® Тілт® Турбо Елатус® Ріа		
			Пенконазол	Топаз®		
5	Біосинтез стеролу в мембрані (8 і 7 ізомерази і 14 редуктази)	Морфоліни	Фенпропідин	Тілт® Турбо	Низький–середній	Системний
9	Біосинтез метіоніну	Анілінопіримідини	Ципродиніл	Світч® Хорус®	Середній	Системний
11	Мітохондріальне дихання клітин патогену	Стробілурини	Азоксистробін	Міравіс® Нео Амістар® Голд Амістар® Екстра Амістар® Тріо Квадріс® Квадріс® Топ Юніформ®	Високий	Трансламінарний
M 02	Багатофункціональна дія	Неорганічні сполуки	Сірка	Тіовіт Джет®	Низький	Контактний
M 03	Багатофункціональна дія	Дитіокарбамати	Манкоцеб	Ридоміл® Голд МЦ	Низький	Контактний
–	Порушення мітозу	Динітроаніліни	Флуазинам	Ширлан™	–	Контактний
11	Біосинтез стеролу в мембрані	Манделаміди	Мандіпропамід	Пергадо® R Ревус® Топ	Низький–середній	Трансламінарний
7	Інгібування сукцинатдегідрогенази	Карбоксаміди	Солатенол™	Елатус® Ріа	Високий	Трансламінарний
			Адепідин™	Міравіс® Міравіс® Прайм Міравіс® Нео		
U6	Інгібування сукцинат-дегідрогенази	Амідоксими (фенілацетаміди)	Цифлуфенамід	Діналі® Циделі™ Топ	Низький	Системний
F9	Інгібітор гомологу білка, що зв'язує оксистерол (OSBPI)	Піперидинил-тіазол-ізоксазолін	Оксатіапіпролін	Орондіс® Ультра	Середній	Системний
E2	Порушення функцій клітинних мембран	Фенілпіроли	Флудиоксоніл	Світч® Міравіс® Прайм	Низький	Контактний

РОДЕНТИЦИДИ

Талон™, RB, ГП (гранули)..... 148

Талон™, RB, ПБ (воскові брикети). 149



САЙТ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»
SYNGENTA.UA, РОЗДІЛ «ОФІЦІЙНІ
ДИСТРИБ'ЮТОРИ НАПРЯМУ
ЗАХИСТ ВІД ГРИЗУНІВ, ТАРГАНІВ
ТА ІНШИХ»



ДЕТАЛЬНО ПРО ПРОДУКТИ
НА САЙТІ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»
SYNGENTA.UA В РОЗДІЛІ
«ЗАХИСТ ВІД ГРИЗУНІВ,
ТАРГАНІВ ТА ІНШИХ»



НОВИЙ









Талон™ RB, ГП

Гранули

ПЕРЕВІРЕНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ГРИЗУНАМИ

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Талон™, RB, ГП (гранули)
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	Бродіфакум, 0,05 г/кг
	ХІМІЧНА ГРУПА	Антикоагулянт крові з групи кумаринів
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Готова приманка
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	2,5 кг, 40 кг

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ⓪ Високоякісна злакова основа та низка смакових добавок забезпечують найвищий показник привабливості для гризунів серед інших родентицидів
- ⓪ Привабливий для споживання навіть за наявності альтернативних джерел харчування
- ⓪ Легко дозується завдяки однорідності й розміру гранул
- ⓪ Рівномірний розподіл діючої речовини по всіх гранулах
- ⓪ Надійний: забезпечує ефективний контроль за один прийом порції принади
- ⓪ Широкий спектр застосування в усіх сферах життєдіяльності людини
- ⓪ Економічний у використанні

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Об'єкти	Гризуні	Норма витрати	Кількість обробок
СКЛАДИ, ПРИСКЛАДСЬКІ ТЕРИТОРІЇ, СХОВИЩА, ПОГРЕБИ, КОРМОЦЕХИ, ГОСПОДАРСЬКІ СПОРУДИ, В УМОВАХ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ І В ПРИМІЩЕННЯХ, НА ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНКАХ, РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, МІСЦЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ	Щури (сірий і чорний)	20–50 г через 5–10 м	Принади розміщують у місцях скупчення гризунів і контролюють їх щотижня. У разі поїдання принади поповнюють
	Миші (хатня, полівка звичайна)	5–15 г через 2–5 м	

Талон™ діє з першого поїдання. Достатньо однієї принади в слушному місці, і ви отримуєте знищення шкідників на всій ділянці. Адже **Талон™** має надзвичайну смакову принадливість у поєднанні із надійною ефективністю, що досягається використанням високоякісних матеріалів, смакових добавок та рівномірного розподілення високоочищеної діючої речовини.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ: Приманку **Талон™**, гранули розкладають у місцях, де спостерігається активність гризунів: уздовж стін, перегородок, у темних кутках, під укряттям. Для запобігання поїданню принади свійськими тваринами доцільно помістити її у спеціальних чи пристосованих для цього контейнерах з пластику, картону, жерсті, в обрізках труб тощо. Перед застосуванням принади видавити легкодоступні для гризунів харчові продукти, розсипане зерно тощо.



ПЕРЕВІРЕНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ГРИЗУНАМИ
ЗА БУДЬ-ЯКИХ ПОГОДНИХ УМОВ



ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

	ПОВНА НАЗВА	Талон™, RB, ПБ (воскові брикети)
	ВМІСТ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ	Бродіфакум, 0,05 г/кг
	ХІМІЧНА ГРУПА	Антикоагулянт крові з групи кумаринів
	ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА	Готова приманка
	КЛАС ТОКСИЧНОСТІ	Класифікація ВООЗ: III
	УПАКОВКА	10 кг

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Тривале збереження властивостей родентициду, зокрема в умовах підвищеної вологості та температури повітря, завдяки унікальній препаративній формі
- ✓ Високоякісна злакова основа й низка смакових добавок забезпечують найвищий показник привабливості для гризунів серед інших родентицидів
- ✓ Привабливий для споживання навіть за наявності альтернативних джерел харчування
- ✓ Рівномірний розподіл діючої речовини по восковому брикеті
- ✓ Надійний: забезпечує ефективний контроль за один прийом порції принади
- ✓ Широкий спектр застосування в усіх сферах життєдіяльності людини
- ✓ Універсальний, економічний та зручний у використанні



ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

Об'єкти	Гризун	Норма витрати	Кількість обробок
СКЛАДИ, ПРИСКЛАДСЬКІ ТЕРИТОРІЇ, СХОВИЩА, ПОГРЕБИ, КОРМОЦЕХИ, ГОСПОДАРСЬКІ СПОРУДИ, В УМОВАХ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ, КОМОРИ, ПРИСАДИБНІ ДІЛЯНКИ, РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, МІСЦЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ	Щури (сірий і чорний)	20–60 г через 10 м	Принади розміщують у місцях скупчення гризунів і контролюють їх щотижня. У разі поїдання принади поповнюють
	Миші (хатня, полівка звичайна)	20 г через 5 м	

Воскові брикети **Талон™** виробляють із високоякісної зернової основи зі смаковими складниками, матриці з якої відливають у форми з рівномірним розподілом активних речовин і принади. Це робить брикети надійнішими і стійкішими до надмірної вологи, ніж блоки, виготовлені традиційним пресуванням, які зазвичай містять великі частинки харчового зерна.


ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ: Приманку **Талон™**, воскові брикети розкладають у місцях, де спостерігається активність гризунів: уздовж стін, перегородок, у темних кутках, під укряттям. Для запобігання поїдання принади свійськими тваринами доцільно помістити її в спеціальних або пристосованих для цього контейнерах із пластику, картону, жерсті, в обрізках труб тощо. Перед застосуванням принади видаляти легкодоступні для гризунів харчові продукти, розсипане зерно тощо.

АГРОГІД

АгроГід.....	152	Сервіс «Фітопатогенне навантаження ґрунту»	160
Програма технічної підтримки протягом року	153	Як відібрати зразки.....	161
Про діагностичні центри	154	Спеціалізація діагностичних центрів і тривалість експертизи	162
Сервіс «Фітоекспертиза насінневого матеріалу»	156	Контактна інформація.....	162
Сервіс «Посівні якості насіння»	156	Як замовити сервіс.....	163
Сервіс «Фітоекспертиза рослинного матеріалу».....	157	Технічні сервіси як запорука максимальної віддачі при використанні продуктів компанії «Сингента».....	164
Сервіс «Імуноферментний аналіз насінневого і рослинного матеріалу»	157	Чому сервіс налаштування обприскувачів та перевірки якості внесення корисний для вашого бізнесу?	166
Сервіс «ПЛР-діагностика насінневого і рослинного матеріалу»	158	Сервіс калібрування протруювальних машин та перевірки якості нанесення	167
Сервіс «Прогнозування вірогідності появи хвороб і шкідників за допомогою метеорологічних предикторів»	159	Сервіс «Перевірка якості води для внесення ЗЗР»	167
Сервіс «Польовий моніторинг»	159		
Сервіс «Встановлення рівня гібридності (типовості) гібридів соняшнику й кукурудзи»	160		







АгроГід

АгроГід – це унікальна інноваційна програма технічної підтримки, яка охоплює:

- Широкий спектр послуг мережі діагностичних центрів
- Сервіс налаштування обприскувачів та перевірки якості внесення
- Польовий моніторинг
- Тренінги, навчання і консультації експертів компанії «Сингента»
- Сервіс калібрування протруювальних машин та перевірки якості нанесення



Програма технічної підтримки протягом року



Про діагностичні центри

В'ЯЧЕСЛАВ ГАВРИЛЯНЧИК

Керівник підрозділу технічного розвитку та підтримки ЗЗР в Україні, компанія «Сингента»

Лабораторні сервіси — один із напрямів комплексної програми технічної підтримки «АгроГід» для клієнтів компанії «Сингента». Унікальне поєднання науки і виробництва дозволяє активно розвиватися й адаптуватися до потреб сучасного фермера. Послуги діагностичних центрів розроблено спеціально для вирішення загроз майбутньому врожаю на будь-якому етапі виробництва продукції рослинництва.

Мережа діагностичних центрів компанії «Сингента» на території України функціонує вже більше як п'ять років. За цей час нам вдалося накопичити великий масив наукових і аналітичних даних про фітопатологічний стан і по окремих регіонах, і по Україні загалом. Крім того, ми постійно підвищуємо рівень експертизи і професіоналізму, чим завжди раді поділитися з нашими клієнтами.


Одна з найбільших переваг технічних сервісів — їхня комплексність. Компанія «Сингента» пропонує послуги лабораторних сервісів, починаючи від фітоекспертизи посівного матеріалу, контролю збудників хвороб у період вегетації сільськогосподарських культур, зокрема їхніх латентних форм, а також вірусних інфекцій, і закінчуючи діагностикою якості отриманого врожаю.

Інвестиції в наукові розробки та співпраця з провідними українськими і закордонними вченими дозволяють нам працювати на випередження — створювати унікальні системи діагностики фітопатогенів.

Користуючись сервісами «АгроГід», ви отримуєте комплексну технічну підтримку, наш досвід та унікальну інформацію про приховані небезпеки можливих утрат урожаю.


На основі отриманих діагностичних даних наші експерти допоможуть попередити проблему або запропонують максимально ефективно її вирішення.





- Фітоекспертиза рослинного матеріалу
- Фітоекспертиза насінневого матеріалу
- Лабораторія по роботі з вовчком
- Молекулярно-біологічні методи діагностики
- Аналіз якості води для внесення ЗЗР
- Фітопатогенне навантаження ґрунту

БДЦ — Білоцерківський діагностичний центр
ХДЦ — Харківський діагностичний центр
ОДЦ — Одеський діагностичний центр
ХмДЦ — Хмельницький діагностичний центр




СЕРВІС «ФІТОЕКСПЕРТИЗА НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ»

дозволяє оцінити посівні якості насіння сільськогосподарських культур за стандартизованими методиками ДСТУ й ISTA, отримати кваліфіковані рекомендації із запобігання розвитку й поширенню хвороб та шкідників насіння, отримати обґрунтовану консультацію з підбору й застосування препаратів. Тривалість експертизи — 10–14 днів (залежно від культури).

СЕРВІС ПЕРЕДБАЧАЄ:

- Фітопатологічну експертизу насіння (зараженість насіння збудниками хвороб)
- Визначення схожості й енергії проростання
- Встановлення маси 1000 насінин
- Аналіз чистоти й відходу насіння
- Надання рекомендацій згідно з результатами експертизи

Понад 60 % видів фітопатогенів поширюються через насіння. Використання інфікованого посівного матеріалу спричиняє дальше зараження вегетуючих рослин і в такий спосіб створює й підтримує вогнища інфекції в полі




СЕРВІС «ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ»

дозволяє визначити посівну придатність насіння сільськогосподарських культур із використанням нормативних документів (ДСТУ 4138–2002). Згідно з результатами експертизи надаються рекомендації. Тривалість експертизи — 7–14 днів (залежно від культури).

СЕРВІС ПЕРЕДБАЧАЄ:

- Визначення енергії і схожості насіння
- Визначення маси 1000 насінин (за запитом для непротруєного насіння)
- Аналіз чистоти й відходу насіння (за запитом для непротруєного насіння)
- Надання рекомендацій згідно з результатами експертизи





СЕРВІС «ФІТОЕКСПЕРТИЗА РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ»

дозволяє діагностувати грибкові, бактеріальні інфекції рослин, нематоди та шкідників, отримати науково обґрунтовані рекомендації з підбору препаратів і агротехнічних прийомів для уникнення можливих утрат урожаю. Тривалість експертизи — 8–10 днів (залежно від культури).

СЕРВІС ПЕРЕДБАЧАЄ:

- Первинний огляд та інкубування зразків у лабораторних умовах (вологі камери, живильні середовища та ін.)
- Мікроскопіювання зразків та ідентифікацію наявних фітопатогенів і шкідників
- Визначення наявності нематод
- Розробку комплексу профілактичних і захисних заходів





СЕРВІС «ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ АНАЛІЗ НАСІННЕВОГО І РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ»

дає змогу ідентифікувати та/або діагностувати збудників хвороб рослин, переважно вірусної і бактеріальної етіології. Проводиться за допомогою імунологічного методу (ІФА), в основі якого лежить специфічна реакція антиген—антитіло, для виявлення фітопатогенних бактерій і вірусів рослин.

Крім визначення фітопатогенних мікроорганізмів, цей метод застосовують для визначення вмісту мікотоксинів — специфічних сполук, які продукують токсикогенні гриби і на які встановлено граничні норми вмісту в зерні та в продуктах його переробки. Цей метод дозволяє не тільки виявити мікотоксини в зерні, а й визначити їх кількість. Тривалість експертизи рослинного матеріалу — 2–3 дні, насінневого — 40 днів.

МІКОТОКСИНИ І ЗБУДНИКИ ХВОРОБ, ЯКІ ДІАГНОСТУЮТЬСЯ ЗА ДОПОСМОГОЮ ІФА:

Сільськогосподарські культури	Етіологія хвороби	Збудники/мікотоксини
ЗЕРНОВІ ЗЛАКОВІ	Вірусні хвороби	Вірус жовтої карликовості ячменю (<i>Barley Yellow Dwarf Virus. BYDV</i>) Вірус смугастої мозаїки пшениці (<i>Wheat Streak Mosaic Virus. WSMV</i>) Вірус карликовості пшениці (<i>Wheat Dwarf Virus. WDV</i>)
ЗЕРНО І ПРОДУКТИ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ	Вторинні метаболіти фузарієвих грибів	Афлатоксин загальний Зеараленон Фумонізін Деоксиніваленол (ДОН) Т-2 токсин
СОЯ	Вірусні хвороби	Вірус зморшкуватої мозаїки сої (<i>Soybean Mosaic Virus. SMV</i>) Вірус кільцевої плямистості тютюну (<i>Tobacco Ringspot Virus. TRSV</i>)
КАРТОПЛЯ	Бактеріальні хвороби	Кільцева гниль картоплі (<i>Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus</i>) Бура гниль картоплі (<i>Ralstonia solanacearum</i>) М'яка гниль і чорна ніжка картоплі (<i>Pectobacterium atrosepticum</i>)
ТОМАТИ	Вірусні хвороби	Вірус аспермії томатів (<i>Tomato Aspermy Cucumovirus. TAV</i>) Вірус мозаїки томатів (<i>Tomato Mosaic Tobamovirus. ToMV</i>) Вірус тютюнової мозаїки томатів (<i>Tobacco Mosaic Tobamovirus. TMV</i>)



* Додаткову інформацію шукайте на офіційному сайті www.syngenta.ua в розділі «Сервіси».



СЕРВІС «ПЛР-ДІАГНОСТИКА НАСІННЄВОГО І РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ»


Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) — сучасний молекулярно-біологічний метод, який завдяки своїй високій чутливості й специфіці дозволяє встановити поодинокі копії геномів патогенів і одночасно визначає їх наявність тоді, коли іншими методами (імунологічними, бактеріологічними, мікроскопічними) це зробити майже неможливо. Метод ПЛР-аналізу дає змогу проводити ранню діагностику фітопатогенних мікроорганізмів основних сільськогосподарських культур ще до появи їх видимих симптомів у полі та безпосередньо доводить присутність збудника інфекції, специфічно визначаючи наявність конкретної послідовності нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК) виявленого патогену.

ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ:

- Виявлення латентних (форм мікроорганізмів, які існують приховано) інфекцій ще до появи видимих симптомів
- Ідентифікація токсигенних грибів роду *Fusarium*
- Визначення бактеріальних і вірусних захворювань, які важко діагностуються традиційними методами
- Специфічність і висока чутливість методу
- Швидке отримання результатів — 2–3 дні

ЗБУДНИКИ ХВОРОБ, ЯКІ ДІАГНОСТУЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛР-АНАЛІЗУ

Сільськогосподарські культури	Хвороби	Збудники
ЗЕРНОВІ ЗЛАКОВІ	Грибні хвороби	Фузаріози (<i>F. graminearum</i> , <i>F. avenaceum</i> , <i>F. oxysporum</i>) Ризоктоніози (<i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Ceratobasidium cereale</i>) Септоріози (<i>Zymoseptoria tritici</i> , <i>Parastagonospora nodorum</i>)
КУКУРУДЗА	Грибні хвороби	Летюча сажка кукурудзи (<i>Sorosporium reilianum</i>)
СОНЯШНИК	Грибні хвороби	Фомопсис (<i>Diaporthe helianthi</i>) Сіра гниль (<i>Botrytis cinerea</i>)
ТОМАТИ	Бактеріальні хвороби	Бактеріальний рак томатів (<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>)
ПЛОДОВІ	Бактеріальні хвороби	Бактеріальний опік плодів (<i>Erwinia amilovora</i>) Моніліальний опік плодів (<i>Monilinia fructicola</i> , <i>Monilinia fructigena</i> , <i>Monilinia laxa</i> та <i>Monilia polystroma</i>)
КАРТОПЛЯ	Вірусні хвороби	L-вірус картоплі (<i>Potato Leafroll Polerovirus. PLRV</i>) X-вірус картоплі (<i>Potato X Potexvirus. PVX</i>) Y-вірус картоплі (<i>Potato Y Potyvirus. PVY</i>) M-вірус картоплі (<i>Potato M Carlavirus. PVM</i>) S-вірус картоплі (<i>Potato S Carlavirus. PVS</i>)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КУЛЬТУРИ	Фітоплазмозна інфекція	<i>Candidatus Phytoplasma</i>





СЕРВІС «ПРОГНОЗУВАННЯ ВІРОГІДНОСТІ ПОЯВИ ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ПРЕДИКТОРІВ»

Прогноз ризиків зараження захворюваннями і появи шкідників дає змогу визначити оптимальні терміни обробки з метою профілактики.

Шкідники — основні переносники вірусів рослин

МЕТЕОПРОГНОЗ ХВОРОБ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Сільськогосподарські культури	Прогноз хвороб
ВИНОГРАД	Мілдью (несправжня борошниста роса), ботрітіс, чорна гниль
ЯБЛУНЯ	Парша, червона бактеріальна гниль коренів
ГРУША	Парша, бура плямистість листків і плодів
КІСТОЧКОВІ	Моніліоз, псевдомона, плямистість
ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ	Борошниста роса, ботрітіс
ОГІРКИ	Несправжня борошниста роса
ТОМАТИ	Бура плямистість пасльонових, фітофтороз пасльонових, ботрітіс
КАРТОПЛЯ	Чорна альтернаріозна плямистість, фітофтороз
ЦИБУЛЯ	Несправжня борошниста роса (пероноспороз), ботрітіс
САЛАТ	Несправжня борошниста роса
ПШЕНИЦЯ	Іржа, септоріоз, фузаріоз
КАНОЛА, СОНЯШНИК, ПЕРЕЦЬ	Склеротиніоз
СОЯ	Іржа
ЦУКРОВИЙ БУРЯК	Церкоспороз
ГАЗОННА ТРАВА	Пітіозна коренева гниль, бура плямистість злакових трав, фузаріоз, тифульоз злакових трав

МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ ШКІДНИКІВ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМІНІВ ОБРОБКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ФЕРОМОННИХ ПАСТОК. ШКІДНИКИ, МОНІТОРИНГ ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ФЕРОМОННИХ ПАСТОК:

- Яблунева плодожерка
- Східна плодожерка
- Сливової плодожерка
- Бавовникова совка
- Гронова листовійка
- Айвова плодожерка
- Капустяна совка
- Каліфорнійська щитівка
- Стебловий жук, метелик
- Ріпаковий квіткоїд
- Вишнева муха
- Томатна міль



СЕРВІС «ПОЛЬОВИЙ МОНІТОРИНГ» — це контроль основних умов розвитку рослин, який дає змогу визначити можливі неінфекційні захворювання, що їх може бути викликано браком мікроелементів у живленні або порушенням агротехніки.

СЕРВІС ПЕРЕДБАЧАЄ:

За допомогою спеціальних приладів наші експерти проведуть аналіз з визначення браку мікроелементів у рослинах, щільності, кислотності та вологості ґрунту.



* Додаткову інформацію шукайте на офіційному сайті www.syngenta.ua в розділі «Сервіси».




СЕРВІС «ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ГІБРИДНОСТІ (ТИПОВОСТІ) ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ Й КУКУРУДЗИ»

Створені компанією «Сингента» гібриди соняшнику й кукурудзи мають цінні біологічно-агрономічні властивості, а отже, гарантують очікувану врожайність. Сервіс «Встановлення рівня гібридності (типовості) гібридів соняшнику й кукурудзи» дозволяє підтвердити оригінальність придбаного насіння. Тривалість експертизи — 5–7 днів.

СЕРВІС ПЕРЕДБАЧАЄ:

- Встановлення належності/неналежності партії насіння або рослин у полі до певного гібрида соняшнику чи кукурудзи компанії «Сингента»
- Аналіз партії насіння або рослинного матеріалу за допомогою ДНК-маркерів (мікросателітів)
- Виявлення рівня гібридності (типовості) партії насіння гібридів соняшнику чи кукурудзи компанії «Сингента»
- Можливість встановити належність гібридів соняшнику чи кукурудзи до F1 покоління
- Можливість виявити домішки сторонніх сортів та/або гібридів соняшнику чи кукурудзи

Вирощування тільки оригінального насіння забезпечує отримання врожаю з очікуваними біологічно-агрономічними характеристиками





СЕРВІС «ФІТОПАТОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ ҐРУНТУ»

дозволяє визначити рід домінуючих мікроміцетів ґрунту та отримати рекомендації щодо норми внесення препарату. Метод діагностики «Фітопатогенне навантаження ґрунту» виконується згідно з методикою ґрунтових розведень Ваксмана. Тривалість аналізу — від 7 до 14 днів.

СЕРВІС ПЕРЕДБАЧАЄ:



- Визначення родового складу фітопатогенів (серед яких трапляються високопатогенні види *Fusarium spp.*, *Pythium spp.*, *Rhizoctonia spp.*)
- Підбір оптимальної норми препарату (технологія внесення)
- Надання рекомендацій згідно з результатами експертизи



Як відібрати зразки

ВІДБІР СЕРЕДНЬОЇ ПРОБИ НАСІННЕВОГО МАТЕРІАЛУ

У кожній означеній точці відбирають пробу з трьох шарів




Формують середню пробу

Маса середньої проби має становити $2,0 \pm 0,1$ кг



СХЕМА ВІДБОРУ СЕРЕДНЬОЇ ПРОБИ РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ



З одного поля в 10 різних місцях слід відібрати 3–5 рослин (залежно від фази розвитку культури) з видимими симптомами/відхиленнями



Кореневу систему бажано ізолювати в поліетиленовий пакет для кращого транспортування



Користуйтеся спеціальними пакетами для рослинного матеріалу від компанії «Сингента»

Спеціалізація діагностичних центрів і тривалість експертизи

№ сервісу	Сервіс	Тривалість експертизи	Діагностичні центри			
			БДЦ	ОДЦ	ХДЦ	ХмДЦ
1	Посівні якості насіння	7–14 днів (залежно від культури)	✓	✓	✓	✓
2	Фітоекспертиза насінневого матеріалу	10–14 днів (залежно від культури)	✓	✓	✓	✓
3	Фітоекспертиза рослинного матеріалу	8–10 днів (залежно від культури)	✓	✓	✓	✓
4	Встановлення рівня гібридності (типовості) гібридів соняшнику й кукурудзи	5–7 днів	✓			
5	ПЛР-діагностика насінневого і рослинного матеріалу	2–3 дні	✓			
6	Імуноферментний аналіз насінневого і рослинного матеріалу	2–3 дні	✓			
7	Фітопатогенне навантаження ґрунту	7–14 днів		✓		

Контактна інформація

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР (БДЦ)	ОДЕСЬКИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР (ОДЦ)	ХАРКІВСЬКИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР (ХДЦ)	ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР (ХмДЦ)
<p>Людмила Шостак <i>Менеджер лабораторії</i></p> <p>+380 67 555 28 64</p> <p>Ljudmyla.Shostak@syngenta.com</p>	<p>Марина Мироненко <i>Менеджер лабораторії</i></p> <p>+380 67 442 93 42</p> <p>Maryna.Myronenko@syngenta.com</p>	<p>Тетяна Малина <i>Менеджер лабораторії</i></p> <p>+380 67 555 26 89</p> <p>Tetyana.Malyna@syngenta.com</p>	<p>Щербина Наталя <i>Менеджер лабораторії</i></p> <p>+380 96 121 79 02</p> <p>Natalia.Shcherbyna@syngenta.com</p>
<p>Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Мала Вільшанка, відділок Селекційний, вул. Молодіжна, 22</p>	<p>Одеська обл., с. Чорноморка, вул. Стара Люстдорфська дорога, 7, 2-й пов., каб. 203–210</p>	<p>м. Харків, вул. Драгомирівська, 10, оф. 6</p>	<p>м. Хмельницький, вул. Свободи, 18/2 поверх 9</p>



Як замовити сервіс



Якщо у вас виникають питання, будь ласка, звертайтеся в консультаційний центр компанії «Сингента»

0 800 50 04 49



* Додаткову інформацію шукайте на офіційному сайті www.syngenta.ua в розділі «Сервіси».

Технічні сервіси як запорука максимальної віддачі при використанні продуктів компанії «Сингента»

Компанія «Сингента» пропонує великий перелік сервісів для своїх клієнтів. Зверніть увагу, що це пропозиція не продажу послуг. «Сингента» започаткувала сервісні програми, щоб покращити застосування продуктів, які ми продаємо на ринку України, — насіння і засобів захисту рослин

Продукти нашої компанії користуються високим попитом серед аграріїв, і ми зацікавлені в тому, щоб сподівання наших клієнтів справилися. А це залежить не тільки від якості самого продукту, а й від того, як і коли його застосували, проти яких об'єктів, які умови вирощування гібридів тощо. Вирішити ці питання і покликані сервіси, що їх пропонує компанія.

Подивімося на прикладах, як це працює. «Сингента» пропонує на вибір дев'ять різних протруйників для зернових культур. Постає питання, що ж вибрати. Ціна різна, діючі речовини різні, комбінації різні. На допомогу приходить сервіс фітоекспертизи насінневого матеріалу. У наших лабораторіях фахівці встановлять посівні якості насіння, видовий склад збудників та їх співвідношення. На підставі цієї інформації й умов майбутнього посіву (попередник, норма висіву, терміни висіву, погодні умови, обробіток ґрунту тощо) технічний експерт підбере найдоцільніший протруйник.

І це лише перший крок. Наступний крок — перевірка якості нанесення, адже можна дотриматися норми використання, але на одній насініні буде густо, а на іншій — пусто. І тоді люди питають, чому не всі рослини однаково розвиваються. Ми допоможемо перевірити якість нанесення і в разі потреби налагодимо машину для протруювання насіння.

Наступний крок — вибір фунгіцидного захисту. На ранніх етапах розвитку озимини в наших лабораторіях можна виявити латентні інфекції (форми мікроорганізмів, які існують приховано) за допомогою ПЛР-аналізу. Наші фахівці допоможуть сформувати систему фунгіцидного захисту, найефективнішу в певних умовах і проти саме цих збудників хвороб.

Відповісти на питання, коли ж застосовувати фунгіциди, допоможе сервіс прогнозу появи окремих захворювань і шкідників. Ми можемо спрогнозувати імовірність появи окремих найпоширеніших хвороб на основі метеорологічних предикторів і дати сигнал, коли склалися найсприятливіші умови для виникнення хвороби. Відтак ви можете перевірити інформацію в полі і вчасно застосувати потрібний фунгіцид.

ОЛЕКСАНДР ЗОЗУЛЯ

Керівник групи регіональних технічних експертів, компанія «Сингента»

Правильні обстеження і прогноз економлять вартість обробки, адже обробляються поля, де є загроза, і саме тоді, коли ефективність від обробки максимальна. Може виникнути парадоксальна ситуація: ви придбали дорогий фунгіцид, а в реальності захист від хвороб обходиться дешевше. Як це так? Дуже просто. По-перше, ви обробляєте не весь масив, а тільки там, де є хвороба. І на цих ділянках завдяки ефективнішому препарату ви одержуєте більшу прибавку врожаю і можете зменшити кількість обробок. Як результат — загальні затрати менші, а ефект більший.

На додаток при купівлі певної кількості фунгіцидів ви можете отримати спеціальні форсунки для внесення саме цієї групи препаратів. Ще наші фахівці можуть перевірити якість внесення і допомогти правильно налаштувати обприскувач. Це теж не менш як 25 % успішного захисту.

Отже, наші сервіси спрямовано передусім на допомогу у використанні препаратів компанії «Сингента».

А як же з насінням гібридів? Тут «Сингента» теж може запропонувати свою допомогу. Насіння має лише сильний генетичний потенціал, який можна розкрити в разі правильного догляду й умов вирощування. Наші експерти за допомогою дронів і спеціальних камер обстежать загальний стан посівів і виявлять проблемні ділянки. Потім на цих ділянках вони детально дослідять рослини, виявлять причину (елементи живлення, хвороби, шкідники, бур'яни, щільність ґрунту тощо) і розроблять рекомендації для усунення цих проблем.

Сподіваємося, тепер ясно, навіщо компанія «Сингента» започаткувала сервісні програми, як вони працюють для клієнтів, котрі придбали наші продукти, та які переваги їм це дає.

Більше інформації про сервісні програми дізнавайтеся у менеджерів, які безпосередньо працюють у ваших регіонах.





ЧОМУ СЕРВІС НАЛАШТУВАННЯ ОБПРИСКУВАЧІВ ТА ПЕРЕВІРКИ ЯКОСТІ ВНЕСЕННЯ КОРИСНИЙ ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ?


Сервіс налаштування обприскувачів і перевірки якості внесення — це унікальний комплекс послуг технічної підтримки клієнтів компанії «Сингента», який допоможе вам:



Підібрати оптимальні робочі параметри




Обрати оптимальну технологію внесення



Перевірити стан розпилювачів і тиск на секціях




Уникнути втрат робочого розчину



Встановити основні характеристики якості води для внесення ЗЗР



Забезпечити якісне покриття цільового об'єкта при внесенні



Досягти ідеально точної норми виливу

ВИ ОТРИМУЄТЕ:

Передові знання й досвід у сфері внесення ЗЗР

Діагностику техніки високоточним європейським обладнанням

Попередження ризиків неякісного внесення

Навчання персоналу

Відповідність заданої норми внесення фактичній

Максимальну реалізацію потенціалу обраних ЗЗР

ВИ УНИКАЄТЕ:

Пере/недовитрати ЗЗР


Виникнення резистентності

Додаткових фінансових витрат



Замовте сервіс у свого менеджера компанії «Сингента»





СЕРВІС «КАЛІБРУВАННЯ ПРОТРУЮВАЛЬНИХ МАШИН ТА ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ НАНЕСЕННЯ»

Сервіс калібрування протруювальних машин та перевірки якості нанесення — це послуга з професійного налаштування спеціалістами компанії «Сингента» вашої протруювальної техніки і миттєвий контроль якості обробки насіння.

Ми забезпечимо:



ПРАВИЛЬНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ
ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО
РОЗЧИНУ



ОПТИМАЛЬНУ ШВИДКІСТЬ
ПОДАЧІ НАСІННЕВОГО
МАТЕРІАЛУ



ТОЧНЕ ДОЗУВАННЯ НОРМИ
ВИЛИВУ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ



РІВНОМІРНЕ ТА ЯКІСНЕ
НАНЕСЕННЯ ПРОТРУЙНИКА
НА ЦІЛЬОВИЙ ОБ'ЄКТ



МИТТЄВИЙ КОНТРОЛЬ
ЯКОСТІ ПРОТРУЮВАННЯ ЗА
ДОПОМОГОЮ SLAK-ТЕСТУ



Сервіс «Перевірка якості води для внесення ЗЗР»




Визначення основних параметрів якості води дозволяє оцінити її придатність для внесення ЗЗР та в разі необхідності рекомендувати конкретні заходи для її покращення.


Скориставшись сервісом, ви отримаєте:

- Точні значення рН, жорсткості, каламутності тощо
- Рекомендації з покращення якості води
- Поради з ефективного обслуговування розпилювачів

Протруювальні машини, доступні для налаштування:



ПС-10



ПК-20



Stara Reboke

Замовте сервіс у свого менеджера компанії «Сингента»



* Додаткову інформацію шукайте на офіційному сайті www.syngenta.ua в розділі «Сервіси».

SEEDCARE™

Seedcare™: більше, ніж захист насіння	170
Продукти Syngenta Seedcare™	171
ФОРМУЛА М	173
Інститут захисту насіння	174
Сервіси Інституту захисту насіння в Україні.	175
Розробка й адаптація рецепта захисту насіння.	178
Лабораторні послуги.	179



НАНЕСЕННЯ

ПРОДУКТИ

СЕРВІСИ



Більше,
ніж захист насіння

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ З AR



Більше як 20 років Seedcare™ в Україні

Продукт


Інноваційна продукція Seedcare™ прикметна поєднаннями різноманітних діючих речовин та орієнтована на потреби і сільгоспвиробників, і насінневих компаній.

Нанесення

Високоякісне нанесення продукту на насіння забезпечує бажаний результат у полі. Ми допомагаємо клієнтам оцінювати якість нанесення продуктів та виконувати необхідні дії для забезпечення високої якості протруєння насіння.

Сервіси

Індивідуально розроблені послуги, що відповідають потребам клієнта. Ми також забезпечуємо найкращий агротехнічний супровід і навчання, розповідаємо про основи безпечного поводження з протруйниками і протруєним насінням.




Продукти Syngenta Seedcare™ дозволяють зберегти і збільшити потенціал урожаю рослин, забезпечуючи їх захист від різноманітних захворювань, шкідників і нематод на найраніших стадіях.

Сучасні технології і продукти, які використовуються в обробці насіння, розвиваються надзвичайно швидкими темпами. Вони пом'якшують вплив таких агресивних чинників навколишнього середовища, як засуха й заморозки, збільшують концентрацію поживних речовин, сприяють ефективному використанню води.


 **Вайбранс®**




 **Форс®**



 **Круїзер®**




 **Максим®**




 **Селест®**




 **Апрон® XL**





 **Кларіва™**



 **Енівіо®**



 **Атува®**



Вайбранс® Інтеграл
Формула М

Селест® Макс
Формула М

Попередники

Попередники

- + 15 % контролю шкідників
- + Тифульоз, ризоктоніоз
- + 20 % септоріоз
- + 25 % снігова пліснява
- + 15 % розвиток коріння
- + 15 % урожайність

Злакові мухи,
хлібний турун,
хлібні блішки,
попелиці, дротяники,
ковалики

Сажкові хвороби
Кореневі гнилі
Гельмінтоспори
Фузаріози
Септоріози
Снігова пліснява

- + Тифульоз, ризоктоніоз
- + 20 % септоріоз
- + 25 % снігова пліснява
- + 15 % розвиток коріння
- + 15 % урожайність

- + 20 % септоріоз
- + 20 % снігова пліснява
- + Офіобольоз
- + Гібеліноз



Кукурудза



Зернові



Ріпак озимий



Цукровий буряк



Горох



Соняшник



Соя



Горох



Кукурудза

(на Півдні і Сході)

Вайбранс® Тріо
Формула М

Максим® Форте
Формула М

ФОРМУЛА М

Формула М — інноваційна розробка компанії «Сингента» у формуляції протруйників насіння. Сучасні компоненти в складі препарату дозволяють забезпечити його незмінну стабільність на поверхні насіння



На 10–15 %

покращено текучість насіння

Збільшення виробничості при обробці та висіві

У 5–7 разів

зменшено кількість пилу в протруєному насінні

Мінімізація втрат д. р. і безпека використання продукту


Рівномірний

розподіл продукту на насінні і візуальний контроль якості

Інтенсивне забарвлення і рівномірне покриття кожної насінини

При вартості фунгіцидного протруйника 25 \$/т втрати становлять 4 \$/т

При вартості інсекто-фунгіцидного протруйника 60 \$/т втрати становлять 9 \$/т



Щоб максимально заощадити ваші витрати, технологія **Формула М** гарантує, що ваш препарат буде там, де й має бути, — на насінні

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО

Вайбранс® Інтеграл
Формула М

Запатентований фунгіцидний захист на основі нової молекули седаксан — першої молекули, розробленої компанією «Сингента» безпосередньо для захисту насіння

СКАНУЙТЕ ТУТ:



ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНСТИТУТІВ ЗАХИСТУ НАСІННЯ



Мета глобальної координованої мережі SCI — робота з продуктами для обробки насіння і розвиток належної технології їх застосування відповідно до найкращих глобальних практик надання сервісів.

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ З AR





У центрі розвитку технологій обробки насіння перебуває Інститут захисту насіння (Seedcare Institute™) — мережа експертів і дослідних центрів, які формують ту цінність, що її ми називаємо «більше, ніж захист насіння» (Beyond Seed Protection®).

Інститут захисту насіння в м. Дніпрі веде безперервну роботу з насінневими компаніями й сільгоспвиробниками, щоб забезпечувати найвищий рівень сервісу протягом усього року.

Наша місія — гарантувати найкращу якість застосування протруйників і, як результат, збільшення ваших урожаїв.

Саме тому висококваліфіковані експерти Інституту пропонують клієнтам відділу захисту насіння такі корисні сервіси.

РОЗРОБКА Й АДАПТАЦІЯ УНІКАЛЬНОЇ РЕЦЕПТУРИ




Інформація про насіння, яке ми обробляємо (культура, сорт, маса тисячі насінин, кількість в 1 посівній одиниці тощо).

Інформація про продукти, якими ми обробляємо насіння, їх дозування, склад робочого розчину.

Інформація про обладнання, на якому проводитиметься обробка, дані для його налаштування й калібрування, таймінг процесу обробки.

SLAK-ТЕСТ



SLAK-тест застосовується для визначення кількості діючої речовини на обробленому насінні. Це основний критерій в оцінці якості нанесення продукту: кількість діючої речовини на насінні сприяє збільшенню врожайності і рівномірності сходів.

Чим корисний:

- ✓ Відсутність витрат на контроль кількості діючої речовини на посівному матеріалі
- ✓ Мобільність (визначення якості протруєння)

HPLC-АНАЛІЗ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ



HPLC-тест застосовують для визначення кількості діючої речовини на обробленому насінні при використанні більше як двох препаратів для обробки насіння.

Чим корисний:

- ✓ Точність вимірювання, визначається кількість діючої речовини на кожній насініні
- ✓ На результат не впливає наявність інших компонентів, як-от мікродобрива

ВИЗНАЧЕННЯ ПИЛУ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ESA STAT WORKING GROUP



Тест на пильність застосовують для кількісного визначення стійкості формуляції після стабілізації протруєного насіння

Чим корисний:

- ✓ Відповідність міжнародним стандартам
- ✓ Кількісне визначення пилу
- ✓ Візуалізація якості обробки й очистки посівного матеріалу

СЕРВІС МОБІЛЬНОГО ПРОТРУЮВАННЯ



Протруєне на найкращому сучасному обладнанні преміум-класу насіння, відкаліброване і на 100 % очищене від пилу, сміття й битого зерна, допоможе вповні розкрити потенціал продуктів та рослини.

Сервіс мобільного протруювання відділу Seedcare Institute™ кожному клієнтові забезпечує переваги.

Преміальна очистка (калібрування зерна, видалення пилу, дробленого, щуплого зерна та ін.)

Висока якість протруєння посівного матеріалу. Точне і рівномірне нанесення протруйника, рівномірне розподілення діючої речовини по поверхні кожної насінини гарантує максимальний ефект від нанесених ЗЗР. Якість обробки підтверджують лабораторні аналізи.

Чим корисний:

- ✓ Мінімальні затрати при обробці насіння
- ✓ Досвідчена команда професійних операторів протруювальних комплексів
- ✓ Максимально безпечні умови для персоналу й навколишнього середовища при роботі з пестицидами
- ✓ Унікальні пропозиції й індивідуальний підхід до кожного клієнта
- ✓ Сервіс надається по всій території України, крім її окупованих територій

СУПРОВІД ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТІВ



Консультації технічних експертів. Польові візити під час важливих стадій розвитку культури. Дрон-моніторинг. Аналіз фітосанітарної експертизи посівного матеріалу, зони вирощування, ситуації поточного року, термінів посіву, попередника та надання рекомендацій з вибору протруйника.

НАВЧАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ТРЕНІНГИ



На наших тренінгах ми висвітлюємо всі аспекти якісного протруювання посівного матеріалу та відповідаємо на запитання:

- ✓ як досягти оптимального покриття насіння,
- ✓ як уникнути злипання насіння під час його обробки,
- ✓ чому можливий нерівномірний висів і як це пов'язано з процесом протруєння.

Так ми допомагаємо клієнтам розібратися, який тип протруювальної машини найкраще підходить для тієї чи тієї культури.

Розробка й адаптація рецепта захисту насіння

СТВОРЕННЯ ІДЕАЛЬНОГО РЕЦЕПТА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ



КЛІЄНТ ОТРИМУЄ:

- ✓ Краще рішення для наявного обладнання
- ✓ Підвищення продуктивності
- ✓ Розкриття повного потенціалу продукту
- ✓ Кращий зовнішній вигляд посівного матеріалу
- ✓ Краще тримання продукту на насінні
- ✓ Безпечне використання ЗЗР

КЛІЄНТ УНИКАЄ:

- ⊗ Додаткових затрат
- ⊗ Втрати часу
- ⊗ Проблем під час протруєння посівного матеріалу

КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ УСПІХУ


АгроГід

- Визначення фітопатологічного навантаження та підбір оптимального протруйника



- Розробка й адаптація рецепта
- Контроль якості на всіх етапах




- ✓ Визначення однорідності покриття



- ✓ Кількісне визначення діючої речовини



- ✓ Визначення фактичної норми продукту на посівному матеріалі



- ✓ Визначення гранично допустимої норми додаткових продуктів у робочому розчині
- ✓ Розрахунок втрат діючої речовини
- ✓ Визначення допустимого рівня пилоутворення



**ВИЗНАЧЕННЯ
ФІТОПАТОЛОГІЧНОГО
НАВАНТАЖЕННЯ ТА
ПІДБІР ОПТИМАЛЬНОГО
ПРОТРУЙНИКА**



**РОЗРОБКА Й АДАПТАЦІЯ
РЕЦЕПТА**



**ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ**

КЛІЄНТ ОТРИМУЄ:

- ✓ Обґрунтовану норму застосування ЗЗР
- ✓ Визначення фактичної норми ЗЗР
- ✓ Рівномірні сходи
- ✓ Підвищення урожайності
- ✓ Підвищення якості урожаю
- ✓ Безпеку для персоналу

КЛІЄНТ УНИКАЄ:

- ⊗ Резистентності хвороб
- ⊗ Додаткових затрат
- ⊗ Використання неякісних продуктів / підробок

НАША МЕТА:

- ⊕ Однорідне покриття
- ⊕ 100 % діючої речовини
- ⊕ Мінімальний рівень пилу й домішок

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Фінансові рішення.....	182
Вексельна програма.....	184
МетеоЗахист.....	186





Фінансові рішення

ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ — ПАРТНЕР, ЯКИЙ ЦІНУЄ ЗУСИЛЛЯ Й ІНВЕСТИЦІЇ КОЖНОГО АГРАРІЯ

ЩО ПРОПОНУЮТЬ «ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ»

«Фінансові рішення» покликані допомогти сільгоспвиробникам в управлінні торговими, цінними і курсовими ризиками. В основі більшості програм «Фінансових рішень» лежить механізм передоплати за насіння й засоби захисту рослин компанії «Сингента» через поставку сільгосппродукції.

Програма «**ЛегкоПосівна**» відкриває аграріям доступ до пільгового цільового кредитування на закупівлю насіння й засобів захисту рослин компанії «Сингента» з надійними банками-партнерами.














За програмою «**XXL**» аграрії мають нагоду отримати чималу додаткову премію до ринкової ціни на сільгосппродукцію в період збирання врожаю, коли на ціни тисне збиральна кампанія. Поставка сільгосппродукції здійснюється в рахунок передоплати за продукти компанії «Сингента».

Програма «**АгріФлекс**» дозволить сільгоспвиробникам продати сільгосппродукцію за ринковою ціною в рахунок передоплати за продукти компанії «Сингента» та отримати додатковий дохід у вигляді ваучера від майбутнього зростання котирувань відповідних ф'ючерсів. Це допоможе уникнути втрат і розчарувань від невчасного продажу сільгосппродукції.

За програмою «**ФорвардПлюс**» аграрії мають можливість продати свій майбутній урожай пшениці, ріпаку й кукурудзи навесні та отримати гарантовану ціну і в такий спосіб захиститися від падіння ціни, а якщо ціна на українському ринку на обрану культуру зросте до початку поставки, перефіксувати ціну на ринкову.

За програмою «**ФорвардФлекс**» аграрії мають змогу продати свій майбутній урожай пшениці, ріпаку й кукурудзи навесні за орієнтовною ціною, яку буде змінено на ринкову, що сформується на ринку напередодні періоду поставки, і додатково отримати захист від падіння котирувань відповідного ф'ючерса. Якщо котирування ф'ючерса впадуть, аграрій отримає право збільшити ринкову ціну на розмір падіння котирувань відповідних ф'ючерсів.

За програмою «**ФорвардPro**» аграрії мають можливість продати свій майбутній урожай пшениці, ріпаку й кукурудзи навесні та отримати гарантовану ціну і в такий спосіб захиститися від падіння ціни, а якщо котирування відповідного ф'ючерсного контракту будуть зростати, сільгоспвиробник може отримати додатковий дохід від зростання.

	 ЛегкоПосівна			 ЛегкоПосівна
 XXL 2022 33P	 АгріФлекс		 XXL 2022 33P	 АгріФлекс
	 Форвард Плюс	 Форвард Флекс	 Форвард Pro	
 ЗИМА	 ВЕСНА	 ЛІТО	 ОСІНЬ	



Нові можливості
для вашого розвитку



Вексельна програма

АВАЛЬОВАНІ ВЕКСЕЛІ І ГАРАНТІЇ ВІД ПРОВІДНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЛАТИ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «СИНГЕНТА»

Аграрний бізнес дуже ризикований. Цілковита залежність від зміни погодних умов, поширення шкідників і хвороб, нестабільні ціни на сільгосппродукцію — все це вельми ускладнює управління компанією та її обіговими коштами і для дистриб'ютора, і для сільгоспвиробника.

ТОВ «Сингента» пропонує спеціальну програму придбання продукції Syngenta з відтермінуванням платежу на вигідних умовах. У рамках цієї програми дистриб'ютор продукції Syngenta або сільськогосподарське підприємство має нагоду отримати продукцію з істотним відтермінуванням оплати та розрахуватися за поставлену продукцію авальованим векселем або забезпечивши платіж банківською гарантією.

ЧОМУ ВИГІДНО СКОРИСТАТИСЯ ЦЬЮ ПРОГРАМОЮ

- Можливість отримати відтермінування платежу за продукцію до 15 вересня, 15 листопада поточного року або до 31 березня наступного року за умови, що термін оплати векселя збігається з терміном оплати, вказаним у накладній, яка оплачується шляхом передачі цього авальованого векселя.
- Можливість зафіксувати ціну на дату поставки продукції SYNGENTA та убезпечити себе від негативного впливу знецінення національної валюти (ця перевага діє в разі розрахунку авальованим векселем).
- Можливість ефективніше використати ліміт кредиту завдяки розрахунку авальованими векселями (надання векселів, авальованих одним із банків першої групи, зменшує заборгованість покупця, при цьому ліміт кредиту від ТОВ «Сингента» не зменшується).
- Можливість збільшити ліміт товарного кредиту та обсяг закупівлі продукції SYNGENTA за умови надання банківської гарантії.
- Можливість отримати привабливішу ціну на продукцію SYNGENTA та компенсувати витрати, пов'язані з використанням банківських послуг, завдяки отриманню знижки за розрахунок векселем або надання банківської гарантії¹.
- Можливість використати знижку як оплату поточної заборгованості².
- Можливість отримати консультаційну підтримку від представників банку і ТОВ «Сингента» на будь-якому етапі програми.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ВЕКСЕЛІВ І ГАРАНТІЙ

- Вексель повинен бути авальований одним із банків, затверджених до співпраці по вексельній програмі з ТОВ «Сингента», та мати термін погашення, який визначається так: «за пред'явленням, але не раніше _____ (день, місяць) 20__ року» (дата оплати має збігатися з датою, вказаною у видатковій накладній, яка оплачується векселем).
- Термін дії банківської гарантії визначається згідно з умовами договору між вашою компанією і ТОВ «Сингента».
- Банківська гарантія надається з метою забезпечити товарний кредит, наданий покупцеві продукції ТОВ «Сингента» згідно з умовами договору поставки. Банківська гарантія, своєю чергою, — незалежне (від договору поставки) зобов'язання банку гарантувати оплату за товар. Оплату за договором поставки здійснює покупець згідно з умовами і термінами цього договору. Термін дії гарантії має бути щонайменше на 14 календарних днів довший, ніж остання дата платежу за договором.



¹ Розмір знижки залежить від банку-емітента (переглядається щороку і зазначається в договорі з дистриб'ютором ТОВ «Сингента»).

² Ця опція діє тільки для компаній, у яких прямий контракт із ТОВ «Сингента». Виплата знижки шляхом перерахування коштів на поточний рахунок покупця можлива тільки наприкінці сезону та за умови повної відсутності заборгованості дистриб'ютора перед ТОВ «Сингента».

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ ДЛЯ ДИСТРИБ'ЮТОРІВ, С.-Г. ПІДПРИЄМСТВ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ ПРОДУКЦІЇ SYNGENTA

(опція доступна для всіх компаній)



ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ ДЛЯ ДИСТРИБ'ЮТОРІВ ПРОДУКЦІЇ SYNGENTA

(опція доступна тільки для компаній,
які мають прямий контракт із ТОВ «Сингента»)



ВИ ВИЗНАЧАЄТЕСЬ З ОБСЯГОМ ЗАКУПІВЕЛЬ ПРОДУКЦІЇ SYNGENTA

Ви звертаєтесь до банку і надаєте пакет документів для відкриття кредитного ліміту на авальювання векселів

Ви звертаєтесь до банку і надаєте пакет документів для надання банківської гарантії (надається копія контракту з ТОВ «Сингента»)

БАНК ВІДКРИВАЄ КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ І УКЛАДАЄ З ВАМИ ГЕНЕРАЛЬНУ УГОДУ ПРО ВІДКРИТТЯ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ

Ви випикуєте векселі на суму придбання продукції SYNGENTA і передаєте в банк для авальювання

Банк оформлює гарантію на користь ТОВ «Сингента»

Ви розраховуєтесь із постачальником продукції SYNGENTA авальюваним векселем

Ви передаєте гарантію на ТОВ «Сингента»

Постачальник продукції SYNGENTA нараховує знижку. Розмір знижки за розрахунок векселем — предмет домовленості між вами і вашим постачальником продукції SYNGENTA

ТОВ «Сингента» нараховує знижку

Ви оплачуєте зобов'язання по векселю в термін, визначений у векселі

Ви виконуєте зобов'язання по сплаті боргу за договором у термін, визначений договором із ТОВ «Сингента» та в рамках терміну дії гарантії

«СИНГЕНТА» ПРИЙМАЄ ЯК ОПЛАТУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ АВАЛЬОВАНИ ВЕКСЕЛІ Й ГАРАНТІЇ 14 УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

ПЕРЕЛІК БАНКІВ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ ТОВ «СИНГЕНТА» ДЛЯ СПІВПРАЦІ ПО ВЕКСЕЛЬНІЙ ПРОГРАМІ, ПЕРЕГЛЯДАЄТЬСЯ ЩОРОКУ

Зверніться, будь ласка, до працівників департаменту кредитно-торгових операцій ТОВ «Сингента» по оновлений перелік банківських установ, погоджених для співпраці в напрямі вексельних розрахунків і банківських гарантії.

ЯК З НАМИ ЗВ'ЯЗАТИСЯ

Із питаннями звертайтеся до представників ТОВ «Сингента» в регіонах (контактні дані є на офіційному сайті ТОВ «Сингента») або до відділу кредитно-торгових операцій ТОВ «Сингента».

Світлана Максимова

Юлія Пілат

03022, м. Київ,

керівник відділу
кредитно-торгових операцій

менеджер
з кредитних операцій

вул. Козацька, 120/4,
3-й поверх

+380 67 555-26-40

+380 67 555-42-65

www.syngenta.ua

МетеоЗахист



ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ТЕХНОЛОГІЮ «СИНГЕНТА» В РАЗІ СПЕКИ, ПОСУХИ АБО ЗЛИВИ



СПЕКА

Велика кількість днів
з високими температурами




ПОСУХА

Якщо недостатня
кількість опадів



ЗЛИВА

Якщо сума
опадів надмірна



ДЕТАЛЬНІШЕ НА САЙТІ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

<https://www.syngenta.ua/meteezahist>

Впевнений,
бо ми разом



ДОДАТОК

Препарати і строки їх застосування на кукурудзі ...	190	Захист груші від медяниці	206
Препарати і строки їх застосування на соняшнику	191	Захист смородини	206
Препарати і строки їх застосування на ріпаку	192	Захист лохини	206
Препарати і строки їх застосування на ячмені	193	Захист фундука	207
Препарати і строки їх застосування на пшениці	194	Захист горіха	207
Препарати і строки їх застосування на сої	196	Захист винограду від хвороб та шкідників	208
Препарати і строки їх застосування на цукровому буряку	197	Захист черешні й вишні	208
Препарати і строки їх застосування на картоплі ...	198	Майстерня Аграрія	210
Препарати і строки їх застосування на помідорах	199	Офіційний додаток «Сингента Україна»	212
Препарати і строки їх застосування на цибулі	200	АгроПрогноз	214
Препарати і строки їх застосування на капусті	201	Корпоративна соціальна відповідальність	216
Препарати і строки їх застосування на виноградниках	202	Контактна інформація	222
Препарати і строки їх застосування у садах	203	Соціальні мережі	223
Захист яблуні від плодожерки	204	Алфавітний покажчик	224
Захист яблуні від хвороб	204		
Захист суниці	205		
Захист персика	205		



Препарати і строки їх застосування на кукурудзі

Проблеми при вирощуванні	Дозування	Строки застосування															
		00	11	12	13	15	17/32	18/33	35	53	63	89					
Ризоктоніоз, стимулювання розвитку кореневої системи	4 мл/1 пос. од.																
Ризоктоніоз, стимулювання розвитку кореневої системи, летюча сажка	24 мл/1 пос. од.																
Стеблові і кореневі гнілі, пліснявіння насіння та гелмінтоспоріоз	1,0 л/т																
Стеблові і кореневі гнілі, пліснявіння насіння	1,0 л/т																
Дротяники, несправжні дротяники, чорниші, шведські мухи, попелиці, блішки, західний кукурудзяний жук (діабротика)	6,0–9,0 л/т																
	5,0–6,0 л/т																
Однорічні злакові і дводольні бур'яни	2,5–3,5 л/га																
	4,0–4,5 л/га																
Однорічні злакові і дводольні бур'яни, деякі багаторічні дводольні бур'яни	3,5–4,0 л/га																
Однорічні й багаторічні дводольні бур'яни, в т. ч. осоти і падалиця соняшнику (IMI- та сульфостійка)	0,5; 0,7 л/га																
Однорічні дводольні та деякі багаторічні дводольні бур'яни (у т. ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА), а також падалиця соняшнику й ріпаку	0,015–0,02 кг/га																
Однорічні й багаторічні злакові (у т. ч. сорго і пирій) та деякі однорічні дводольні бур'яни	1,0–1,25 л/га + ПАР*																
Однорічні і багаторічні дводольні бур'яни	0,2–0,25 л/га + ПАР*																
Однорічні і багаторічні злакові і дводольні бур'яни (у т. ч. ваточник сирійський)	1,25–2,0 л/га																
Західний кукурудзяний жук, ґрунтові шкідники	12,0–15,0 кг/га																
Стебловий кукурудзяний метелик, західний кукурудзяний жук	0,2–0,3 л/га																
Стебловий кукурудзяний метелик, попелиці	1,2–2,0 л/га																
Бавовникова совка і стебловий кукурудзяний метелик	0,2–0,3 л/га																
Стебловий кукурудзяний метелик, лучний метелик, бавовникова совка	0,75–1,25 л/га																
Гельмінтоспориозна й інші плямистості листя, іржа, фузаріоз, пухирчаста сажка	0,5–0,75 л/га																
Підвищення стійкості рослин до несприятливих умов	1,0–2,0 л/га																

Препарати і строки їх застосування на соняшнику

	00	10	12	14	19	30	51	61	65	79	89	Дозування	Проблеми при вирощуванні	
АПРОН XL												3,0 л/т	Несправжня борошниста роса, вертицильоз, біла гниль	
МАКСИМ 025												5,0–6,0 л/т	Кореневі гнилі	
КРУІЗЕР 350												6,0–10,0 л/т	Дротяники, несправжні дротяники, сірий і південний бурякові довгоносики, мідляки, попелиці	
ФОРС												2,0 л/т	Комплекс ґрунтових шкідників	
УРАГАН ФОРТЕ												2,0–4,0 л/га	Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни	
ДУАЛ ГОЛД												1,6 л/га	Однорічні злакові й окремі дводольні бур'яни	
ГЕЗАГАРД												2,0–4,0 л/га	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	
ПРИМЕКСТРА TZ ГОЛД												4,5 л/га	Однорічні злакові і дводольні бур'яни	
				КАПТОРА*								1,0–1,2 л/га	Злакові і дводольні бур'яни	
			КАПТОРА ПЛЮС**									1,6–2,5 л/га	Злакові і дводольні бур'яни	
			ФЮЗІЛАД ФОРТЕ									0,5–2,0 л/га	Однорічні і багаторічні злакові бур'яни	
							ХОРУС					0,75 кг/га	Сіра гниль	
				АМІСТАР ЕКСТРА								0,75–1,0 л/га	Фомоз, альтернаріоз, септоріоз, фомопсис, іржа, несправжня борошниста роса	
				АМІСТАР ГОЛД								0,5–1,0 л/га	Альтернаріоз, фомоз, іржа, септоріоз, фомопсис, біла гниль	
				РІАС								0,5–0,8 л/га	Фомоз, альтернаріоз, сіра гниль, борошниста роса, септоріоз	
				СЕТАР								0,3–0,5 л/га	Фомоз, септоріоз, альтернаріоз, регуляція ростових процесів	
ФОРС 1,5 G												6,0–8,0 кг/га	Комплекс ґрунтових шкідників	
			ЕНЖІО									0,18 л/га	Геліхризова попелиця, соняшникова шипоноска	
			АМПЛІГО									0,2–0,3 л/га	Бавовникова совка, лучний метелик	
			НУРЕДІН СУПЕР									0,75–1,25 л/га	Стебловий кукурудз'яний метелик, лучний метелик, бавовникова совка, соняшникова вогнівка, соняшникова шипоноска, попелиці	
												РЕГЛОН ЕЙР	1,0–2,25 л/га	Десикація
												РЕГЛОН СУПЕР	2,0–3,0 л/га	
												РЕГЛОН ФОРТЕ	1,5–2,25 л/га	
												УРАГАН ФОРТЕ	2,0–4,0 л/га	
				КВАНТІС <small>НОВИЙ</small>								1,0–2,0 л/га	Підвищення стійкості рослин до несприятливих умов	


* На гібридах соняшнику, стійких до гербіциду Каптора®.

** На гібридах соняшнику, стійких до гербіциду Каптора® Плюс.

Препарати і строки їх застосування на ріпаку

Проблеми при вирощуванні	Дозування	Строки застосування (DD)								
		00	12	14	18	29	30-39	50-59	69	87
Дротяники, личинки хрущів, несправжні дротяники, хрестоцвіті блішки та ін. Фомоз, альтернаріоз, фузаріоз, ризоктоніоз, пероноспороз, пітіум	15,0 л/т	КРУЇЗЕР OSR								
Шкідники: хрестоцвіті блішки та комплекс ґрунтових шкідників	4,0 л/т	КРУЇЗЕР 350								
Пероноспороз, пліснявіння насіння, фузаріозна коренева гниль, альтернаріоз, пітіум	5,0 л/т	МАКСИМ XL								
Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,6 л/га	ДУАЛ ГОЛД								
Однорічні і багаторічні злакові бур'яни	1,5–2,0 л/га	ФЮЗІЛАД ФОРТЕ								
Однорічні і багаторічні дводольні бур'яни	0,12–0,2 кг/га	ЛОНТРЕЛ ГРАНД								
Інгібування росту рослини та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов, фомоз, борошниста роса	0,3–0,5 л/га	СЕТАР								
Краще галуження, одночасне цвітіння, альтернаріоз, фомоз	0,3–0,5 л/га	СЕТАР								
Борошниста роса, альтернаріоз	8,0 кг/га	ТІОВІТ ДЖЕТ								
Пероноспороз, альтернаріоз	2,5 кг/га	РИДОМІЛ ГОЛД								
Фомоз, альтернаріоз, біла і сіра гнилі, пероноспороз	0,75–1,0 л/га	АМІСТАР ЕКСТРА								
Фомоз, альтернаріоз, циліндроспоріоз, склеротиніоз, сіра гниль, борошниста роса	0,75–1,0 л/га	АМІСТАР ГОЛД								
Інгібування росту та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов	0,5 л/га	ТІЛТ								
Комплекс ґрунтових шкідників	5,0–8,0 кг/га	ФОРС 1,5 G								
Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, клопи, попелиці	0,15 л/га	КАРАТЕ ЗЕОН								
Хрестоцвіті блішки, ріпаковий пильщик, прихованохоботники, ріпаковий квіткоїд	0,4–0,75 л/га	НУРЕДІН СУПЕР								
Капустяна міль, листогризучі совки, озима совка, білани	0,2–0,3 л/га	АМПЛІГО								РОЗШИРЕННЯ РЕСТАРАЦІЇ
Ріпаковий квіткоїд	0,15–0,25 кг/га	ПЛЕНУМ								
Десикація	2,0–3,0 л/га	РЕГЛОН СУПЕР								
	1,0–2,25 л/га	РЕГЛОН ЕЙР								
	1,5–2,25 л/га	РЕГЛОН ФОРТЕ								
Підвищення стійкості рослин до несприятливих умов	1,0–2,0 л/га	КВАНТІС								НОВИЙ

Препарати і строки їх застосування на ячмені

						Дозування	Проблеми при вирощуванні	
00	13	21	30–32	37–39	59–65 (69)			71–99
МАКСИМ ФОРТЕ							1,5–2,0 л/т	Сажкові хвороби, фузаріозні й гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, темно-бура плямистість, ранні прояви листостеблових хвороб, пітім
СЕЛЕСТ МАКС							1,5–2,0 л/т	Сажкові хвороби, фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, септоріоз, фузаріоз. Шкідники: хлібна жужелиця і хлібні блішки, цикадки, попелиці, злакові мухи
ВАЙБРАНС ІНТЕГРАЛ							1,5–2,0 л/т	Сажкові хвороби, фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, ризоктоніозна прикоренева гниль, септоріоз, фузаріоз. Шкідники: хлібна жужелиця і хлібні блішки, цикадки, попелиці, злакові мухи
ВАЙБРАНС ТРІО							1,5–2,0 л/т	Сажкові хвороби, фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, ризоктоніозна коренева та прикоренева гнилі, тифульоз, снігова пліснява, септоріоз, фузаріоз
		ДЕРБІ					0,05–0,07 л/га	Однорічні й окремі багаторічні дводольні бур'яни, серед них підмаренник чіпкий на пізніх стадіях
			ТВІСТ				0,04–0,05 кг/га	Однорічні й окремі багаторічні стійкі до сульфосечовин, імідазолінонів, азолів дводольні бур'яни, в т. ч. зимуючі види — вероніка, кропива, герань та кукіль
			ПІК				0,015–0,02 кг/га	Однорічні і багаторічні дводольні бур'яни, падалиця соняшнику й ріпаку
			ЛОГРАН				6,5–10 г/га	Однорічні й окремі багаторічні дводольні бур'яни, в т. ч. стійкі до 2,4-Д, МЦПА
			АКСІАЛ				0,9 л/га	Однорічні злакові бур'яни
			АКСІАЛ КРОС				0,7–0,9 л/га	Однорічні злакові та дводольні бур'яни
		ПРИМА ФОРТЕ					0,5 л/га; 0,7 л/га	Однорічні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д, МЦПА, та деякі багаторічні дводольні бур'яни
		МОДДУС					0,4–0,8 л/га	Підвищення урожайності, покращення зимівлі, протидія виляганню
		ТІЛТ ТУРБО					0,8–1,0 л/га	Борошниста роса, іржа, гельмінтоспоріозні плямистості (сітчаста, темно-бура, лінійна), рамуляріоз, ринхоспоріоз, фузаріоз
			МІРАВІС НЕО				0,5–1,0 л/га	Плямистості (темно-бура, сітчаста, смугаста), ринхоспоріоз, рамуляріоз, іржа, борошниста роса, септоріоз
		АЛЬТО СУПЕР					0,4–0,5 л/га	Борошниста роса, плямистості листя, іржа
		АМІСТАР ЕКСТРА					0,5–0,75 л/га	Борошниста роса, сітчаста, темно-бура, смугаста, облямівкова плямистості, септоріоз
		АМІСТАР ТРІО					1,0–1,2 л/га	Борошниста роса, сітчаста, темно-бура, смугаста плямистості, ринхоспоріоз, рамуляріоз, іржа, гельмінтоспоріози
				МАГНЕЛЛО			1,0 л/га	Фузаріоз, альтернаріоз колосу, сітчаста плямистість, іржа карликова
		ЕНЖІО					0,18–0,22 л/га	Попелиці, хлібні клопи, п'явиці, блішки, трипси, цикадки, ячмінний мінер, хлібні жуки, злакові мухи
		КАРАТЕ ЗЕОН					0,15–0,3 л/га	Блішки, п'явиці, пшеничний трипс, хлібні клопи, злакові попелиці
		НУРЕДІН СУПЕР					0,4–1,0 л/га	П'явиці, попелиці, хлібні клопи
						АКТЕЛЛІК	16 мл/т	Зерно продовольче, насіннєве, фуражне (обробка вологим способом)
						АКТЕЛЛІК	0,5 мл/м ²	Незавантажені складські приміщення

ПРОТРУЙНИК

ГЕРБИЦІД

ІНСЕКТИЦИД

ФУНГЦИД


РЕТАРДАНТ

БІОСТИМУЛЯТОР


Препарати і строки їх застосування на пшениці

Проблеми при вирощуванні	Дозування	Строки застосування						
		00	13	21	30–32	37–39	59–65 (69)	71–99
Сажкові хвороби, фузаріозні й гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, ранні прояви листостеблових хвороб, пітіум	1,5–2,0 л/т	МАКСИМ ФОРТЕ						
Сажкові хвороби, фузаріозні й гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, септоріоз, фузаріоз. Шкідники: хлібна жужелиця та хлібні блішки, цикадки, попелиці, злакові мухи	1,5–2,0 л/т	СЕЛЕСТ МАКС						
Сажкові хвороби, фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, ризоктоніозна прикоренева гниль, тифульоз, снігова пліснява, септоріоз, фузаріоз. Шкідники: хлібна жужелиця та хлібні блішки, цикадки, попелиці, злакові мухи	1,5–2,0 л/т	ВАЙБРАНС ІНТЕГРАЛ						
Сажкові хвороби (тверда, летюча, кам'яна), гельмінтоспоріози, септоріоз, кореневі гнилі, снігова пліснява, ризоктоніоз, тифульоз	1,5–2,0 л/т	ВАЙБРАНС ТРІО						
Однорічні злакові бур'яни	0,9 л/га		АКСІАЛ					
Однорічні злакові та дводольні бур'яни	0,7–0,9 л/га		АКСІАЛ КРОС			НОВИЙ		
Однорічні і багаторічні дводольні бур'яни, падалиця соняшнику й ріпаку	0,015–0,02 кг/га		ПІК					
Однорічні й окремі багаторічні дводольні бур'яни, у т. ч. стійкі до 2,4-Д, МЦПА	6,5–10 г/га		ЛОГРАН					
Однорічні й окремі багаторічні дводольні бур'яни, серед них підмаренник чіпкий на пізніх стадіях	0,05–0,07 л/га		ДЕРБІ					
Однорічні й окремі багаторічні стійкі до сульфосечовин, імідазоліонів, азолів дводольні бур'яни, в т. ч. зимуючі види – вероніка, кропива, герань та кукіль	0,04–0,05 кг/га		ТВІСТ			НОВИЙ		
Однорічні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д, МЦПА, та деякі багаторічні дводольні бур'яни	0,5 л/га		ПРИМА ФОРТЕ					
Однорічні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д, МЦПА, та багаторічні дводольні бур'яни	0,7 л/га		ПРИМА ФОРТЕ					
Підвищення урожайності, покращення зимівлі, протидія виляганню	0,4–0,6 л/га		МОДДУС					
Підвищення стійкості рослин до несприятливих умов	1,0–2,0 л/га		КВАНТИС				НОВИЙ	


Препарати і строки їх застосування на пшениці

								Дозування	Проблеми при вирощуванні
00	13	21	30-32	37-39	59-65 (69)	71-99			
				МІРАВІС НЕО <small>НОВИЙ</small>				0,5-1,0 л/га	Борошниста роса, піренофороз, септоріоз листя та колосу, іржа, ринхоспоріоз, фузаріоз
		ТІЛТ						0,5 л/га	Борошниста роса, бура листкова, стеблова і жовта іржа, гельмінтоспоріозна плямистість, септоріоз
	ТІЛТ ТУРБО							0,8-1,0 л/га	Борошниста роса, септоріоз, піренофороз, іржасті хвороби, фузаріоз
	АЛЬТО СУПЕР							0,4-0,5 л/га	Бура іржа, борошниста роса, гельмінтоспоріози, септоріоз, піренофороз і фузаріоз
	АМІСТАР ЕКСТРА							0,5-0,75 л/га	Септоріоз, борошниста роса, бура листкова іржа, фузаріоз колосу, септоріоз колосу, альтернаріоз
	АМІСТАР ТРІО							1,0-1,2 л/га	Борошниста роса, іржа (види), септоріоз листя і колосу, альтернаріоз, фузаріоз колосу
	ЕЛАТУС РІА							0,4-0,6 л/га	Септоріоз, іржа, піренофороз, борошниста роса
					МАГНЕЛЛО			1,0 л/га	Фузаріоз листя і колосу, альтернаріоз, септоріоз, піренофороз, іржа бура, жовта і стеблова
КАРАТЕ ЗЕОН								0,15-0,30 л/га	Хлібні жуки, блішки, трипси, п'явиці, клоп шкідлива черепашка, попелиці, озима совка
ЕНЖІО								0,18 л/га	Клоп шкідлива черепашка, трипси, попелиці, цикадки
АКТАРА								0,10-0,14 кг/га	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, трипси
НУРЕДІН СУПЕР								0,4-1,0 л/га	П'явиці, попелиці, клоп шкідлива черепашка
							АКТЕЛЛІК	16 мл/т	Зерно продовольче, насіннєве, фуражне (обробка вологим способом)
							АКТЕЛЛІК	0,5 мл/м²	Незавантажені складські приміщення

Препарати і строки їх застосування на сої

Проблеми при вирощуванні	Дозування						
		00	08	11	14–20	49–69	71–99
Фузаріоз, аскохітоз, пліснявіння насіння, шкідники сходів	1 л/т	СЕЛЕСТ ТОП					
Фузаріоз, кореневі та прикореневі гнилі, в тому числі і ризоктоніоз, пероноспороз, біла гниль, аскохітоз, септоріоз	1 л/т	ВАЙБРАНС RFC					
Стимуляція розвитку азотфіксуючих бактерій	2,0 л/т	АТУВА + ПРЕМАКС <small>НОВИЙ</small>					
Пліснявіння насіння, фузаріоз, кореневі гнилі, аскохітоз	1,0 л/т	МАКСИМ XL					
Однорічні і багаторічні бур'яни	2,0–4,0 л/га	УРАГАН ФОРТЕ					УРАГАН ФОРТЕ
Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	1,3–1,6 л/га	ДУАЛ ГОЛД					
Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	3,0–5,0 л/га	ГЕЗАГАРД					
Однорічні злакові та дводольні бур'яни	3,0–4,5 л/га	ПРИМЕКСТРА TZ ГОЛД					
Однорічні і багаторічні злакові бур'яни	1,0–2,0 л/га				ФЮЗИЛАД ФОРТЕ		
Борошниста роса, фузаріоз, іржа, пероноспороз	0,5–0,75 л/га				АМІСТАР ЕКСТРА		
Борошниста роса, септоріоз, антракноз, аскохітоз, альтер-наріоз, церкоспороз	0,5–1,0 л/га				АМІСТАР ГОЛД		
Дротяники	6,0–8,0 кг/га	ФОРС 1,5 G					
Павутинні кліщі, трипси	0,6–1,0 л/га				ВЕРТИМЕК		
Кліщі, попелиці, трипси	1,2–2,0 л/га				АКТЕЛЛІК		
Бавовникова совка, люцернова совка, акацієва вогнівка, чортополохівка, попелиці	0,2–0,4 л/га				АМПЛІГО		
Акацієва вогнівка, совки, клопи, п'ядуни, трипси, соєва плодоярка, кліщі	0,75–1,25 л/га				НУРЕДІН СУПЕР		
Десикація	2,0–3,0 л/га						РЕГЛОН СУПЕР
	1,5–2,0 л/га						РЕГЛОН ЕІР
	1,5–2,25 л/га						РЕГЛОН ФОРТЕ


Препарати і строки їх застосування на цукровому буряку

						Дозування	Проблеми при вирощуванні
00	10	14	32	39	49		
АПРОН XL						2,0 л/т	Пероноспороз, коренеїд
МАКСИМ XL						9 мл/пос. од.	Коренеїд
КРУЇЗЕР 600						35,0 л/т	Комплекс ґрунтових і наземних шкідників
ФОРС						14,0 л/т	Дротяники, личинки коваликів, бурякова крихітка, бурякова коренева попелиця, личинки совок
ФОРС МАГНА						Тіаметоксам (15 г д. р. на п. о.) + тефлутрин (6 г д. р. на п. о.)	Комплекс шкідників
ДУАЛ ГОЛД						1,2–1,6 л/га	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни
	ФЮЗИЛАД ФОРТЕ					1,0–2,0 л/га	Однорічні і багаторічні злакові бур'яни
		ЛОНТРЕЛ ГРАНД				0,2 кг/га	Однорічні і багаторічні дводольні бур'яни, падалиця соняшнику
				АЛЬТО СУПЕР		0,5 л/га	Церкоспороз, борошниста роса
				АМІСТАР ЕКСТРА		0,5–0,75 л/га	Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз
				АМІСТАР ГОЛД		0,5–1,0 л/га	Борошниста роса, церкоспороз, рамуляріоз, фомоз
ФОРС 1,5 G						4,5–6,0 кг/га	Комплекс ґрунтових шкідників, бурякова крихітка
	ЕНЖІО					0,18 л/га	Довгоносики, щитоноски, блішки, листкова бурякова попелиця
	АКТАРА					0,08 кг/га	Довгоносики, щитоноски, блішки, піщаний мідляк, листкова бурякова попелиця
	КАРАТЕ ЗЕОН					0,125–0,15 л/га	Щитоноски, блішки, попелиці
	АКТЕЛЛІК					1,0–2,0 л/га	Довгоносики, мертвоїди, блішки, листкова бурякова попелиця
	НУРЕДІН СУПЕР					0,8 л/га	Довгоносики, щитоноски
					РЕГЛОН СУПЕР	4,0 - 6,0 л/га	Десикація та знищення бур'янів

Препарати і строки їх застосування на картоплі

Проблеми при вирощуванні	Дозування										
Однорічні та багаторічні бур'яни	3,0–4,0 л/га	УРАГАН ФОРТЕ									
Комплекс хвороб (фузаріоз, гельмінтоспоріоз, ризоктоніоз, альтернаріоз). Комплекс ґрунтових шкідників та шкідників сходів (дротяники, несправжньодротяники, личинки хрущів, попелиці та колорадський жук)	0,5–0,7 л/т	СЕЛЕСТ ТОП									
Ризоктоніоз, срібляста парша, антракноз, фітофтороз, фузаріоз	1,5 л/га	ЮНІФОРМ									
Фузаріоз, ризоктоніоз, гельмінтоспоріоз, суха гниль	0,75 л/т	МАКСИМ									
Колорадський жук, дротяники, комплекс ґрунтових та поверхневих шкідників сходів	0,3 л/т	КРУІЗЕР 350									
Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,6 л/га	ДУАЛ ГОЛД									
	3,0–4,0 л/га	ГЕЗАГАРД									
	4,5 л/га	ПРИМЕКСТРА TZ ГОЛД									
Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	1,5–2,0 л/га	ФЮЗІЛАД ФОРТЕ									
Фітофтороз та альтернаріоз	0,6 л/га					КВАДРІС					
Альтернаріоз	0,15–0,25 л/га					МІРАВІС	НОВИЙ				
Десикація	2,0 л/га									РЕГЛОН СУПЕР	
Фітофтороз, альтернаріоз	0,3–0,4 л/га		ШИРЛАН							ШИРЛАН	
Альтернаріоз, фітофтороз	2,5 кг/га		РИДОМІЛ ГОЛД МЦ								
Позакореневе підживлення: I — висота рослини 10–15 см II — через 15 діб після першого III — на початку інтенсивного росту бульб	1–5 л/га		ІЗАБІОН								
								ІЗАБІОН			
									РЕВУС ТОП		
Альтернаріоз, фітофтороз	0,5–0,6 л/га							КВАДРІС ТОП			
Альтернаріоз, фітофтороз	0,75–1,0 л/га							КВАДРІС ТОП			
Комплекс ґрунтових шкідників	5,0–15,0 кг/га	ФОРС									
Колорадський жук, попелиці й цикадки	0,06–0,08 кг/га	АКТАРА*		АКТАРА							
Колорадський жук, попелиці й цикадки	0,1 л/га			КАРАТЕ ЗЕОН							
Колорадський жук, попелиці й цикадки	0,18 л/га		ЕНЖІО								
Колорадський жук, цикадки, попелиці	0,15–0,2 л/га			АМПЛІГО							

Препарати і строки їх застосування на томатах

										Дозування	Проблеми при вирощуванні	
УРАГАН ФОРТЕ										2,0–4,0 л/га	Однорічні та багаторічні злакові й дводольні бур'яни	
ДУАЛ ГОЛД										1,6 л/га	Однорічні та багаторічні злакові, польові та амброзія	
ПРИМЕКСТРА TZ ГОЛД										4,0–4,5 л/га	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	
			ФЮЗИЛАД ФОРТЕ								0,5–2,0 л/га	Однорічні злакові та дводольні бур'яни
	ПЕРГАДО R						ПЕРГАДО R			4–5 кг/га	Фітофтороз, профілактика бактеріальних інфекцій	
			ЮНІФОРМ							0,4–0,9 л/га	Комплекс кореневих захворювань (фузаріоз, пітім, ризоктоніоз)	
		КВАДРІС								0,6 л/га	Фітофтороз, альтернаріоз, бура плямистість, септоріоз	
			МІРАВІС <small>НОВИЙ</small>							0,25–0,35 л/га	Альтернаріоз	
			КВАДРІС ТОП								0,75–1,0 л/га	Фітофтороз, альтернаріоз, бура плямистість, септоріоз
			РЕВУС ТОП								0,6 л/га	Фітофтороз, альтернаріоз
			ОРОНДІС УЛЬТРА <small>НОВИЙ</small>							0,4 л/га	Фітофтороз	
			РИДОМІЛ ГОЛД							2,5 кг/га	Фітофтороз, альтернаріоз	
			СКОР								0,5 л/га	Фітофтороз, альтернаріоз
	ШИРЛАН							ШИРЛАН		0,3–0,4 л/га	Фітофтороз	
								СВІТЧ		0,75–1,0 кг/га	Хвороби при зберіганні, альтернаріоз, фузаріоз, мокра та сіра гнилі	
			ІЗАБІОН **								2–5 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації: I – висота рослини 10–15 см II – формування плодів
ФОРС 1,5 G										5–15 кг/га	Комплекс ґрунтових шкідників	
	АКТАРА*									0,06 кг/га	Колорадський жук	
			ЕНЖІО							0,18 л/га	Колорадський жук, попелиці	
			КАРАТЕ ЗЕОН							0,15 л/га		
						АМПЛІГО				0,3–0,4 л/га	Бавовникова совка, карадріна (мала помідорна совка), колорадський жук	
						ПРОКЛЕЙМ				0,3–0,4 л/га	Бавовникова совка, карадріна (мала помідорна совка)	
						ВОЛІАМ ФЛЕКСІ				0,3–0,4 л/га	Листогризучі совки, колорадський жук, тютюновий трипс, картопляна міль, картопляна совка	
						МАТЧ				0,4 л/га	Совки	


* Замочування розсади перед висадкою 1,5–2 г/л на 250 рослин.

** Заборонено для використання в суміші з Пергадо® R.

Препарати і строки їх застосування на цибулі

Проблеми при вирощуванні	Дозування						
Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни	2,0–4,0 л/га	РЕГЛОН СУПЕР					РЕГЛОН СУПЕР
Однорічні і багаторічні злакові бур'яни	0,5–2 л/га				ФЮЗИЛАД ФОРТЕ		
Однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д, та багаторічні коренепаросткові бур'яни	0,1–0,16 кг/га				ЛОНТРЕЛ ГРАНД		
Пероноспороз, профілактика бактеріальних інфекцій	4–5 л/га			ПЕРГАДО			
Комплекс корневих захворювань (фузаріоз, пітім, ризоктоніоз)	0,5–0,9 кг/га			ЮНІФОРМ			
Стемфіліоз, альтернаріоз, борошниста роса	0,4–0,5 л/га			МІРАВІС <small>НОВИЙ</small>			
Фітофтороз, альтернаріоз, бура плямистість	0,6 л/га			КВАДРІС			
Несправжня борошниста роса	2,5 кг/га			РИДОМІЛ ГОЛД			
Пероноспороз, альтернаріоз, стемфіліоз	0,75–1,0 л/га			КВАДРІС ТОП			
Пероноспороз	0,4 л/га			ШИРЛАН			
Цибулева муха, трипси	0,18 л/га			ЕНЖІО			
Цибулева муха	0,2 л/га			КАРАТЕ ЗЕОН			

Препарати і строки їх застосування на капусті

							Дозування	Проблеми при вирощуванні
ДУАЛ ГОЛД							1,6 л/га	Однорічні злакові та дводольні бур'яни
УРАГАН ФОРТЕ							2,0–4,0 л/га	Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни
		ЛОНТРЕЛ ГРАНД					0,2 кг/га	Однорічні і багаторічні дводольні бур'яни, падалиця соняшнику
		ФЮЗИЛАД ФОРТЕ					0,5–2,0 л/га	Однорічні і багаторічні злакові бур'яни
				МІРАВІС <small>НОВИЙ</small>			0,25–0,35 л/га	Альтернатив
				КВАДРІС			0,6 л/га	Збудники хвороб
ТІОВІТ ДЖЕТ							100 кг/га	Кила капусти
	ФОРС 1,5 G						5–15 кг/га	Комплекс ґрунтових шкідників
		АКТАРА*					Розчин 0,25 %	Капустянки, личинки хрущів, дротяники, несправжні дротяники, кравчик-головач, попелиці
		ЕНЖІО					0,18 л/га	Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця
			ВОЛІАМ ФЛЕКСІ				0,3–0,4 л/га	Усі види лускокрилих і сисних шкідників, довгоносики, листоїди, мінери
			АМПЛІГО				0,3–0,4 л/га	Капустяна міль, капустяна совка, капустяний і ріпаковий білани
			ПРОКЛЕЙМ				0,2–0,3 кг/га	Капустяна міль, капустяна совка, капустяний і ріпаковий білани
			МАТЧ				0,4 л/га	Капустяна міль, капустяна совка, білани










ГЕРБИЦІД

ІНСЕКТИЦИД

ФУНГЦИД

* Для замочування розсади перед висадкою.


Препарати і строки їх застосування на виноградниках

Проблеми при вирощуванні	Дозування										
Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,3–1,7 л/га	РЕГЛОН ФОРТЕ									
Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни	2,0–4,0 л/га	УРАГАН ФОРТЕ									
Багаторічні злакові бур'яни	2,0 л/га	ФЮЗІЛАД ФОРТЕ									
Однорічні злакові та дводольні бур'яни	3,5–4,0 л/га	ЛЮМАКС									
Оїдіум	0,2–0,25 л/га	ТОПАЗ									
Оїдіум, чорна гниль, краснуха	0,6–0,7 л/га	ДІНАЛІ									
Мільдю	2,5 кг/га	РИДОМІЛ ГОЛД									
Мільдю	0,67 л/га	ОРОНДІС УЛЬТРА <small>новий</small>									
Мільдю, антракноз	4,0–5,0 кг/га	ПЕРГАДО R									
Оїдіум, павутинні кліщі	5,0–8,0 кг/га	ТІОВІТ ДЖЕТ									
Мільдю, оїдіум, сіра гниль, чорна плямистість, інфекційне засихання	0,8 л/га	КВАДРІС									
Сіра гниль, оїдіум, антракноз, альтернаріоз	0,8–1,2 л/га	МІРАВІС ПРАЙМ <small>новий</small>									
Сіра та інші види гнилі, мільдю. Хвороби після пошкодження градом	0,75–1,0 кг/га	СВІТЧ									
Мільдю, оїдіум, сіра гниль	0,5–0,7 кг/га	ХОРУС					ХОРУС				
Комплекс шкідників	0,3–0,5 л/га	ВОЛІАМ ФЛЕКСІ									
Гронова листовійка	1,0 л/га	МАТЧ									
	1,0 л/га	ЛЮФОКС									
Листовійки, ріпаківий квіткоїд	0,15–0,2 л/га	КАРАТЕ ЗЕОН									
Кліщі, зудень, трипси, листова філоксера	1,0 л/га	ВЕРТИМЕК									
Гронова листовійка	0,3–0,4 л/га	ПРОКЛЕЙМ									
Листкова філоксера, багатодіний трубокрут, скосар кримський	0,18 л/га	ЕНЖІО									
Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням)	2,0–3,0 л/га	ІЗАБІОН									


Препарати і строки їх застосування в садах

										Дозування	Проблеми при вирощуванні
УРАГАН ФОРТЕ										2,0–4,0 л/га	Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни
	РЕГЛОН ФОРТЕ									1,3–1,7 л/га	Однорічні злакові та дводольні бур'яни
	ЛЮМАКС									3,5–4,0 л/га	Однорічні злакові та дводольні бур'яни
ХОРУС					ХОРУС					0,2–0,3 кг/га	Парша, борошниста роса, моніліоз
ТІОВІТ ДЖЕТ				ТІОВІТ ДЖЕТ						8,0 кг/га	Борошниста роса, плодові кліщі
		СКОР								0,2–0,3 л/га	Парша, борошниста роса, альтернаріоз
		МІРАВІС <small>новий</small>								0,2–0,25 л/га	Парша, борошниста роса, моніліоз, альтернаріоз
			ТОПАЗ							0,3–0,4 л/га	Борошниста роса
		ЦИДЕЛІ ТОП								0,5–0,7 л/га	Борошниста роса, парша, альтернаріоз, моніліоз
		СВІТЧ								0,75–1,0 кг/га	Хвороби плодів під час зберігання їх у сховищах, моніліоз, сиза пліснява, фузаріозна гниль, сіра гниль, парша, альтернаріоз. Сіра та інші види гнилі після пошкодження градом
	КАРАТЕ ЗЕОН			КАРАТЕ ЗЕОН						0,4 л/га	Плодожерка, листовійки
АКТАРА			АКТАРА							0,14–0,15 л/га	Бруньковий довгоносик, букарки, казарки, яблуневий квіткоїд, грушевий квіткоїд, яблуневий трач, попелиці, медяниці, плодовий пильщик, сірий брунькоїд
ЕНЖІО			ЕНЖІО							0,18 л/га	
		ПРОКЛЕЙМ								0,4–0,5 кг/га	Яблунева плодожерка, листовійки, мінуючі молі
		ЛЮФОКС								1,0 л/га	Яблунева і грушева плодожерки, щитівки, кліщі
		МАТЧ								1,0 л/га	Яблунева плодожерка, листовійки, молі
ВЕРТИМЕК			ВЕРТИМЕК							1,0–1,5 л/га	Кліщі, мінери, трипси, медяниці
ВОЛІАМ ФЛЕКСІ			ВОЛІАМ ФЛЕКСІ							0,3–0,5 л/га	Букарки, казарки, попелиці, яблуневий квіткоїд, плодожерки, листовійки, довгоносик сірий бруньковий, плодовий пильщик
АМПЛІГО			АМПЛІГО							0,3–0,4 л/га	Плодожерки, листовійки, квіткоїди, букарки, казарки, попелиці, пильщик
		ЛІРУМ								1,2–1,5 л/га	Кліщі, яблунева плодожерка, листовійки, мінуючі молі, попелиці
	ІЗАБІОН									2,0–3,0 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням)


Захист яблуні від плодожерки




Захист яблуні від хвороб




Захист суниці




Захист персика




Захист груші від медяниці




Захист смородини




Захист лохини




Захист фундука




Захист горіха



Захист винограду від хвороб та шкідників



Захист черешні й вишні





Майстерня Аграрія

Навчальна платформа для аграрної спільноти України, яка допомагає ділитися досвідом та отримувати практичні знання протягом усього року



КОНФЕРЕНЦІЇ

Проходять перед початком посівної кампанії — наприкінці січня і на початку лютого. Тематика зосереджується на викликах сезону, які чекатимуть аграріїв поточного року. Конференції присвячено основним культурам і специфіці регіонів, у яких вони відбуваються, та висвітлюють важливі технічні питання в комплексі з економічними аспектами вирощування сільгоспкультур.



ФІЛДТУРИ «ЇДЕМО В ПОЛЯ» ТА ПОЛЬОВІ ЗАХОДИ

Влітку й восени ми подорожуємо до виробничих посівів господарств та демоділянок у різних куточках України. У виробничих масштабах обрати доцільну систему захисту й гібриди насіння набагато легше. Мандруючи від поля до поля, господарства-господарі та експерти компанії «Сингента» діляться досвідом у вирощуванні та захисті польових культур.



ЖУРНАЛ

Актуальні новинки аграрного бізнесу, корисні статті від кращих спеціалістів і експертів, нові ідеї — усе це ви знайдете в кожному номері нашого журналу.

Журнал виходить тричі на рік, у паперовому вигляді розсилається адресно, в електронному вигляді доступний на сайті «Сингента».



РОЗДІЛ НА САЙТІ

Розділ «Майстерня Аграрія» містить повне зібрання інформації, презентованої на конференціях та польових заходах, а також фото і відеоматеріали.



Бути поряд з клієнтами попри все! Коли постають нові виклики — знаходяться й рішення!

ПРОЄКТ «АГРО БЕЗ МЕЖ»

Щороку, не зважаючи на зовнішні чинники, ми знаходимо спосіб бути поряд із нашими клієнтами в найпотрібніші миті.

«Сингента Україна» створила онлайн-платформу та винайшла новий гібридний формат, який дозволив зустрітися з клієнтами і онлайн, і наживо.

Проект «Агро без меж», попри відстань і нові виклики, дозволяє тисячам наших клієнтів бути присутніми онлайн та першими дізнаватися про новинки й сучасні технології.



«РЕГІОНАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ АГРАРІЯ» — УСІ ОСОБЛИВОСТІ ВАШОГО РЕГІОНУ

Компанія «Сингента» пропонує кожному клієнтові унікальний сервіс — інформативний розділ «МАЙСТЕРНЯ АГРАРІЯ ПОРУЧ» у додатку для смартфонів «Сингента Україна», який стане вашим віртуальним гідом. Можливість самостійно відвідати понад 50 демонстраційних полів «Сингента» в усіх областях України.





Оновлений додаток «Сингента Україна»

- КАТАЛОГИ НАСІННЯ ТА ЗЗР —
ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

Незамінний помічник агронома



- КОНТАКТИ ОФІЦІЙНИХ ДИСТРИБ'ЮТОРІВ ТА МЕНЕДЖЕРІВ «СИНГЕНТА»
- ПРАЦЮЄ БЕЗ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
- АКЦІЇ ВІД «СИНГЕНТА»
- БАГАТО ІНШОЇ КОРИСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ




РЕКОМЕНДАЦІЯ



ВИЯВЛЕНА ЗАГРОЗА



Агропрогноз «Сингента» Україна —
на варті вашого поля!



Корпоративна соціальна відповідальність

Соціальна відповідальність — невилучна частина діяльності нашої компанії. Це важливий складник усього, що ми робимо, починаючи з розробки нових продуктів і закінчуючи контролем впливу нашої діяльності на довкілля.

Ми дбаємо про суспільство, турбуємося про майбутні покоління, піклуємося про наших працівників і віримо, що все, чим ми займаємося, робить нас і нашу країну успішними.

КСВ-проекти компанії «Сингента» націлено на реалізацію важливих внутрішніх і зовнішніх соціальних програм, результати яких сприяють розвитку компанії, покращенню її репутації й іміджу, розширенню партнерських зв'язків із державою, громадськими організаціями, місцевими громадами й навчальними закладами.

Основні напрями діяльності КСВ:

1. Соціально-освітній — виховання молодого покоління аграріїв
2. Турбота про працівників — розвиток, формування корпоративної культури, баланс між роботою і відпочинком, підтримка ментального здоров'я працівників компанії
3. Благодійність і спонсорська допомога — допомога сільським громадам, благодійним фондам та організаціям

СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІЙ

STEM — Science (наука), Technology (технології), Engineering (інженерія), Math (математика) — освітній профорієнтаційний проект для учнів старших класів.

У рамках проекту «Сингента» активно розробляє свою серію інтерактивних навчально-пізнавальних лекцій у тематичному блоці «Біологія та агрономія» для старшокласників, котрі стоять на порозі вибору майбутньої професії. Хто такий агроном, які його обов'язки, чим займаються менеджери з польових і біологічних досліджень, як виробляють насіння — про це та інше ми говоримо з учнями під час зу-



стрічей. Ми розповідаємо майбутнім абітурієнтам про перспективи аграрної сфери, зокрема руйнуємо стереотипи, які існують у молоді з цього приводу, а їх, повірте, дуже багато.

Головна мета — показати, що Україна — це аграрна країна і що саме за сільським господарством наше майбутнє, а спеціалісти — випускники сільськогосподарських вишів — стануть кадрами, які дуже цінуватимуться на ринку праці України і матимуть гідну заробітну плату.

Ми вважаємо, що молоді потрібно продемонструвати, якою цікавою й перспективною може бути робота аграрія, адже кожен третій долар, який отримує наша країна, приносить саме сільське господарство.

Співпраця зі спеціалізованими навчальними закладами

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (НЕНЦ)

Головна мета — розвиток талановитої молоді в аграрній сфері та популяризація професії аграрія.

Кожної весни учні НЕНЦ спільно з фахівцями нашої компанії закладають польові дослідні з вивчення сучасних гібридів овочевих культур на навчально-дослідній ділянці.

Компанія «Сингента» виступає партнером Всеукраїнського форуму юних аграріїв, який проходить в Одесі в таборі «Молода гвардія», та Зльоту дослідників-природознавців у Києві. Аграрні гуртки, презентації дослідів, агроквест, екскурсії до клієнтів і в лабораторію компанії «Сингента» — усе це частина форуму, у якому беруть участь понад 100 дітей з усієї України.

Плідна співпраця з НЕНЦ ознаменувалася відкриттям восени 2017 року «Агрокласу». Основні напрями його роботи охоплюють підготовку учнів до практичної й експериментально-дослідної роботи в галузі сільськогосподарства, ознайомлення із сучасними технологіями вирощування


с.-г. культур, заняття з агрономії й агроєкології для учнів загальноосвітніх навчальних закладів України і Києва, практичні й лабораторні заняття для учнів аграрного відділення Всеукраїнської природничої школи НЕНЦ, допрофесійну підготовку та навчальну практику для студентів аграрних і педагогічних вишів України.

Мала академія наук (МАН)

З 2014 року юні натуралісти й екологи МАН відвідують дослідну станцію і лабораторію компанії «Сингента» в Білій Церкві. Візитери мають змогу дізнатися про важливість фітопатологічної діагностики посівного матеріалу, моніторинг шкідників і збудників інфекцій у період вегетації рослин, про аналіз якісних показників зібраного врожаю. Наші менеджери організують практичний курс, який дозволяє учням самостійно продіагностувати насінневі інфекції і шкідників за симптоматичними ознаками та ідентифікувати збудника під мікроскопом.

Під час семінару на дослідній станції діти можуть упевнитися, що робота в аграрній галузі відрізняється від загальноприйнятих уявлень про неї, адже нині фахівці в цій сфері працюють на надсучасному обладнанні і застосовують прогресивні технології. Менеджери з біологічних досліджень демонструють гостям увесь ланцюг вирощування сільськогосподарських культур. На кожному етапі учні можуть не тільки спостерігати і ставити питання, а й самостійно випробувати певні машини. Юні академіки проходять усі етапи підготовки насіння до посіву: калібрування, очистки і протруювання.

Глибокі теоретичні знання і неоціненний практичний досвід — два основні критерії професіонала аграрної сфери. Ми дуже раді, що маємо можливість працювати з молодим поколінням, і впевнені, що нашу країну чекає прекрасне аграрне майбутнє, а ми із задоволенням допоможемо розкрити потенціал молодих аграріїв.





УКРАЇНСЬКИЙ ПАКТ ЗАРАДИ МОЛОДІ 2025

Цьогоріч компанія «Сингента» підписала Український пакт заради молоді 2025. Цей пакт покликаний сприяти, зміцнювати і розвивати співпрацю між бізнесом та освітнім сектором з метою забезпечення якісної освіти, додаткових місць для стажування й першого місця роботи молодих талантів до 2025 року.

Ми співпрацюємо з аграрними університетами по всій Україні, організуємо конкурси проектних робіт для талановитих студентів та залуцаємо найактивніших зацікавлених студентів до високоякісних програм стажування із забезпеченням менторської підтримки та найкращих практик. У майбутньому вони зможуть скласти кадровий резерв компанії або навіть стати її спеціалістами. Адже це справді важливо — залучати талановиту молодь до розвитку цікавих і перспективних напрямів сільського господарства в Україні.

«ТВОЄ МАЙБУТНЄ В АГРО»

«Сингента» є партнером проекту «Твоє майбутнє в Агро», який має на меті об'єднати зусилля бізнесу для підвищення обізнаності молоді про професії в аграрній сфері, що сприятиме усвідомленому кар'єрному вибору молодих людей.

У рамках проекту ми створюємо детальну карту всіх професій аграрної сфери, вебпортал із вільним доступом до інформації для молоді і вчителів по всій країні та готуємо матеріали для спеціальних занять на тему кар'єрного розвитку в школах і вишах.

Разом із партнерами проекту і Центром розвитку КСВ «Сингента» розробила унікальний буклет «Твоє майбутнє в аграрній сфері». Він допомагає учням і студентам зорієнтуватися у виборі майбутньої професії, зрозуміти особливості аграрної сфери та побачити перспективи кар'єрної реалізації в цій галузі. В основі букле-

та лежать практичні поради й матеріали від провідних українських компаній і, що найцікавіше, реальні історії фахівців, які побудували кар'єру в аграрній сфері.

«СТУДЕНТИ «СИНГЕНТА»»

Компанія «Сингента» заохочує талановиту молодь розвиватися в аграрній сфері. Програма стажування «Студенти «Сингента»» дає студентам практичні навички роботи в цікавих для них сферах. Мета нашого проекту — залучити молоді таланти і передавати їм максимальний об'єм експертизи наших досвідчених працівників. Ми прагнемо сформулювати у студентів інтерес до аграрної професії, продемонструвати її привабливість, щоб вони подолали стереотипне уявлення про неконкурентність цієї сфери.

Щороку компанія «Сингента» відвідує аграрні виші України і залуцає близько 30 студентів на оплачуване стажування в різні відділи, серед яких польові випробування, біологічні дослідження, маркетинг, дослідницькі лабораторії.

Стажування триває від трьох до шести місяців і залежно від напрямку дає можливість студентам дізнатися більше про лабораторні дослідження, взяти участь у закладанні польових дрібноділянкових дослідів, побачити на практиці, який вигляд мають хвороби і шкідники на польових та овочевих культурах.

Величезна нагорода для компанії — коли після стажування студенти не лише остаточно пов'язують своє життя з агро, а ще й стають працівниками компанії. У такі миті ми розуміємо, що йдемо правильним шляхом до формування професійної родини «Сингента».

GENERATION A

Новітній освітній проект Generation A спрямовано на співпрацю з університетами і розвиток талановитої аграрної молоді. Generation A — це про

агроосвіту, про нове покоління та про підготовку молодих і досвідчених кадрів для сільськогосподарської галузі.

У рамках освітньої програми наймотивованіші студенти агрономічних вишів отримують можливість попрактикуватися з досвідченими менторами «Сингента» у справжніх польових умовах і лабораторіях, навчитися сучасних технологій, освоїти інноваційні підходи, роботу на новітньому обладнанні та водночас прокачати комунікабельність і вміння працювати в команді. Програма навчання містить чотири модулі — агрономія, маркетинг, продажі, soft skills, а також цікаві лекції і практичні заняття, екскурсії й поїздки на R&D станції та в лабораторії. По завершенні найкращих студентів буде запрошено на стажування і практику до компанії «Сингента» та її партнерів.

У рамках проекту Generation A «Сингента» підписала меморандуми про науково-технічну, дослідницьку і демонстраційну співпрацю з Полтавською державною аграрною академією (ПДАА), Одеським державним аграрним університетом (ОДАУ), Харківським національним аграрним університетом ім. В. В. Докучаєва та Білоцерківським національним аграрним університетом і надалі планує розширювати територію свого впливу.

Для нас також дуже важливо залучати до освітніх проєктів співробітників. Справді, менеджери сповнені ентузіазму, їм подобається ділитися своїми знаннями й досвідом, робити внесок у розвиток майбутніх професіоналів та розуміти, що в їхніх силах змінити світогляд молоді.

ТУРБОТА ПРО ПРАЦІВНИКІВ

Будь-яка компанія, щоб бути успішною, повинна турбуватися про свій персонал. Наші працівники — це головна цінність компанії. А в цен-



трі уваги «Сингента» — здоров'я, баланс і професійний розвиток працівника.

Щоб установити баланс і створити комфортні умови роботи, компанія інвестує в систему мотивації співробітників, пільги, навчання, формування корпоративної культури та відпочинок колег.

Управління ефективністю роботи співробітників

Визнання особистого внеску і розвитку наших працівників за допомогою управління ефективністю роботи.

«Сингента» допомагає співробітнику розкривати свій потенціал і прагне визначити, визнати та відзначити ті досягнення персоналу, які склали основу успіху компанії. З цією метою ми використовуємо, крім іншого, систему управління ефективністю роботи. Практику управління ефективністю роботи засновано на постійному, чесному і конструктивному

діалозі між лінійним керівником та співробітниками. В основі цього діалогу лежать чітка постановка цілей і планування розвитку.

Навчання працівників

Навчання працівників — найважливіший засіб для досягнення стратегічних цілей компанії, тому ми завжди дбаємо про рівень підготовки і постійний розвиток компетенцій наших працівників.

У компанії «Сингента» є такі блоки тренінгів для співробітників:

- Програми для лідерів, які проводяться в штаб-квартирі компанії
- Програми для лінійних менеджерів
- Тренінги з розвитку загальних навичок (soft skills trainings), крос-функціональної взаємодії та навичок управління
- Функціональні тренінги (для відділу маркетингу, логістики)



- Тренінги для відділу продажів, продуктові тренінги, агрошколи
- Покращення технічних навичок (Excel, PowerPoint тощо)
- Вивчення англійської мови
- Бонус за безаварійне керування службовим автомобілем
- Допомога при виході на пенсію
- Допомога в разі смерті члена сім'ї

«Сингента» надає співробітникам широкі можливості і прозорі механізми для кар'єрного зростання.

Компенсації й пільги

Оплата харчування

Усім працівникам київського офісу централізовано надається харчування. Для працівників у регіонах передбачено компенсаційну виплату в розмірі, визначеному згідно з політикою компанії.

Компенсаційні виплати

Компанія визначила такі компенсаційні виплати:

- Виплата при народженні дитини
- Премія за вислугу років у компанії
- Допомога при одруженні
- Виплата до ювілею

Медичне страхування

На всіх працівників компанії поширюється дія програми медичного страхування. Співробітникам надається можливість приєднати до програми страхування близьких родичів (чоловіка / дружину, дітей) зі знижкою 50 %.

Корпоративна культура і відпочинок

Особливу увагу ми приділяємо корпоративній культурі колег за допомогою:

- активного дозвілля: тимблдинги, літні і зимові корпоративні заходи, Syngenta Family Day, тематичні свята, спортивні заходи, турніри, марафони;
- соціальних заходів: корпоративне волонтерство — Естафета добра, поїздки і менторство підопічних ди-

тячого будинку, допомога притулкам тварин, висадка дерев і прибирання в лісопаркових зонах, садіння соціального городу, добродійні ярмарки, підтримка закладів охорони здоров'я — ремонтні роботи, оснащення й благоустрій території;

- творчого розвитку: тематичні майстер-класи в офісі, артпростір, фотопроєкти, уроки співу.

Підтримка принципів «зеленого офісу» та відповідального споживання

«Сингента» прагне мінімізувати негативний вплив на довкілля.

З цією метою ми дотримуємося принципів «зеленого офісу» — здійснюємо низку заходів, які сприяють раціональному використанню природних ресурсів, як-от сортування сміття, використання енергоощадних приладів, збір батарейок і їх безпечна утилізація. Щовесни волонтерські команди працівників беруть участь у висадці дерев.

Також ми активно сприяємо розвитку «зеленої культури» у кожного співробітника та поширюємо корисні «зелені» звички. Усі ініціативи реалізуються під гаслом «Зменшуй, переробляй і повторно використовуй».

БЛАГОДІЙНІСТЬ І СПОНСОРСЬКА ДОПОМОГА

Естафета добра

Цей проєкт корпоративного волонтерства спрямовано на допомогу суспільству. У рамках проєкту кожен підрозділ обирає певну добру справу, протягом місяця реалізовував її та передавав естафетну паличку іншій команді колег. Понад 110 залучених працівників, 650 волонтерських годин і різні сфери залученості: дитячі будинки, притулки для тварин, будинки для літніх людей, лікарні

й екологічні проекти. Естафета триває, і ми очікуємо ще більше добрих справ та щасливих очей.

ВБО «Даун Синдром»

Залучення колег до активної участі в усіх добродійних спортивних заходах, організованих центром на підтримку дітей з особливими потребами. Виготовляючи щороку новорічні листівки щастя, наша компанія підтримує дітей із Творчого об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями «Дімфо». Саме листівками, зробленими руками талановитих дівчаток і хлопчиків, ми вітаємо наших друзів і партнерів.

МБФ «ДИТЯЧИЙ СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «СОНЯЧНЕ СВІТЛО»

Протягом кількох років компанія підтримує заходи, спрямовані на соціалізацію, реабілітацію і формування навичок самостійності, що їх отримують діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, підопічні реабілітаційного центру. Ми бачимо ефективність провідних методик у сфері соціальної роботи, педагогіки і психології, за якими працюють фахівці центру. Тому підтримка й надання посильної благодійної допомоги — це один із пріоритетних напрямів добродійної діяльності компанії.



ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «НАДІЯ»

Колеги регулярно відвідують заклад як волонтери в рамках внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності. Щороку напередодні дня Святого Миколая офіс «Сингента» відчиняє свої двері учням, які приїжджають до нас і проводять добродійний ярмарок. Ми підтримуємо

ініціативу підлітків, стимулюємо їх розвивати свої таланти, вдосконалювати навички та інвестувати свій вільний час в освітню справу.

Працівники системно приділяють увагу, стають менторами і розвивають необхідні навички у дітей — вихованців дитячого будинку.

«СОС Дитячі Містечка Україна»

Дружнє партнерство та підтримка благодійної організації «СОС Дитячі Містечка», яка допомагає дітям-сиротам знайти родину і стати справді щасливими. Працівники «Сингента» — часті гості містечка і сприяють реалізації таких необхідних ініціатив, постійно залучаючи нових учасників до добрих справ.

Підтримка громад

Ми підтримуємо громади міст і сіл у регіонах, де є наші представництва. Ми не тільки допомагаємо фінансово лікарням, школам, благодійним фондам, а й беремо безпосередню участь у житті громад.



Контактна інформація

ЗАВІТАЙТЕ НА НАШ САЙТ, ДЕ ВИ ЗНАЙДЕТЕ БАГАТО АКТУАЛЬНОЇ І КОРИСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: **WWW.SYNGENTA.UA**



ОФІЦІЙНИЙ ДОДАТОК
«СИНГЕНТА»



Зіскануйте QR-код
для переходу за посиланням

САЙТ WWW.SYNGENTA.UA,
РОЗДІЛ КОНТАКТИ



Зіскануйте QR-код для переходу за посиланням

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР



0 800 50 04 49


Безкоштовно зі стаціонарних телефонів у межах України

Соціальні мережі




**ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
СИНГЕНТА УКРАЇНА**

t.me/syngenta_ua




МИ У FACEBOOK

facebook.com/syngentaukraine




**НАШ КАНАЛ
YOUTUBE**

youtube.com/user/SyngentaUA




НАША ФОТОГАЛЕРЕЯ

flickr.com/photos/syngentaua



**СИНГЕНТА УКРАЇНА
В INSTAGRAM**

instagram.com/syngenta_ukraine





**УНІКАЛЬНИЙ СЕРВІС
«АГРОПРОГНОЗ»**

agroprognoz.com.ua



**ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
ГАРНОГО
ВРОЖАЮ**



Алфавітний покажчик

А	Квадріс® Топ 325 SC, к. с. 117	Реглон® Форте 200 SL, РК.....57
Аксіал® 050 EC, к. е.32	Квантіс®, Р68	Ридоміл® Голд МЦ 68 WG, в. г. 130
Аксіал® Крос 050 EC, KE.....30	Круїзер® 350 FS, т. к. с. 16	Ріас™ 300 EC, KE 131
Актара® 25 WG, в. г. 74	Круїзер® OSR 322 FS, т. к. с. 17	С
Актеллік® 500 EC, к. е. 76	Л	Світч® 62,5 WG, в. г. 132
Альто® Супер 330 EC, к. е. 106	Лінтур® 70 WG, в. г. 44	Селест® Макс 165 FS, ТН 22
Амістар® Голд 250 SC, КС 108	Лірум® 78 SC, к. с. 86	Селест® Топ 312.5 FS, ТН..... 23
Амістар® Екстра 280 SC, к. с. 107	Логран® 75 WG, в. г. 45	Сетар® 375 SC, к. с. 99
Амістар® Тріо 255 EC, к. е. 112	Лонтрел™ Гранд, в. г. 46	Скор® 250 EC, к. е. 133
Ампліго® 150 ZC, ФК..... 78	Люмакс® 537,5 SE, с. е. 48	Т
Апрон® XL 350 ES, ЕН 10	Люфокс® 105 EC, к. е. 87	Талон™, RB, ГП (гранули)..... 148
Атува® (+ протектор Премакс™) 11	М	Талон™, RB, ПБ (воскові брикети) 149
В	Магнелло® 350 EC, KE 118	Твіст™ 250, в. г. 60
Вайбранс® 500 FS, ТН..... 12	Максим® 025 FS, т. к. с. 18	Тілт® 250 EC, к. е. 134
Вайбранс® Інтеграл 235 FS, т. к. с. 13	Максим® XL 035 FS, т. к. с. 21	Тілт® Турбо 575 EC, KE..... 135
Вайбранс® Тріо FS, т. к. с. 14	Максим® Форте 050 FS, т. к. с. 20	Тіовіт Джет® 80 WG, в. г. 136
Вайбранс® RFC, т. н. 15	Матч® 050 EC, к. е. 88	Топаз® 100 EC, к. е. 137
Вертимек® 018 EC, KE..... 80	Мілагро® 040 47	У
Воліам Флексі® 300 SC, КС..... 81	Міравіс® 200 SC, к. с. 124	Ураган Форте® 500 SL, в. р. к. 62
Г	Міравіс® Нео 300 SE, CE..... 122	Ф
Гезагард® 500 FW, к. с. 33	Міравіс® Прайм 400 SC, к. с. 126	Форс® 1,5 G, г. 94
Д	Моддус® 250 EC, к. е. 98	Форс® 200 CS, с. к. 24
Дербі® 175, к. с. 34	Н	Форс® Зеа 280 FS, т. к. с. 25
Діален Супер® 464 SL, в. р. к. 35	Нуредін™ Супер KE..... 90	Фюзілад Форте® 150 EC, к. е. 64
Діналі® 90 DC, КД..... 113	О	Х
Дуал Голд® 960 EC, к. е. 40	Орондіс® Ультра 280 SC, к. с. 128	Хорус® 75 WG, в. г. 138
Е	П	Ц
Елатус® Pіа, 358 KE 114	Пергадо® R 270 WG, ВГ 119	Циделі™ Топ 140 DC, КД..... 140
Елюміс® 105 OD, МД 38	Пік® 75 WG, ВГ 50	Ш
Енжіо® 247 SC, к. с. 82	Пленум® 50 WG, ВГ 92	Ширлан™ 500 SC, к. с. 141
І	Примекстра® Голд 720 SC, к. с. 54	Ю
Ізабіон®, Р. 70	Примекстра® TZ Голд 500 SC, к. с. 55	Юніформ® 446 SE, CE 142
К	Пріма™ Форте 195 , с. е. 51	
Каллісто® 480 SC, к. с. 37	Проклейм® 5 SG, р. г. 93	
Каптора®, РК..... 40	Р	
Каптора® Плюс, РК 42	Ревус® Топ 500 EC, к. с. 127	
Карате® Зеон 050 CS, мк. с. 84	Реглон® Ейр 200 SL, РК 56	
Квадріс® 250 SC, к. с. 116	Реглон® Супер 150 SL, РК 58	

«План успішного зростання»: нові зобов'язання і цілі до 2025 року

Допомагаємо сільгоспвиробникам, боремося зі змінами клімату

Прискорення інновацій для сільгоспвиробників і природи

- Інвестувати 2 млрд дол. США в науково-технологічні новації у сфері ведення сталого сільського господарства
- Щороку здійснювати два науково-технологічні прориви у сфері ведення сталого сільського господарства
- Прагнути до мінімально можливого залишкового вмісту пестицидів у с.-г. продукції і довколишньому середовищі



Прагнення до вуглецево-нейтрального сільського господарства

- Вимірювати і скорочувати рівень викидів CO₂ у с.-г. виробництві, забезпечувати зниження їхніх негативних наслідків для навколишнього середовища
- Сприяти покращенню біорозмаїття та підтриманню здоров'я ґрунтів на 3 млн га сільгоспугідь щороку
- До 2030 року зменшити на 50 % інтенсивність викидів вуглецю на підприємствах компанії



Забезпечення здоров'я і безпеки людей

- Забезпечити нульовий рівень травматизму і позаштатних ситуацій під час ведення нашої діяльності
- Щороку навчати 8 млн сільгоспвиробників принципів безпеки праці
- Прагнути до забезпечення справедливих умов праці на всіх підприємствах нашої мережі



Важливе партнерство

- Побудувати міцні партнерські відносини та оприлюднити визначені спільні цілі у сфері ведення сталого сільського господарства
- Розпочати всебічний діалог про інновації у сфері ведення сталого сільського господарства
- Просувати принципи ведення сталого сільського господарства на рівні керівників компанії



Розкриймо потенціал рослини разом®

syngenta

03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70

Консультаційний центр

0 800 50 04 49

Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

www.syngenta.ua

Каталог насіння 2021
розповсюджується безкоштовно

