

КАТАЛОГ – 2021



років



Agrosfera ®
Територія професійного захисту

Якісна продукція • Експертність • Надійність



Компанія **Agrosfera** провідна українська компанія, яка веде свою діяльність з 2001 року. Наші висококваліфіковані фахівці постійно розробляють інноваційні рішення для потреб сільгоспвиробників.

Основні напрямки діяльності компанії є розробка, виробництво та продаж:

- Засобів захисту рослин
- Мікродобрив
- Регуляторів росту рослин
- Посівного матеріалу, а саме: гібриди кукурудзи та соняшнику

На сьогодні асортимент Компанії налічує 61 препарат, вісім із-поміж них – унікальні.

Серед інноваційних розробок – продукти для зернових, сої, кукурудзи та технічних культур:

- протруйники ГАЛЕОН, ПЕНТАФОРС, ТОМАГАВК
- гербіцид НІКОМІЛ, ФУТУРИН
- фунгіциди АРБАЛЕТ, БАЛІСТА
- регулятор росту ФРЕШ ЕНЕРГІЯ.

Працюючи з нами ви отримуєте:

- Якісні продукти від виробника
- Готові системи захисту польових культур
- Послугу «Листкова діагностика», що дає змогу:
 - встановити фактичну недостачу елементів живлення;
 - розробити оптимальні рекомендації внесення добрив для формування максимального та якісного врожаю;
 - якісно коригувати умови вирощування сільськогосподарських культур методом позакореневого внесення добрив нашої компанії.
- Професійний агрономічний супровід на всіх етапах, від консультації до збору врожаю
- Безкоштовну доставку продукції
- Можливість зберігання продукції в сучасному ліцензійному складському комплексі нашої компанії
- Зручність роботи з компанією:
 - Ви можете працювати з торговим працівником.
 - здійснити покупку самостійно на сайті компанії або через мобільний додаток.

Мета нашої Компанії – якісний продукт за оптимальною ціною.

Для перевірки якості продукції, ми співпрацюємо з провідним європейським науково-дослідницьким центром «ALDIP», сучасне обладнання якого дозволяє проводити повний аналіз фізико-хімічних характеристик всіх діючих речовин та препаративних форм.

Компанія має представництва по всій території України, що робить нас ближче до кожного клієнта.

Agrosfera дбає про своїх клієнтів і вчасно вирішує питання пов'язані з захистом врожаю.

Офіційний мобільний додаток

Agrosfera 
Територія професійного захисту

Agrosfera 



Безкоштовні

дзвінки

0 800 20 42 42

www.agrosfera.ua



З електронним
документообігом
покупки дешевше на **5%**

Вигідно. Сучасно. Швидко

- ✓ Покупка за лічені хвилини
- ✓ Онлайн чат з агрономом
- ✓ Зручний пошук
- ✓ Готові системи захисту сільськогосподарських культур
- ✓ Незамінний помічник агрономів та власників господарств

Зміст

Протруйники насіння

• • Галеон, ТН	(дифенокназол, 92 г/л + азоксистробін, 27 г/л)	10
• Гранівіт, ТН	(карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л)	12
• Ін сет SC, КС	(імідаклоприд, 600 г/л)	14
• Ін сет, ВГ	(імідаклоприд, 700 г/кг)	16
• Кольчуга Плюс, ТН	(тебуконазол, 120 г/л)	18
• • Пентафорс 322 FS, ТН	(імідаклоприд, 160 г/л + лямбда-цигалотрин, 25 г/л + флутріафол, 30 г/л + тирам, 100 г/л + тебуконазол, 7 г/л)	20
• • Томагавк, ТН	(тебуконазол, 60 г/л + флутріафол, 85 г/л)	22
• Форсаж, КС	(карбендазим, 500 г/л)	24

Гербіциди

• Аболір, РГ	(гліфосат, у вигляді амонійної солі, 757 г/кг)	26
• Апач, ВГ	(дикамби натрієва сіль, 468 г/кг + римсульфурон, 25 г/кг)	28
• Вулкан Плюс, РК	(гліфосат у формі ізопропіламіної солі, 480 г/л)	30
• Гурон, ВГ	(тифенсульфурон-метил, 375 г/кг + трибенурон-метил, 375 г/кг)	32
• Деліт, РК	(гліфосату калійна сіль, 613 г/л)	34
• Дікам Плюс, РК	(2,4-Д у формі диметиламіної солі, 344 г/л + дикамба у формі диметиламіної солі, 120 г/л)	36
• Екстрем, КЕ	(ацетохлор, 900 г/л)	38
• Еліот, МД <small>NEW</small>	(мезотріон, 75 г/л + нікосульфурон, 30 г/л)	40
• Ефес, РК	(бентазон, 480 г/л)	42
• Канцлер, ВГ	(тифенсульфурон-метил, 750 г/кг)	44
• Корвет, КС	(флуметсулам, 100 г/л + флорасулам, 75 г/л)	46
• Крейсер, ВГ	(римсульфурон, 250 г/кг)	48
• Легіон, ВГ	(клопіралід, 750 г/кг)	50
• Меркурій, ВГ	(трибенурон-метил, 750 г/кг)	52
• Молтено, РК	(імазамокс, 40 г/л)	54
• • Нікоміл, МС	(нікосульфурон, 60 г/л)	56
• Пропозит, КЕ	(пропізохлор, 720 г/л)	58
• Рейтар, КС	(прометрин, 500 г/л)	60
• Стиллет, КЕ	(клетодим, 120 г/л)	62
• Сулам, СЕ	(2,4-Д-2-етилгексилієвий ефір, 452,42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л)	64
• Тайфун, КЕ	(метолахлор, 960 г/л)	66
• Ультра Плюс, КЕ <small>NEW</small>	(2-етилгексилієвий ефір 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти, 850 г/л, у кислотному еквіваленті – 564 г/л)	68
• • Футурин, ВГ	(дикамби натрієва сіль, 600 г/кг + тифенсульфурон-метил, 60 г/кг)	70

• Хантер, РК	(імазапір, 15 г/л + імазамокс, 33 г/л)	72
• Шквал, КЕ	(хізалофоп-П-етил, 125 г/л)	74
• Юпітер, РК	(імазетапір, 100 г/л)	76

Інсектициди

• Альтекс, КЕ	(альфа-циперметрин, 100 г/л)	78
• Дестрой, КС	(імідаклоприд, 250 г/л + лямбда-цигалотрин, 80 г/л)	80
• Ін сет, ВГ	(імідаклоприд, 700 г/кг)	82
• Ріфос, КЕ	(хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л)	84
• Штурм, ЗП	(піридабен, 200 г/кг)	86

Фунгіциди

• • Арбалет, КС	(азоксистробін, 200 г/л + флутріафол, 120 г/л)	88
• • Баліста, КЕ	(тебуконазол, 120 г/л + спіроксамін, 300 г/л + дифенокназол, 30 г/л)	90
• Корнет, КС	(флутріафол, 250 г/л)	92
• Ретардин EW, EB	(тебуконазол, 250 г/л)	94
• Ретардин, ВГ	(тебуконазол, 500 г/кг)	96
• Форсаж, КС	(карбендазим, 500 г/л)	98
• Юнкер, ЗП	(металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг)	100

Десиканти

• Аболір, РГ	(гліфосат, у вигляді амонійної солі, 757 г/кг)	102
• Везувій, РК	(дикват дибромід, 150 г/л)	104
• Вулкан Плюс, РК	(гліфосат у формі ізопропіламіної солі, 480 г/л)	106
• Деліт, РК	(гліфосату калійна сіль, 613 г/л)	108

Фуміганти

• Фосфір, ТБ	(фосфід алюмінію, 560 г/кг)	110
--------------	-----------------------------	-----

ПАР

• Флокс, РК	(етоксилат ізодецилового спирту, 90%)	112
• Флокс, Експерт, РК	(полієфір трисилоксан)	114
• Флокс, Профі, РК	(полієфір полісілоксан)	116

АД'ЮВАНТИ

• Ленс <small>NEW</small>	(полідиметилсілоксан, 40%)	118
---------------------------	----------------------------	-----

Мікродобрива

• Бор Маджестик, Рід	(бор (В) – 11%, азот (N) – 4,8%, фосфор (P ₂ O ₅) – 2%, калій (K ₂ O) – 4% та мікроелементи)	120
• Цинк Маджестик, Рід	(цинк (Zn) – 13%, солі гумінових кислот – 10 г/л, азот (N) – 5%, фосфор (P ₂ O ₅) – 2%, калій (K ₂ O) – 4% та мікроелементи)	122
• Калій Фреш, П	(гіберелін – 10 г/кг, азот (N) – 5%, фосфор (P ₂ O ₅) – 15%, калій (K ₂ O) – 38% та мікроелементи)	124
• Універсал Фреш, П	(бурштинова кислота – 40 г/кг, азот (N) – 20%, фосфор (P ₂ O ₅) – 20%, калій (K ₂ O) – 20% та мікроелементи)	125
• Фосфор Фреш, П	(індолілмасляна кислота – 10 г/кг, азот (N) – 10%, фосфор (P ₂ O ₅) – 40%, калій (K ₂ O) – 11% та мікроелементи)	126

Регулятори росту

• Аміно Фреш, Рід.	(амінокислоти – 150 г/л, азот (N) – 11%, фосфор (P ₂ O ₅) – 2%, калій (K ₂ O) – 4% та мікроелементи)	127
• Гуміленд Фреш, Рід.	(солі гумінових кислот – 120 г/л, солі фульвокислот – 60 г/л, азот (N) – 2,5%, фосфор (P ₂ O ₅) – 2%, калій (K ₂ O) – 4% та мікроелементи)	128
•• Енергія Фреш, П	(індолілмасляна кислота – 40 г/кг, азот (N) – 5,4%, фосфор (P ₂ O ₅) – 5%, калій (K ₂ O) – 8% та мікроелементи)	129
• Ленд Фреш, П	(солі фульвокислот – 500 г/кг, азот (N) – 3%, фосфор (P ₂ O ₅) – 5%, калій (K ₂ O) – 10% та мікроелементи)	130
• Мікс Фреш, П	(амінокислоти – 150 г/кг, азот (N) – 10%, фосфор (P ₂ O ₅) – 5%, калій (K ₂ O) – 8% та мікроелементи)	131
• Флорід Фреш, П	(екстракт морських водоростей – 500 г/кг, амінокислоти – 15 г/кг, азот (N) – 3%, фосфор (P ₂ O ₅) – 5%, калій (K ₂ O) – 16% та мікроелементи)	132

Бакові суміші

• Порядок приготування бакових сумішей	133
• Бакові суміші	134
Варіанти застосування	
• мікродобрив та стимуляторів росту	135

Системи захисту рослин

• Буряки цукрові	136
• Виноградники	137
• Горох	138
• Картопля	139
• Кукурудза	140
• Пшениця та ячмінь	142
• Ріпак	144
• Соняшник	146
• Соя	148
• Яблуна	150

Довідкова інформація

• Найважливіші фенологічні «критичні» фази	151
• Фізіологічна потреба основних сільськогосподарських культур в мікроелементах та сірці	151
• Чутливість бур'янів до гербіцидів	152
• Спектр дії фунгіцидів і протруйників насіння	156
• Заходи безпеки	158

Посівний матеріал

СОНЯШНИК

• AGS 103 HO	160
• AGS 104 OR	161
• AGS 102 CL	162
• AGS 101 OR	163
• AGS 105 CL	164

КУКУРУДЗА

• AGS 504	165
• AGS 502	166
• AGS 505	167
• ДН Корунд	168
• Білозірський 295 СВ	169
• Подільський 274 СВ	170
• Солонянський 298 СВ	171
• ДН Акватор	172

• Зони вирощування	173
• Для нотаток	174



HO – високоолеїновий гібрид



OR (5, 6, 7) – стійкість до вовчка



Clearfield CL – технологія вирощування
Production System for Sunflower

Professional
Професійна серія

Галеон®, ТН

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ФУНГІЦИДНИЙ ПРОТРУЙНИК НА ОСНОВІ ДВОХ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ, ЯЧМЕНЮ ТА СОЇ ВІД ШИРОКОГО СПЕКТРУ ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ ХВОРОБ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
дифеноконазол, 92 г/л + азоксистробін, 27 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат, який тече, для обробки насіння

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Високоєфективний проти збудників хвороб, стійких до металаксилу та похідних триазолу
- Швидкі та дружні сходи, завдяки відсутності ретардантної дії та ростостимулюючим властивостям
- Стабільна фунгіцидна активність препарату в найбільш вразливій фазі вегетації на початку росту рослин
- М'яко діє на рослини – забезпечує дружні сходи та прискорює їх появу на 1-2 дні
- Відмінна дія на збудників сажок, корневих гнилей (в тому числі пітіозної) та пліснявіння насіння

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Дифеноконазол належить до хімічної групи триазолу. Його дія полягає в пригніченні процесу диметилування ергостеролу, що відіграє важливу роль в процесі утворення клітинної оболонки грибів та розвитку міцелію. Азоксистробін пригнічує мітохондріальне дихання, блокуючи транспорт електронів в ланцюзі цитохромів. Поєднання дифеноконазолу та азоксистробіну забезпечує розширення спектру контрольованих хвороб, довготривалість захисної дії та високу фунгіцидну ефективність.

ГАЛЕОН, ТН ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТАКИХ КУЛЬТУР:

Культура	Спосіб та строки застосування	Збудники хвороб	Норма внесення, л/т насіння
Пшениця	Протруювання насіння до висівання	Летюча і тверда сажка, гельмінтоспоріозна, фузаріозна і пітіозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, септоріоз	0,55-0,75
Ячмінь		Летюча і кам'яна сажка, гельмінтоспоріозна, фузаріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, септоріоз, темно-бура плямистість	
Соя		Фузаріоз, аскохітоз, антракноз, сіра гниль, пероноспороз, фузаріозна коренева гниль, пліснявіння насіння	

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ГАЛЕОН, ТН:

Завдяки чому досягається максимальний захист насіння від хвороб?

Завдяки вдалому поєднанню двох компонентів з різних хімічних груп, що вдало підсилюють дію один одного. Дифеноконазол як системний фунгіцид швидко проникає в насіння та надійно захищає від збудників летючої сажки та хвороб сходів та має кращу серед триазолів ефективність проти корневих гнилей та пліснявіння насіння. Азоксистробін є високоєфективним фунгіцидом з найширшим спектром дії, що контролює збудників хвороб, що належать до чотирьох класів грибів в тому числі несправжніх, та завдяки відмінній контактній дії захищає рослини від твердої сажки, корневих гнилей (в тому числі пітіозної) та пліснявіння насіння.

Які переваги крім надійного захисту від хвороб має препарат?

Проникаючи всередину насіння азоксистробін підвищує ефективність використання поживних речовин і води та покращує засвоєння азоту, що сприяє підвищенню польової схожості навіть за несприятливих погодних умов. Дифеноконазол, на відміну від переважної більшості триазолів, не вповільнює появу сходів, оброблене ним насіння проростає на дві доби швидше, сходи з'являються одночасно, посилюється куцистість та збільшується кількість продуктивних стебел.

Приготування та норми витрати, робочого розчину:

Необхідно пам'ятати, що ефективність протруєння насіння залежить від ретельного дотримання правил регулювання обладнання, приготування робочого розчину та організації проведення робіт.

Перед обробкою обов'язково перевірити справність обладнання протруювача, промити бак та провести регулювання робочих органів.

Чи можна застосовувати Галеон, ТН з іншими препаратами?

Під час обробки насіння протруйник можна застосовувати сумісно, або послідовно з іншими препаратами інсектицидної, стимулюючої дії та мікродобривами.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +30°C



Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
Від +2°C	До норми препарату на 1 т насіння додати 5-10 літрів води



Летюча сажка пшениці



Тверда сажка



Борошниста роса пшениці



Гельмінтоспоріозна коренева гниль



Standard
Стандартна серія

Гранівіт®, ТН

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОТРУЙНИК НАСІННЯ ПШЕНИЦІ, ЯЧМЕНЮ ТА КУКУРУДЗИ ВІД ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ ХВОРОБ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

концентрат, який тече, для обробки насіння

УПАКУВАННЯ:

20 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Можливість сівби навіть за посушливих умов
- Висока енергія проростання та схожості насіння
- Підвищення стійкості сходів та проростків до несприятливих умов
- Ростостимулююча дія за рахунок карбоксину
- Довготривалий ефект

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Універсальність цього протруйника визначається компонентами препарату, до складу якого входять карбоксин та тирам. Системна діюча речовина карбоксин відзначається високими фунгіцидними властивостями по відношенню до збудників сажкових хвороб рослин завдяки активному блокуванню ферментативного комплексу мітохондрій клітин фітопатогенних грибних організмів. У свою чергу, контактна діюча речовина тирам має високу ефективність в обмеженні розвитку збудників пліснявіння та загнивання сходів, корневих та стеблових гнилей, септоріозу.



Пшениця



Ячмінь



Кукурудза

ГРАНІВІТ, ТН ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТАКИХ КУЛЬТУР:

Культура	Спосіб та строки застосування	Збудники хвороб	Норми внесення, л/т насіння
Пшениця, ячмінь	Протруювання насіння до висівання	Тверда та летюча сажки, комплекс збудників корневих гнилей, пліснявіння сходів	2,5-3,0
Кукурудза		Пухирчаста та летюча сажки, комплекс збудників корневих і стеблових гнилей, пліснявіння	



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ГРАНІВІТ, ТН

Чи проявляє протруйник фітотоксичну дію?

Препарат не спричиняє пригнічення рослин. В обробленого препаратом насіння підвищуються енергія проростання та схожість. Проростаюче насіння, що протруєне препаратом Гранівіт, ТН, характеризується комплексною стійкістю до несприятливих умов проростання.

Коли доцільно протруювати насіння препаратом?

Насіння краще інкрустувати препаратом до висівання. Проте оброблене насіння може тривалий час зберігатися без зниження насінневих якостей.

Від чого залежить якість обробки насіння?

Якість протруювання препаратом залежить від низки факторів, а саме: насінневий матеріал перед протруюванням має бути відкаліброваним, звільненим від домішок. Важливо перед протруюванням правильно приготувати робочий розчин та відрегулювати протруювач.

Чи можливо застосовувати Гранівіт, ТН з іншими препаратами?

Під час обробки насіння протруйник можна застосовувати сумісно або послідовно з іншими препаратами інсектицидної та стимулюючої дії.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

2 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

Іконка	Оптимальні температурні умови застосування	Іконка	Приготування робочого розчину
	Від +2°C		До норми витрати препарату на 1 т насіння додати до 10 л води

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Спосіб та строки застосування	Збудники хвороб	Норми витрати, л/т насіння
Жито	Протруювання насіння до висівання	Летюча, стеблова сажки, кореневі гнилі, снігова пліснява	2,5-3,0
Ріпак		Пліснявіння насіння, альтернاریоз, коренева гниль	2,0-3,0
Льон-довгунець		Антракноз, плямистості	1,5-2,0
Горох		Кореневі гнилі	2,5



Пліснявіння сходів пшениці



Тверда сажка



Пухирчаста сажка кукурудзи



Летюча сажка кукурудзи





Standard
Стандартна серія

Ін Сет® SC, КС

ПРОТРУЙНИК КОНТАКТНО-СИСТЕМОЇ ДІЇ ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОГО ПРОТРУЄННЯ НАСІННЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
імідаклопрід, 600 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Знищення шкідників насіння та сходів - від сівби до проростання
- Висока швидкість дії
- Не проявляє фітотоксичну дію на рослини
- Можливість застосування з більшістю фунгіцидних протруйників
- Зручна препаративна форма

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина препарату Ін Сет SC, КС - імідаклопрід належить до групи неонікотиноїдів, діє як антагоніст постсинаптичних нікотинових рецепторів у центральній нервовій системі шкідника, з послідовним її руйнуванням. В результаті комаха припиняє рухатись, харчуватись і гине протягом доби.

ІН СЕТ SC, КС ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТАКИХ КУЛЬТУР:

Культура	Спосіб та строки застосування	Шкідники	Норми витрати, л/т насіння
Кукурудза	Обробка насіння перед висіванням	Дротяники, шведська муха	3,5-6,0
Соняшник		Дротяники	4,0-7,0
Пшениця		Злакові мухи, цикадки	0,3-1,0
		Хлібна жужелиця	1,0-1,5
Ріпак		Хрестоцвітні блішки та ґрунтові шкідники	3,0-4,0



Дротяник



Хлібна жужелиця



Попелиці



Злакова муха

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ІН СЕТ SC, КС:

Як досягти максимальної ефективності від обробки протруйником Ін Сет SC, КС?

Перед застосуванням препарат слід розбавити в такій пропорції: 8-10 л води + норма витрати препарату на тону насіння. Під час обробки необхідно ретельно перемішувати робочий розчин. Обов'язковою вимогою є забезпечення рівномірного покриття насіння плівкою робочого розчину. Протруєне насіння повинно зберігатись у прохолодному, сухому приміщенні з вентиляцією, висіватись як можна в більш короткий період часу після протруєння.

Чи можна використовувати Ін Сет SC, КС в бакових сумішах з іншими препаратами?

Препарат можна використовувати з більшістю фунгіцидних протруювачів для розширення спектру дії проти грибкових хвороб.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

Іконка	Оптимальні температурні умови застосування	Іконка	Приготування робочого розчину
	Від +2°C		До норми витрати препарату на 1 т насіння необхідно додати 8-10 л води

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Ін Сет SC, КС (0,9 л/т) + Томагавк, ТН (0,4-0,5 л/т)
- Ін Сет SC, КС (0,9 л/т) + Кольчуга Плюс, ТН (0,2-0,25 л/т)
- Ін Сет SC, КС (0,9 л/т) + Форсаж, КС (0,8-1,2 л/т)



Протруйники насіння



Standard
Стандартна серія

Ін Сет, ВГ

**ПРОТРУЙНИК НАСІННЯ
КОНТАКТНО-СИСТЕМНОЇ ДІЇ
ПРОТИ ШИРОКОГО СПЕКТРУ ШКІДНИКІВ**



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
імідаклоприд, 700 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:
гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ:
1 кг фольгований пакет (10 пакетиків по 100 г)

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Захист від ґрунтових та наземних шкідників
- Висока швидкість дії
- Не проявляє фітотоксичну дію на рослини
- Можливість застосування з більшістю фунгіцидних протруйників
- Відсутність резистентності у шкідників

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина препарату поглинається корінням рослини і рівномірно розподіляється по всій рослині, тим самим забезпечуючи захист від сисних і гризучих комах. Діюча речовина імідаклоприд відноситься до групи неонікотиноїдів. Вона діє як антагоніст постсинаптичних нікотинових рецепторів, з послідовним руйнуванням центральної нервової системи шкідників, в результаті чого комаха перестає рухатись, харчуватись і гине протягом доби.

ІН СЕТ, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТАКИХ КУЛЬТУР:

Культура	Спосіб та строки застосування	Шкідники	Норми витрати, кг/т насіння
Кукурудза	Обробка насіння перед висіванням	Дротяники, шведська муха	3,0-4,5
Соняшник		Дротяники	3,5-5,5
Пшениця		Злакові мухи, цикадки	0,25-0,6
		Хлібна жужелиця	0,6-0,75
Ріпак		Хрестоцвітні блішки та ґрунтові шкідники	2,5-3,5



Дротяник



Хлібна жужелиця



Попелиці



Цикадки

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ІН СЕТ, ВГ:

Як досягти максимальної ефективності від обробки протруйником Ін Сет, ВГ?

Перед застосуванням препарат слід розбавити в такій пропорції: 5-10 л води + норма витрати препарату на тону насіння. Під час обробки необхідно ретельно перемішувати робочий розчин. Обов'язковою вимогою є забезпечення рівномірного покриття насіння плівкою робочого розчину. Протруєне насіння повинно зберігатись у прохолодному, сухому приміщенні з вентиляцією, висіватись як можна в більш короткий період часу після протруєння.

Чи можна використовувати Ін Сет, ВГ в бакових сумішах з іншими препаратами?

Препарат можна використовувати з більшістю фунгіцидних протруйників для розширення спектру дії проти грибних хвороб.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від -10°C до +35°C

Іконка	Оптимальні температурні умови застосування	Іконка	Приготування робочого розчину
	Від +2 °C		До норми витрати препарату на 1 т насіння необхідно додати 5-10 л води

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Ін Сет, ВГ (0,25-0,75 кг/т) + Томагавк, ТН (0,4-0,5 л/т)
- Ін Сет, ВГ (0,25-0,75 кг/т) + Кольчуга Плюс, ТН (0,2-0,25 л/т)
- Ін Сет, ВГ (0,25-0,75 кг/т) + Форсаж, КС (0,8-1,2 л/т)





Standard
Стандартна серія

Кольчуга Плюс, ТН



ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ФУНГІЦИДНИЙ ПРОТРУЙНИК НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ ВІД ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ ХВОРОБ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
тебуконазол, 120 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат, який тече, для обробки насіння

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Подвійна концентрація діючої речовини
- Неперевершене пригнічення збудників сажкових хвороб
- Підвищення життєздатності рослин
- Довготривалий ефект

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Препарат Кольчуга Плюс, ТН – системний протруйник насіння із захисними та лікувальними властивостями. Діюча речовина препарату тебуконазол є високоактивним інгібітором життєво важливого для фігопатогенних грибів ергостеролу, який є незамінним компонентом клітинних мембран. Тебуконазол швидко поглинається проростками і розподіляється переважно в надземній частині рослин. Завдяки таким властивостям діючої речовини препарат забезпечує довготривалий захисний ефект в обмеженні розвитку сажкових хвороб, іржі, борошнистої роси, гельмінтоспориозу та септоріозу.

КОЛЬЧУГА ПЛЮС, ТН ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТАКИХ КУЛЬТУР:

Культура	Спосіб та строки застосування	Збудники хвороб	Норми витрати, л/т
Пшениця озима та яра, ячмінь ярий	Протруювання насіння до висівання	Тверда та летюча сажки, комплекс збудників кореневих гнилей, септоріоз	0,2-0,25



Фузаріозна коренева гниль



Гельмінтоспориозна коренева гниль



Септоріоз пшениці



Летюча сажка пшениці

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ КОЛЬЧУГА ПЛЮС, ТН:

У чому проявляється довготривалий захисний ефект при використанні протруйника Кольчуга Плюс, ТН?

Довготривалий ефект фунгіцидної дії дозволяє ефективно контролювати розвиток хвороб листя навіть на початку росту та розвитку рослин та зменшити кількість обробок рослин фунгіцидами або повністю виключити їх.

На які структурні показники врожаю зернових впливає препарат?

При застосуванні препарату покращуються структурні показники продуктивності посівів зернових колосових (густота посівів, куцистість рослин, продуктивність колосся) що, в свою чергу, позначається на збільшенні врожайності культур.

За яких умов проявляється найвищий ефект від застосування препарату?

Якісна обробка насіння препаратом зі своєчасним висіванням в добре підготовлений вологий ґрунт забезпечують високий ефект дії препарату.

Від чого залежить якість обробки насіння?

Якість протруювання препаратом залежить від низки факторів, а саме: насінневі матеріал перед протруюванням має бути відкаліброваним, звільненим від домішок. Важливо перед протруюванням правильно приготувати робочий розчин та відрегулювати протруювач.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Оброблене насіння може зберігатись протягом року, проте його схожість та енергія проростання залежатимуть від фізичних умов зберігання. При використанні протруєного насіння, що зберігалось тривалий час, необхідно перевірити його схожість.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +30°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +2°C		До норми витрати препарату на 1 т насіння додати 5-10 л води

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

Кольчуга Плюс, ТН (0,2 л/т) + Форсаж, КС (0,5 л/т)



Борошниста роса ячменю



Борошниста роса пшениці



Тверда сажка



Протруйники насіння



Пентафорс 322 FS, ТН

ЄДИНИЙ П'ЯТИКОМПОНЕНТНИЙ ПРОТРУЙНИК СИСТЕМНОЇ ТА КОНТАКТНОЇ ДІЇ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ ГРИБНИХ ХВОРОБ ТА КОМПЛЕКСУ ШКІДНИКІВ ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ, ПРОФІЛАКТИКИ БАКТЕРІАЛЬНИХ ТА ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

імідаклопрід, 160 г/л + лямбда-цигалотрин, 25 г/л + флутриафол, 30 г/л + тирам, 100 г/л + тебуконазол, 7 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

концентрат, який тече, для обробки насіння

УПАКУВАННЯ:

10 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Найповніший захист від насінневих, ґрунтових та аерогенних інфекцій
- Знищує не тільки наземних, а й ґрунтових шкідників
- Обмежує поширення бактеріальних і вірусних захворювань

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

В препараті містяться діючі речовини контактної та системної дії. Поєднання системних фунгіцидів групи триазолів: флутриафол, посилений тебуконазолом, ефективно контролюють збудників твердої і летючої сажки, іржі, септоріозу, гельмінтоспоріозу і фузаріозу, плямистостей шляхом пригнічення синтезу ергостеролу в клітинах патогенів. Контактний фунгіцид тирам надзвичайно ефективний проти кореневих, стеблових гнилей, пліснявиння насіння. Контроль понад 20 видів грибних хвороб.

Захист насіння і сходів від ґрунтових та наземних шкідників здійснюється за рахунок синергічної взаємодії інсектицидів з різних хімічних груп: неонікотиноїди (імідаклопрід) і синтетичні пиретроїди (лямбда-цигалотрин). Механізм дії на шкідників: блокування постсинаптичних нікотинових рецепторів в центральній нервовій системі та порушення функції нейронів через натрієві канали.

ПЕНТАФОРС 322 FS, ТН ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТАКИХ КУЛЬТУР:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати, л/т
Пшениця озима	Комплекс насінневих та ґрунтових збудників хвороб: сажки, пліснявиння насіння, кореневі гнилі, септоріоз, листові іржі, борошниста роса. Комплекс ґрунтових шкідників та шкідників посівів: дротяники, совка озима, турун хлібний, злакові мухи, блішки, цикадки, попелиці	1,5-2,0
Ячмінь ярий	Комплекс насінневих та ґрунтових збудників хвороб: сажки, пліснявиння насіння, кореневі гнилі, септоріоз, листові іржі, борошниста роса, плямистість, гельмінтоспоріоз. Комплекс ґрунтових шкідників та шкідників посівів: дротяники, совка озима, турун хлібний, злакові мухи, блішки, цикадки, попелиці	1,5-2,0

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ПЕНТАФОРС 322 FS, ТН:

В чому полягає комплексна дія препарату?

Завдяки поєднанню п'яти компонентів забезпечується максимальний захист проти найбільш широкого спектру хвороб та шкідників серед протруйників, що є на ринку України:

- Наявність складових з різних хімічних груп та з різним механізмом дії унеможливує виникнення резистентності до препарату.
- Крім захисту від грибних інфекцій препарат має бактерицидну дію, обумовлену присутністю тираму.
- Захищаючи сходи від попелиць та цикадок, імідаклопрід тим самим зупиняє поширення вірусних хвороб.
- Лямбда-цигалотрин дозволяє посилити дію протруйника проти ґрунтових шкідників, в тому числі з родини лускокрилих.

Які передумови ефективної дії препарату Пентафорс 322 FS, ТН?

Для того, щоб протруйник повністю проявив свою дію потрібно дотримуватись рекомендацій по підготовці насіння та приготуванню робочого розчину.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +30°C

Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
Від +2°C	До норми витрати препарату на 1 т насіння додати води, довівши кількість робочого розчину до 10 л



Дротяник



Совка підгризаюча



Попелиці



Цикадки



Пліснявиння сходів пшениці



Летюча сажка пшениці



Тверда сажка пшениці



Борошниста роса





Professional
Професійна серія

Томагавк®, ТН



ФУНГЦИДНИЙ ПРОТРУЙНИК НАСІННЯ НА ОСНОВІ ДВОХ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ОБРОБКИ ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ ВІД ШИРОКОГО СПЕКТРУ ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ ХВОРОБ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

тебуконазол, 60 г/л + флутриафол, 85 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

концентрат, який тече, для обробки насіння

ПАКУВАННЯ:

5 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Не має аналогів
- Широкий спектр контрольованих хвороб
- Тривалий захисний ефект

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діючі речовини препарату – тебуконазол та флутриафол – належать до хімічної групи триазолі. Їхня дія полягає в пригніченні процесу диметилування ергостеролу, що відіграє важливу роль в процесі утворення клітинної оболонки грибів та розвитку міцелію. Флутриафол характеризується найвищою рухливістю в порівнянні з іншими триазолами. Його поєднання з тебуконазолом забезпечує розширення спектру контрольованих хвороб, довготривалість захисної дії та високу фунгіцидну ефективність.

ТОМАГАВК, ТН ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТАКИХ КУЛЬТУР:



Пшениця



Ячмінь

Культура	Спосіб та строки застосування	Збудники хвороб	Норми внесення, л/т насіння
Пшениця	Протруювання насіння до висівання	Тверда та летюча сажки, гельмінтоспоріоз, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, септоріоз	0,4-0,5
Ячмінь		Летюча та тверда сажки, гельмінтоспоріозна та фузаріозна, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, сітчаста плямистість	

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ТОМАГАВК, ТН:

Які заходи проводяться при роботі з препаратом Томагавк, ТН?

Ефективність протруювання насіння залежить від ретельного дотримання правил регулювання обладнання, приготування робочого розчину та організації проведення робіт. Перед обробкою обов'язково перевірити справність обладнання протруювача, промити бак та провести регулювання робочих органів. Після проведення робіт – ретельно промити бак протруювача чистою водою. Використану воду утилізують у спеціально відведених місцях. Перед приготуванням робочого розчину вміст каністри ретельно перемішати. Робочий розчин готують в таких пропорціях: до норми витрати препарату на тону насіння додають води до 5-10 л залежно від типу протруювача та виробничих умов. Насіння інкрустується препаратом до висівання. Під час обробки необхідно ретельно перемішувати робочий розчин. Обов'язковою вимогою є забезпечення рівномірного покриття насіння плівкою робочого розчину.

З якою метою проводиться обробка насіння зернових культур препаратом Томагавк, ТН?

Протруювання пшениці та ячменю препаратом Томагавк, ТН дозволяє уникнути розповсюдження грибних хвороб через інфіковане насіння, отримати дружні сходи та підвищити стійкість рослин до ураження хворобами. Застосування препарату Томагавк, ТН забезпечує зменшення кількості обробок посівів фунгіцидами або повністю виключає їх.

Чи можливе сумісне використання препарату Томагавк, ТН з іншими пестицидами і агрохімікатами та за яких умов?

Препарат можна застосовувати у суміші із інсектицидами, стимуляторами росту та мікродобривами. При змішуванні протруйника з іншими компонентами необхідно пам'ятати, що рН робочого розчину повинна становити від 5,0 до 8,0.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: від +1°C до +30°C

Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
Від +2°C	До норми витрати препарату на 1 т насіння додати 5-10 л води



Фузаріозна коренева гниль



Гельмінтоспоріозна коренева гниль




Сітчаста плямистість ячменю



Летюча сажка пшениці



Борошниста роса ячменю



Борошниста роса пшениці



Тверда сажка



Протруйники насіння

Standard
Стандартна серія

Форсаж[®], КС

СИСТЕМНИЙ ФУНГІЦИДНИЙ ПРОТРУЙНИК ЗАХИСНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
карбендазим, 500 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:
10 л пластика каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Захист насіння, проростків та рослин від широкого спектру хвороб
- Дружність та однорідність сходів протруєного насіння
- Довготривала дія

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Фунгіцидний протруйник Форсаж, КС з діючою речовиною карбендазим забезпечує високу ефективність в обмеженні розвитку широкого спектру хвороб рослин, які передаються через насіння та ґрунт. Системні властивості діючої речовини активно обмежують розвиток збудників сажкових хвороб, пліснявіння та загнивання сходів, корневих гнилей.

ФОРСАЖ, КС ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТАКИХ КУЛЬТУР:

Культура	Спосіб та строки застосування	Збудники хвороб	Норми витрати, л/т насіння
Пшениця та ячмінь	Протруювання насіння до висівання	Кореневі гнилі, снігова пліснява, сажкові хвороби	1,0-1,2
Соняшник		Сіра та біла гнилі, фомоз, пліснявіння	0,8



Біла гниль соняшнику



Фузаріозна коренева гниль



Летюча сажка ячменю



Сіра гниль соняшнику



Борошниста роса пшениці



Снігова пліснява

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ФОРСАЖ, КС:

Проти яких збудників хвороб даний протруйник має найвищу ефективність?

Протруйник Форсаж, КС відзначається виключно високою ефективністю проти збудників снігової плісняви та корневих гнилей зернових колосових, сірої та білої гнилі, фомозу соняшнику.

Чи можна застосовувати Форсаж, КС з іншими препаратами?

Під час обробки насіння протруйник можна застосовувати сумісно або послідовно з іншими препаратами інсектицидної та стимулюючої дії.

Коли доцільно протруювати насіння препаратом?

Насіння краще інкрустувати препаратом до висівання. Проте оброблене насіння може тривалий час зберігатися без зниження насінневих якостей.

Від чого залежить якість обробки насіння?

Якість протруювання препаратом залежить від низки факторів, а саме: насінневий матеріал перед протруюванням має бути відкалібрований і очищений від домішок. Важливо перед протруюванням правильно приготувати робочий розчин та відрегулювати протруювач.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +30°C

Іконка	Оптимальні температурні умови застосування	Іконка	Приготування робочого розчину
	Від +2°C		До норми витрати препарату на 1 т насіння додати води, довівши кількість робочого розчину до 10 л

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Спосіб та строки застосування	Збудники хвороб	Норми витрати, л/т насіння
Жито, Овес	Протруювання насіння до висівання	Фузаріозно-гельмінтоспоріозна коренева гниль, снігова пліснява, сажкові хвороби	1,5
Картопля	Обприскування бульб до висадки	Суша гниль (фузаріозна), ризоктоніоз	0,08-0,12

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

Форсаж, КС (0,5 л/т) + Кольчуга Плюс, ТН (0,2 л/т)



Протруйники насіння

Professional
Професійна серія
Аболір®, РГ

**СИСТЕМНИЙ ГЕРБИЦИД
З ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ДІЇ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

гліфосат, у вигляді амонійної солі, 757 г/кг у кислотному еквіваленті, 687 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:

розчинні гранули

УПАКУВАННЯ:

10 кг фольгований пакет

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Швидке знищення бур'янів (однорічні – 12 годин, багаторічні – 5 днів)
- Найнижча норма застосування
- Опади не знижують ефективність дії препарату через годину після застосування
- Відмінна розчинність
- Найбільш досконала формула діючої речовини
- Висока ефективність за несприятливих погодних умов

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина – гліфосат є інгібітором ферментативної системи, яка відповідає за синтез ароматичних амінокислот. Гліфосат проникає у рослину через надземну її частину та активно розноситься по всіх органах, у тому числі і у коріння. Бур'яни гинуть за рахунок поліпшеної формуляції вже через 8-10 діб. Перші ознаки гербіцидного ефекту з'являються через 7 днів, спочатку у вигляді пожовтіння, потім в'янення листя. Препарат є ефективним у широкому діапазоні концентрації природних катіонів кальцію і магнію у воді.

ГЕРБИЦИД АБОЛІР, РГ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ СУЦІЛЬНОГО ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ НА СЛІДУЮЧИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб, час обробки, обмеження	Норми витрати, кг/га	Максимальна кратність обробок
Пари	Однорічні і багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів	1,5-2,0	1
Поля призначені під посів ярих зернових та олійних культур		Обприскування вегетуючих бур'янів восени, після збирання попередника або навесні, за 2 тижні до висівання	1,5-2,0	
Землі несільськогосподарського призначення (смуги відчуження, лінії електропередач, газота нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)		Обприскування вегетуючих бур'янів	1,5-2,0	



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АБОЛІР, РГ:

Як правильно приготувати робочий розчин гербіциду Аболір, РГ?

З необхідної кількості препарату спочатку готують маточний розчин в заповненому на 1/3 баку обприскувача. Через 15 хвилин долити водою до повного об'єму бака.

Як встановити норму витрати препарату?

Норма витрати препарату встановлюється за результатами обстеження на виявлення чисельності, видового складу та встановлення стадії росту і розвитку бур'янів. При проведенні боротьби з однорічними односім'ядольними та двосім'ядольними бур'янами норму витрати встановлюють в залежності від висоти рослин.

З метою знищення багаторічних бур'янів норма витрати встановлюється мінімальною, в період відростання бур'янів, максимальною в більш пізній фазі росту і розвитку рослин. Для боротьби з березкою польовою норму витрати встановлюють максимальну.

Чи залежить ефективність обробки від жорсткості води?

Завдяки досконалій формулі гербіцид Аболір, РГ добре працює навіть у жорсткій воді, та не потребує додавання у бакову суміш спеціальних компонентів для її пом'якшення.

Як впливають на дію гербіциду складні погодні умови?

За дощової погоди опади майже не знижують гербіцидний ефект вже через годину після внесення препарату. Також як посушлива так і холодна погода істотно не позначаються на його ефективності.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (високотійкий у воді). Нетоксичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		50-300 л/га
	Погодні умови в період застосування		
	Не проводити внесення при швидкості вітру понад 3-4 м/с		

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Аболір, РГ (1,0-1,5 кг/га) + Ультра Плюс, КЕ (0,5-0,6 л/га)

Гербіциди

Professional Професійна серія Апач®, ВГ

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ І БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ ТА ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ В ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ (БЕРЕЗКА ПОЛЬОВА, ОСОТИ, АМБРОЗІЯ, ГІРЧАКИ ТА ІНШІ)



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

дикамба натрієва сіль, 468 г/кг + римсульфурон, 25 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:

гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ:

2,5 кг фольгований пакет (25 пакетиків по 100 г)

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Широкий спектр дії та контроль проблемних бур'янів (пірю, гумаю, осотів, березки, амброзії)
- Швидко проникнення у рослину
- Без післядії
- Відсутність резистентності у бур'янів

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Гербіцид Апач, ВГ містить у своєму складі діючі речовини різних класів – сульфонілсечовину (римсульфурон) та похідне синтетичних ауксинів (дикамбу). Римсульфурон потрапляє у рослини через листя, стебла та корені та припиняє поділ клітин, ріст пагонів та коренів. Дикамба поглинається листками та корінням рослин і швидко діє як інгібітор росту. Ефективність дії препарату пов'язана з синергізмом діючих речовин.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ АПАЧ, ВГ:

Злакові бур'яни: гумаю, пірю повзучий, віслюг пустий, тимофіївка (види), плоскуха звичайна, мишій (види), просо (види), пажитниця багатоквітова, пальчатка кровоспиняюча, сорго двоколірне, лисохвіст мишачохвостиковий.

Двосім'ядольні бур'яни: амброзія полинолиста, березка польова, будяк польовий, галінсога дрібноквітова, гірчиця польова, гірчак (види), грицики звичайні, дурман звичайний, дворятник тонколистий, жовтозілля звичайне, зірочник середній, калачики (види), кропива (види), лобода (види), мак дикий, м'ята польова, молочай (види), нетреба (види), осот (види), паслін чорний, підмаренник чіпкий, переліска однорічна, полин звичайний, редька дика, реп'ях (види), ріпиця зморшкувата, ромашка (види), руслиця попідтинна, рутка лікарська, соняшник однорічний, фіалка польова, щавель (види), щиріця (види).

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати, кг/га	Час обробок, обмеження
Кукурудза	Однорічні і багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	0,4-0,5 кг/га +0,2 л/га ПАР Флокс, РК	У фазі 3-5 листків культури



УВАГА! Гербіцид АПАЧ, ВГ слід застосовувати з додаванням поверхневоактивної речовини (наприклад, ПАР ФЛОКС, РК, із розрахунку 100 мл на 100 л робочого розчину)



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Забороняється:

- використання препарату при температурі нижче +15°C і вище +25°C;
- застосовувати гербіцид у посівах цукрової та розлусної кукурудзи, а також на батьківських лініях гібридів у зв'язку з недостатньою резистентністю культури;
- застосування Апач, ВГ на полях кукурудзи протягом 7 днів до чи після обробки фосфорорганічними інсектицидами;
- проводити обробку, якщо культура сильно уражена хворобами, пошкоджена шкідниками, знаходиться під впливом значної посухи та спеки;
- проводити обробку під час або незабаром після випадання роси чи дощу.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АПАЧ, ВГ:

Термін застосування.

Рекомендується застосування препарату у фазу розвитку культури 2-6 листків. Бур'яни найбільш чутливі до гербіциду під час проростання та на ранніх фазах розвитку (2-4 листка).

Які рекомендації щодо приготування бакових сумішей препарату Апач, ВГ з іншими пестицидами?

Препарат сумісний з більшістю пестицидів та рідких добрив. Перед приготуванням бакових сумішей доцільно перевірити оцінку їх сумісності. При використанні бакових сумішей гербіциду Апач, ВГ з іншими гербіцидами спочатку з необхідної кількості гербіциду готують маточний розчин, який додають при ввімкненому режимі розмішування у заповнений на 1/3 водою бак обприскувача, потім додають інші продукти, потім – карбамід (у разі потреби) і в останню чергу ПАР.

Не рекомендується сумісне застосування з фосфорорганічними інсектицидами.

Чи можливе виникнення резистентності з боку бур'янів при використанні препарату?

Наявність у складі препарату двох діючих речовин з різних хімічних груп повністю виключають виникнення резистентності та значно розширюють спектр чутливих бур'янів.

Як впливають погодні умови на ефективність роботи препарату?

Волога та тепла погода підсилює активність гербіциду, у той час як довготривалий посушливий період та відносно низька температура повітря знижують його активність. Дощ, який випадає через 3 години після внесення препарату Апач, ВГ не знижує його ефективність, оскільки за цей час гербіцид повністю проникає у рослину.

Рекомендації по використанню у посушливих умовах:

- збільшити норму витрати робочого розчину до 300 л/га;
- збільшити норму ПАР Флокс, РК (від 0,3 л/га);
- додати у бакову суміш карбамід (3-5 кг/100 л робочого розчину);
- вносити препарат у вечірній та нічний час.

Для підвищення ефективності

Якщо посіви зріджені, за високої чисельності та наявності стійких бур'янів, а також в жарку, суху погоду, слід обов'язково використовувати поверхнево-активну речовину Флокс, РК, що покращує змочування бур'янів робочим розчином і, таким чином, покращує гербіцидний ефект.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

III клас небезпечності (малотоксичний). Малотоксичний для теплокровних, риб та птахів. Нетоксичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від -10°C до +35°C

Іконка	Оптимальні температурні умови застосування		Іконка	Приготування робочого розчину	
	Від +15°C до +25°C			200-400 л/га. В разі високого рівня забур'яненості потрібно застосовувати максимальну норму витрати робочого розчину	
Погодні умови в період застосування					
Забороняється проводити обробку, якщо культури мокрі від роси чи дощу. Не проводити обробку, якщо культури сильно уражені хворобами, пошкоджені шкідниками, знаходяться під впливом значної посухи та спеки					





Standard
Стандартна серія

Вулкан® Плюс, РК

ГЕРБІЦИД СУЦІЛЬНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПОВНОГО ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ ТА ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

гліфосат у формі ізопропіламіної солі, 480 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:

20 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Легкий шлях до чистого поля
- Низький рівень піноутворення
- Зменшена чутливість до рівня жорсткості води
- Можливість авіаційних внесень

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина гліфосат є інгібітором ферментативної системи, яка відповідає за синтез необхідних для життєдіяльності рослин ароматичних амінокислот. Гліфосат поглинається надземною частиною рослин та активно розноситься по всіх органах, у тому числі і в коріння. Перші ознаки гербіцидного ефекту з'являються через 2-4 дні, спочатку у вигляді пожовтіння, потім - в'янення листя.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ВУЛКАН ПЛЮС, РК:

Здатний повністю знищувати однорічні і багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни.

ГЕРБІЦИД ВУЛКАН ПЛЮС, РК ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ СУЦІЛЬНОГО ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати препарату, л/га		Максимальна кратність обробок
		наземним устаткуванням	авіацією (літаки АН-2)	
Пари	Однорічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	2,0-4,0	6,0	1
	Багаторічні бур'яни	4,0-6,0		
Поля, призначені під посіви ярих зернових	Однорічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	2,0-4,0		
	Багаторічні бур'яни	4,0-6,0		
Землі несільськогосподарського призначення (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)	Однорічні та багаторічні рослини	3,0-6,0		

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДУ ВУЛКАН ПЛЮС, РК:

Як правильно встановити норму витрати препарату?

Норма витрати препарату встановлюється залежно від видового складу бур'янів, їх фізіологічного стану, прогнозованої ефективності гербіцидної обробки та погодно-кліматичних умов проведення обприскування. Мінімальні норми витрати використовуються при домінуванні чутливих видів бур'янів.

Коли саме слід застосовувати препарат восени чи навесні?

Гербіцид Вулкан Плюс, РК застосовують восени після збирання попередника до проведення основної обробки ґрунту та навесні на полях, призначених під сівбу ярих культур, за 14 діб до проведення передпосівної культивування.

Яким чином можна досягти максимальної ефективності від застосування препарату?

Найбільший гербіцидний ефект від застосування препарату досягається за умов теплої погоди. Обов'язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і ясне змочування рослин під час внесення препарату.

Коли бур'яни найчутливіші до гербіциду?

До препарату найчутливіші однорічні бур'яни в період їх активного росту і розвитку, багаторічні - у період відростання та активного росту.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний). Нетоксичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +15°C до +25°C		при наземному застосуванні – 200-400 л/га при авіаційному – 50 л/га
Погодні умови в період застосування			
	Умовою ефективною дії Вулкан Плюс, РК є відсутність опадів після внесення препарату протягом 3 годин. Препарат доцільно застосовувати у вечірні години або вранці		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Спосіб внесення	Бур'яни	Норма внесення, л/га	Максимальна кратність обробок
Плодові та виноградники	Направлене обприскування вегетуючих бур'янів весною або влітку	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	2,0-4,0	1
		Багаторічні злакові та дводольні бур'яни	4,0-8,0	
Картопля	Обприскування до сходів культури	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0	
Лісове господарство	Обприскування вегетуючих бур'янів при підготовці поля під хвойні та листяні породи		2,0-4,0	

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для обприскування вегетуючих бур'янів на полях, призначених під посіви соняшнику, ріпаку, люцерни, багаторічних трав, хмелю, цукрових буряків, овочевих, сої, льону, баштаних культур.

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Вулкан Плюс, РК (3-4 л/га) + Футурин, ВГ (0,15 кг/га)
- Вулкан Плюс, РК (3-4 л/га) + Сулам, СЕ (0,4 л/га)
- Вулкан Плюс, РК (3-4 л/га) + Дікам Плюс, РК (0,5-1,0 л/га)
- Вулкан Плюс, РК (3-4 л/га) + Шквал, КЕ (0,5 л/га)
- Вулкан Плюс, РК (3-4 л/га) + Ультра Плюс, КЕ (0,5-0,6 (0,8) л/га)

Professional Професійна серія Гурон®, ВГ

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ ПРОТИ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

тифенсульфурон-метил, 375 г/кг + трибенурон-метил, 375 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:

гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ:

1 кг фольгований пакет (10 пакетиків по 100 г)

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Широке вікно застосування (до прапорцевого листка)
- Ефект дії від +10°C до +25°C
- Відсутність післядії

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Гербицид Гурон, ВГ є комбінованим препаратом, який поєднує дві високоефективні діючі речовини: тифенсульфурон-метил та трибенурон-метил. Завдяки цьому препарат має розширений спектр дії, добре контролює стійкі бур'яни, виключає виникнення резистентності до гербициду. Препарат проникає у рослини через листя, стебла і корені та потрапляє до точок росту рослини через 3 години після внесення, припиняючи поділ клітин, ріст пагонів та коренів. Симптоми дії з'являються через декілька днів, повний гербицидний ефект настає за 2-3 тижні. Малочутливі та перерослі бур'яни можуть не загинути, проте їх ріст і подальший розвиток значно уповільнюється.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ГУРОН, ВГ:

Чутливі бур'яни	Середньочутливі бур'яни	Малочутливі бур'яни
<ul style="list-style-type: none"> • амброзія полинолиста (фаза сім'ядоль – 2 справжніх листка) • біофора промениста • волошка синя • гірчиця польова • гірчак (види) • горошок (види) • гризички звичайні • дворядник (види) • жабрій (види) • жовтець польовий • жовтозілля (види) • зірончик середній • кропива (види) • куколиця біла • кучерявець (види) • лобода біла (до 2 справжніх листочків) 	<ul style="list-style-type: none"> • лутига розлога • мак дикий • морква дика • м'ята польова • незабудка польова • осот польовий • петрушка собача • підмаренник чіпкий • редька дика • ріпак (падалиця) • роман польовий • ромашка (види) • соняшник падалиця) • сухоребрик лікарський • талабан польовий • шпергель звичайний • щавель (види) • щиріця звичайна • фіалка польова 	<ul style="list-style-type: none"> • вероніка (види) • герань (види) • горобейник польовий • королиця (види) • лобода (види) до 6 лист • череда трироздільна

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербицидів"

ГУРОН, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, г/га	Строк обробки
Пшениця озима, ячмінь озимий	30-40	Обприскування посівів, починаючи з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка культури включно



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ГУРОН, ВГ:

Терміни застосування та норми.

Найбільшу ефективність препарат має на початкових (3-6 листків для однорічних, фаза розетки – для багаторічних) стадіях розвитку бур'янів.

Найкращий ефект проти зимуючих та весняних сходів підмаренника чіпкого досягається при застосуванні препарату у фазу 2-3 кільця.

Максимальна норма препарату Гурон, ВГ, доцільна при високому ступені забур'яненості (більше 50 бур'янів на 1м²) та проти підмаренника чіпкого (зимуюча форма).

Бакові суміші.

Препарат сумісний з більшістю пестицидів та рідких добрив. Перед приготуванням бакових сумішей доцільно перевірити оцінку їх сумісності. Не рекомендується сумісне застосування з фосфорорганічними інсектицидами.

Для підвищення ефективності.

Якщо посіви зріджені, за високої чисельності та наявності стійких бур'янів, а також в жарку, суху погоду, слід обов'язково використовувати поверхнево-активну речовину Флокс, РК, що покращує змочування бур'янів робочим розчином і, таким чином, покращує гербицидний ефект.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Не рекомендується:



- застосування препарату Гурон, ВГ протягом 14 днів до чи після обробки фосфорорганічними інсектицидами;
- проводити обробку, якщо культура знаходиться у стресовому стані (дія хвороб, шкідників, посухи та спеки).

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний). Малотоксичний для теплокровних, риб та птахів. Нетоксичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від -10°C до +35°C

Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
<p>Від +12°C до +25°C. Забороняється використання препарату при температурі нижче +10°C і вище +25°C</p>	<p>200-400 л/га. У разі високого рівня забур'яненості потрібно застосовувати максимальну норму витрати робочого розчину</p>
<p>Погодні умови в період застосування Гербицид необхідно застосовувати у суху погоду. Умовою ефективною дії препарату є відсутність опадів після обприскування протягом 3 годин. Не проводити обробку, якщо культура мокра від роси чи дощу</p>	



Professional
Професійна серія

Деліт[®], РК

НЕСЕЛЕКТИВНИЙ ПІСЛЯСХОДОВИЙ ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ БУР'ЯНІВ. ДЕСИКАНТ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

гліфосату калійна сіль, 613 г/л,
у кислотному еквіваленті, 500 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:

20 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Висококонцентрована препаративна форма
- Менша норма застосування
- Містить прилипач нового покоління
- Краще проникнення в рослину
- Швидша дія за рахунок більш рухомої діючої речовини
- Знищення багаторічних бур'янів з коренем

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина гліфосат є інгібітором ферменту (EPSPS), який відповідає за синтез необхідних для життєдіяльності рослин ароматичних амінокислот. Препарат дифузно проникає через листову поверхню і розподіляється по всій рослині, включаючи кореневища, при контакті з ґрунтом розкладається на нетоксичні сполуки. Перші ознаки гербіцидного ефекту з'являються через 2-3 дні, спочатку у вигляді пожовтіння, потім в'янення листя. Завдяки вмісту у препараті гліфосату в калійній формі стало можливим підвищити концентрацію діючої речовини та знизити норму витрати у порівнянні з традиційними формами гліфосату (наприклад ізопропіламіної).

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ДЕЛІТ, РК:

Має здатність знищувати як однорічні так і багаторічні рослини в залежності від норми внесення.

ГЕРБІЦИД ДЕЛІТ, РК ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ СУЦІЛЬНОГО ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ДЕСИКАНТУ НА НАСТУПНИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кратність обробок
Пари	Однорічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	2,0	1
	Багаторічні бур'яни	4,0	
Поля призначені під посіви ярих зернових	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0-4,0	
Землі несільськогосподарського призначення (смуги відчуження, лінії електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,4-4,0	



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДУ ДЕЛІТ, РК:

Як правильно встановити норму витрати препарату?

Норма витрати залежить від видового складу бур'янів, віку рослин. При переважній кількості однорічних бур'янів можна застосовувати мінімальні норми препарату. При сильному забур'яненні земель багаторічними бур'янами, особливо такими як ваточник сирійський, хвощ польовий слід використовувати максимальні норми препарату в суміші з іншими протидодольними гербіцидами, наприклад з Сулам, СЕ та Футурин, ВГ.

Для підсилення дії проти перерослих бур'янів та застосування в засушливих умовах в бакову суміш необхідно додавати аміачну селітру або сечовину.

Коли краще застосовувати препарат?

Застосовувати гербіцид Деліт, РК для очищення земель від багаторічних бур'янів краще восени, так як сокорух рослин переважно має низхідний напрямок, що дозволяє ефективніше знищити кореневу систему рослини.

Коли бур'яни найбільш чутливі до дії гербіциду?

Однорічні бур'яни найбільш чутливі у фазу активного розвитку, багаторічні - у період відростання та активного росту.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний). Не токсичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +15°C до +25°C		100-200 л/га
Погодні умови в період застосування			
	Ефективною умовою застосування препарату Деліт, РК є відсутність опадів протягом 3 годин після внесення. Препарат доцільно вносити у вечірні години або вранці, але до випадання роси		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Спосіб внесення	Бур'яни	Норма внесення, л/га	Максимальна кратність обробок
Картопля	Обприскування до сходів культури	Однорічні бур'яни	1,5	1
		Багаторічні бур'яни	3	
Плодові та виноградники	Направлене обприскування вегетуючих бур'янів	Однорічні бур'яни	1,5	
		Багаторічні бур'яни	3	
Лісове господарство	Обприскування вегетуючих бур'янів при підготовці поля під хвойні та листяні породи	Однорічні та багаторічні бур'яни	2-3	

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для обприскування вегетуючих бур'янів на полях, призначених під посіви соняшнику, ріпаку, люцерни, багаторічних трав, хмелю, цукрових буряків, овочевих, сої, льону, баштаних культур та для десикації кукурудзи.

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Деліт, РК (3 л/га) + Футурин, ВГ (0,15 кг/га)
- Деліт, РК (2-3 л/га) + Шквал, КЕ (0,5 л/га)





Standard
Стандартна серія

Дікам Плюс®, РК

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ
ЗАСТОСУВАННЯ В ПОСІВАХ ЗЕРНОВИХ
КОЛОСОВИХ ТА КУКУРУДЗИ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

2,4-Д (2,4-дихлорфеноксицтова кислота) у формі диметиламіної солі, 344 г/л + дикамба у формі диметиламіної солі, 120 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:

10л, 20 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Знищення широкого спектру двосім'ядольних бур'янів
- Висока швидкість дії
- Ефективність проти підмаренника чіпкого, осотів та березки польової
- Проти бур'янів, стійких до 2,4-Д та МЦПА

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Препарат Дікам Плюс, РК – системний гербіцид для знищення двосім'ядольних бур'янів у посівах пшениці, ячменю та кукурудзи. Вдало підібрані речовини з гербіцидними властивостями (2,4-Д та дикамба) та їх співвідношення в препаративній формі забезпечують неперевершений ефект у боротьбі з бур'янами, навіть зі стійкими до дії гербіцидів на основі 2,4-Д та 2М-4Х. Діючі речовини належать до синтетичних ауксинів, проникають у рослини через тканини надземних органів та коренів. Діють як інгібітори росту.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ДІКАМ ПЛЮС, РК:

Чутливі бур'яни	Середньочутливі бур'яни	Малочутливі бур'яни
<ul style="list-style-type: none"> • амброзія полинолиста • волошка синя • галінсога (види) • гірчиця польова • грицики звичайні • зірочник середній • кучерявець Софії • лобода (види) • лутига (види) 	<ul style="list-style-type: none"> • підмаренник чіпкий • полин звичайний • редька дика • рутка лікарська • спориш звичайний • талабан польовий • хрінниця крупковидна • шпергель звичайний • щавель горобиний 	<ul style="list-style-type: none"> • березка польова • гірчак (види) • дурман звичайний • жабрій (види) • осот жовтий польовий • осот рожевий • осот щетинистий • паслін чорний • ромашка не пахуча • щиріця (види)
		• вероніка (види)

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербіцидів"

ГЕРБІЦИД ДІКАМ ПЛЮС, РК ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Спосіб внесення	Шкідливі об'єкти	Норма внесення, л/га
Пшениця	Обприскування посівів навесні від фази кущення до виходу в трубку культури	Однорічні та багаторічні двосім'ядольні, у тому числі стійкі до препаратів на основі тільки 2,4-Д та 2М-4Х кислот	0,8
Ячмінь			0,5-0,7
Кукурудза	Обприскування посівів у фазі 3-5 листків		1,5

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ДІКАМ ПЛЮС, РК:

В якій фазі розвитку рослин потрібно використовувати Дікам Плюс, РК?

У посівах пшениці, ячменю препарат застосовується одноразово від фази кущення до виходу в трубку рослин, кукурудза обробляється одноразово у фазі рослин 3-5 листків.

Як досягти максимальної ефективності від обробки гербіцидом Дікам Плюс, РК?

Найвищий рівень ефективності (80-90%) гербіцидної дії досягається у разі обробки посівів у ранні фази розвитку (2-4 листки) бур'янів. Слід пам'ятати, що при застосуванні препарату в більш пізні фази розвитку бур'янів, особливо проти видів гірчаків, ромашки непахучої, зірочника середнього, підмаренника чіпкого, ефективність гербіциду істотно зменшується.

Яку норму витрати препарату слід встановити при використанні в посівах ячменю?

Норму витрати на ячмені слід встановлювати з урахуванням чисельності бур'янів та стану посівів культурних рослин. При невисокій чисельності тільки чутливих бур'янів (до 10 шт./м²) та при добре розвинутих культурних рослинах в посівах препарат доцільно використовувати з нормою витрати 0,5 л/га, у разі високої чисельності (більше 50 шт./м²) бур'янів – 0,7-0,8 л/га.

Чи можна використовувати Дікам Плюс, РК в бакових сумішах з іншими гербіцидами?

Препарат Дікам Плюс, РК сумісний з багатьма гербіцидами, його можна використовувати в бакових сумішах для підвищення рівня рентабельності гербіцидної обробки в посівах пшениці, ячменю та кукурудзи.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +30 °C

Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
Від +15°C до +25°C	200-400 л/га
Погодні умови в період застосування	
Обприскування доцільно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с	

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТИВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Спосіб внесення	Бур'яни	Норма внесення, л/га	Максимальна кратність обробок
Жито	Обприскування посівів навесні від фази кущення до виходу в трубку культури	Однорічні та багаторічні двосім'ядольні	0,6-0,8	1
Овес			0,5-0,7	

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Пшениця, ячмінь: Дікам Плюс, РК (0,5-0,6 л/га) + Меркурій, ВГ (0,015 кг/га)
- Кукурудза: Дікам Плюс, РК (1,0-1,2 л/га) + Крейсер, ВГ (0,04 кг/га)
- Пари, обробка до та після сівби: Дікам Плюс, РК (0,5-1,0 л/га) + Вулкан Плюс, РК (3-4 л/га)





Standard
Стандартна серія

Екстрем[®], КЕ

ГЕРБІЦИД ҐРУНТОВИЙ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ, СОНЯШНИКУ ТА СОЇ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
ацетохлор, 900 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Містить антидот
- Ефективно контролює бур'яни
- Дозволяє зменшити кількість механічних обробок ґрунту

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина ацетохлор ґрунтового гербіциду Екстрем, КЕ відзначається високою гербіцидною активністю щодо однорічних злакових та деяких двосім'ядольних бур'янів. Ацетохлор діє на проростаючі бур'яни, проникає у тканини шийцець і коренів, активно гальмує ріст і поділ клітин, порушує в них білковий та ліпідний обмін. Порушення обміну речовин у рослинах бур'янів, спричинене ацетохлором, є незворотнім процесом, в результаті чого проростки зупиняють ріст та гинуть.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ЕКСТРЕМ, КЕ:

Чутливі бур'яни	Середньочутливі бур'яни	Малочутливі бур'яни
<ul style="list-style-type: none"> • галінсога дрібноквіткова • грицики звичайні • лобода біла • мишій зелений • мишій сизий • плоскуха звичайна 	<ul style="list-style-type: none"> • зірочник середній • паслін чорний • суріпиця звичайна • талабан польовий • щиряця звичайна 	<ul style="list-style-type: none"> • амброзія полинолиста • березка польова • будяк польовий • вівсюг звичайний • гірчак широколистяний • гірчиця польова • гумай • нетреба звичайна • підмаренник чіпкий • ромашка

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербіцидів"

ГЕРБІЦИД ЕКСТРЕМ, КЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Спосіб внесення	Шкідливі об'єкти	Норма внесення, л/га
Кукурудза, соняшник, соя	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури	Однорічні злакові та двосім'ядольні, а також проростки багаторічних бур'янів з насіння	1,5-3,0
Землі несільськогосподарського призначення (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)	Обприскування ґрунту до появи сходів бур'янів. Забороняється випасання худоби та заготівля сіна у зоні 300 м від оброблених територій протягом 15 діб. Забороняється обробка земель несільськогосподарського використання на відстані менше 300 м від місць постійного перебування людей.		3,0



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЕКСТРЕМ, КЕ:

Які технологічні вимоги існують при підготовці ґрунту перед внесенням гербіциду?

На прояв гербіцидного ефекту впливає стан ґрунту перед внесенням гербіциду, а саме: ґрунт має бути оброблений згідно з рекомендаціями і бути перед внесенням дрібногрудкуватим, з ретельно подрібненими рослинними рештками.

Чи необхідна заробка гербіциду в ґрунт після його внесення?

Після внесення гербіцид доцільно відразу заробити середніми або легкими бородами.

Від чого залежить норма витрати препарату Екстрем, КЕ?

Норма витрати препарату встановлюється залежно від типу ґрунтів та їх механічного складу. На малогумусних, легких за механічним складом ґрунтах норма витрати становить 1,5-2,0 л/га, на суглинкових ґрунтах із вмістом гумусу менше 4% – 2,0-2,5 л/га, а на важких суглинкових ґрунтах із вмістом гумусу 4-5% та торф'яниках – 2,5-3,0 л/га.

Як застосовувати гербіцид в умовах недостатнього зволоження ґрунту?

В умовах посухи для посилення гербіцидного ефекту гербіцид доцільно вносити під передпосівну культивування на глибину 5 см. Якщо препарат вноситься після сівби, то після заробки гербіциду бородами необхідно провести коткування для ущільнення ґрунту.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

II клас (малотоксичний), помірнонебезпечний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

4 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування
	Оптимальні умови для внесення – після дощу або зрошення за нормою 10-20 мм		Обприскування доцільно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Екстрем, КЕ (2,0 л/га) + Рейтар, КС (2,0 л/га)



Галінсога шафранна



Мишій зелений



Щиряця запрокинута



Professional Професійна серія Еліот[®], МД

NEW



**ПІСЛЯСХОДОВИЙ СИСТЕМНИЙ ГЕРБИЦИД
З ҐРУНТОВОЮ ДІЄЮ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ
ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ
ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ ТА ЗЛАКОВИХ БУР'ЯНІВ
У ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

мезотріон, 75 г/л + нікосульфурон, 30 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

масляна дисперсія

УПАКУВАННЯ:

20 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Контроль однорічних та багаторічних двосім'ядольних і злакових бур'янів протягом сезону
- Найширше вікно застосування – від 2 до 8 листків
- Високоєфективний проти злісних багаторічних бур'янів
- Добре контролює перерослі бур'яни
- Не фітотоксичний для культури

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Мезотріон – гербіцид, що належить до хімічної групи трикетонів, є інгібітором синтезу каротиноїдів; нікосульфурон – з хімічної групи сульфонілсечовин, припиняє поділ клітин в точках росту. Діючі речовини проникають в середину рослин бур'янів через листя та поширюються як акропетально, так і базіпетально. Препарат, що потрапив в ґрунт, абсорбується корінням та проростками. Результатом синергічної дії складових гербіциду є припинення росту чутливих бур'янів через 1-2 дні та наступна їх загибель.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБИЦИДУ ЕЛІОТ, МД:

Вівсюг звичайний, гірчиця (види), грицики звичайні, зірочник середній, просо куряче, мишій (види), пальчатка (види), пирій повзучий, портулак городній, просо (види), редька дика, роман польовий, ромашка (види), щиріця (види), амброзія (види), гірчак (види), кропива глуха пурпурова, курячий цвіт польовий, осот городній, підмаренник чіпкий, переліска однорічна, чистець (види), шпегель звичайний, канатник Теофраста, лобода розлога, лобода біла, дурман звичайний, галінсога дрібноквіткова, падалиця соняшнику (звичайного, ІМІ- і сульфостійкого), паслін чорний, нетреба звичайна, ваточник сирійський.

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБИЦИДУ ЕЛІОТ, МД:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб і строки застосування
Кукурудза	Однорічні і багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	1,25-2,0	Обприскування посівів від 2 до 8 листків у культурі включно, на ранніх фазах росту бур'янів (2-6 листків у однорічних бур'янів та за висоти 10-20 см у багаторічних злакових бур'янів)

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБИЦИДУ ЕЛІОТ, МД:

Як визначити необхідну норму застосування гербіциду?

Якщо на полі переважає однорічний тип забур'яненості на ранніх етапах розвитку бур'янів, оптимальна норма застосування становитиме 1,4-1,5 л/га. У випадку, якщо переважають багаторічні бур'яни, або при внесенні після появи 5-го листка у кукурудзи, коли більшість однорічних бур'янів переросла, норма повинна бути збільшена до 1,75-2,0 л/га. Оптимальний термін обприскування посівів – фаза 3-5 листків у кукурудзи, коли бур'яни знаходяться в фазі 2-4 справжніх листків, осоти – розвинена розетка, при висоті пір'ю повзучого 15 см.

Як проявляється ґрунтова дія препарату?

За рахунок ґрунтової дії препарат може контролювати появу деяких двосім'ядольних бур'янів за наявності вологи в ґрунті.

Як швидко діє препарат?

70-80% препарату проникає в рослину протягом 24 годин та викликає зупинку росту бур'янів протягом 1-2 днів. Перші симптоми дії гербіциду – знебарвлення точок росту, згодом хлороз поширюється на всю рослину та відбувається некроз тканин. Повна загибель настає на протяжні 1-3 тижнів, в залежності від виду бур'янів та їх фізіологічного стану на момент обробки.

Який захисний період препарату?

Мінімальний захисний період препарату становить 20 днів.

Чи може гербіцид викликати фітотоксичність у рослин кукурудзи?

За певних стресових умов (холодна і волога погода, денна температура нижче +20° С, різкі перепади денної і нічної температур) після обробки препаратом на листках культури може проявитися короткочасний хлороз, в основному в середній частині листка. В таких умовах у рослин кукурудзи відбувається уповільнення метаболізму, і селективні діючі речовини нерівномірно розподіляються по рослині. Однак ці симптоми швидко проходять без негативного впливу на ріст і врожайність культури. За нормальних умов гербіцид швидко розкладається та виводиться рослинами кукурудзи. Більшість дослідів доводять підвищення врожайності зерна та зеленої маси кукурудзи після застосування гербіциду.

Обмеження в сівозміні:

При необхідності пересіву в рік застосування можна висівати тільки кукурудзу. Не рекомендується висівати на наступний рік цукрові буряки, столові й кормові буряки, бобові культури, томати і гречку. Соняшник, сою та ріпак в сівозміні рекомендується висівати після оранки.

Сумісність з іншими препаратами:

Завжди перевіряйте препарати на сумісність перед приготуванням бакової суміші.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не рекомендується застосовувати гербіцид на ділянках гібридизації без попереднього тесту на фітотоксичність.

Не застосовуйте препарат в тих випадках, коли проводилася обробка насіння і / або посівів кукурудзи фосфорорганічними інсектицидами.

Не проводьте обробку за рясної роси та в дощову погоду.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: II клас небезпечності.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +0°С до +35°С

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +12°С до +25°С		200-300 л/га
Погодні умови в період застосування			
	Обприскування проводити при швидкості вітру не більше 3-4 м/с		





Standard
Стандартна серія

Ефес[®], РК

ГЕРБИЦИД КОНТАКТНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ПОСІВАХ ГОРОХУ ТА СОЇ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
бентазон, 480 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикава канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Висока швидкість дії
- Тривалий захисний ефект
- Висока селективність до культурних рослин
- Пригнічення бур'янів, стійких до 2,4-Д та 2М-4Х

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Гербицид контактної дії для боротьби з однорічними двосім'ядольними бур'янами, в тому числі стійкими до препаратів на основі 2,4-Д та 2М-4Х кислот в посівах гороху та сої. Бентазон призводить до порушення функціонування другої фотосинтетичної системи з подальшим припиненням розвитку і поділу клітин.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБИЦИДУ ЕФЕС, РК:

Гербицид використовується для пригнічення та знищення широкого спектра двосім'ядольних бур'янів та рослин з родини осикових.

Чутливі бур'яни			Середньочутливі бур'яни
<ul style="list-style-type: none"> • амброзія полинолиста • галінсога дрібноквіткова • гірчиця польова • гречка татарська • дурман звичайний • жабрій 	<ul style="list-style-type: none"> • нетреба звичайна • паслін чорний • підмаренник чіпкий • полин звичайний • портулак городній • редька дика 	<ul style="list-style-type: none"> • роман • ромашка (види) • смикавець круглий • щиряца (види) 	<ul style="list-style-type: none"> • кропива (види) • фіалка польова

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербицидів"

ГЕРБИЦИД ЕФЕС, РК ЗАСТОСУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кратність обробок
Горох (на насіння)	Однорічні двосім'ядольні	Обприскування посівів в фазу 5-6 листків культури	3,0	1
Соя	Однорічні двосім'ядольні	Обприскування посівів в фазу 1-3 справжніх листків культури	1,5-3,0	



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЕФЕС, РК:

Що впливає на ефективність роботи гербициду Ефес, РК?

Ефективність гербицидної обробки залежить від якісного внесення препарату. Тому слід ретельно дотримуватися правил регулювання обладнання для внесення препарату, приготування робочого розчину та організації проведення робіт по застосуванню пестицидів.

У якій фазі культури потрібно застосовувати препарат Ефес, РК?

В посівах гороху препарат застосовується одноразово у фазі 5-6 листків культури. Соя обробляється одноразово у фазі 1-3 справжніх листків культури. При цьому максимальна норма витрати в посівах сої використовується у разі переростання бур'янів (від фази більше 4-х листків для однорічних, фази стеблуння - для багаторічних).

Чи можна використовувати Ефес, РК в бакових сумішах з іншими гербицидами?

З метою підсилення гербицидної дії препарату можливе його використання в сумішах з іншими гербицидами, які застосовують у період вегетації культури. Підбір компонентів в бакових сумішах здійснюється цілеспрямовано, з урахуванням видового складу та чисельності бур'янів в посівах.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Гербицид не рекомендується застосовувати в баковій суміші з протизлаковими препаратами на основі діючої речовини клетодим.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний). Помірно небезпечний для теплокровних, безпечний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРЕГАННЯ:

5 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРЕГАННЯ:

Від +1°C до +30°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +15°C до +25°C Тепла погода підсилює гербицидну дію препарату		200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування
	За умов вологої погоди ефективність внесення препарату зростає, але дощ протягом 3 годин після обприскування може знизити його активність. Негативно впливає на дію препарату довготривалий посушливий період.		Обприскування доцільно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кратність обробок
Пшениця озима та яра, жито, ячмінь, овес	Однорічні двосім'ядольні, у т. ч. стійкі до 2М-4Х та 2,4-Д бур'яни	Обприскування посівів весною у фазі кущення культури	2,0-4,0	1
Просо	Однорічні двосім'ядольні у т. ч. стійкі до 2М-4Х та 2,4-Д бур'яни	Обприскування посівів у фазі 3-х листків культури		
Рис	Бульбоочерет та інші болотні бур'яни	Обприскування посівів у фазі кущення культури		
Кукурудза	Однорічні двосім'ядольні, у т. ч. стійкі до 2М-4Х та 2,4-Д бур'яни	Обприскування посівів у фазі 3-5 листків культури		
Льон-довгунець	Однорічні двосім'ядольні, у т. ч. стійкі до 2М-4Х бур'яни	Обприскування посівів у фазі «ялинки» за висоти культури 3-10 см		
Хміль (віком понад 3 роки)	Однорічні двосім'ядольні бур'яни	Обприскування після 1-го обгортання за висоти бур'янів 10-15 см	4,0	

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту м'яти перцевої, райграсу однорічного, коношини польової 1-го та 2-го років вегетації та насінневих посівів коношини польової, повзучої, гібридної; люцерни 1-го року вегетації (насінишки); ярих зернових (пшениця, ячмінь, овес) з підсівом люцерни або коношини.





Standard
Стандартна серія

Канцлер®, ВГ

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ У ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ, ЯЧМЕНЮ ТА КУКУРУДЗИ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

тифенсульфурон-метил, 750 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:

гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ:

250 г у пластиковій пляшці

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Знищення широкого спектру двосім'ядольних бур'янів
- Широке вікно застосування
- Відсутність обмежень у сівозміні
- Нешкідливий для теплокровних

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина гербіциду проникає у рослини через листя, стебла та корені, поглинається ними і пересувається по рослині через флоему та ксилему і накопичується у точках росту, припиняючи поділ клітин, ріст пагонів та коріння. Наявні симптоми дії препарату (знебарвлення, пожовтіння) з'являються вже через декілька днів, а повний гербіцидний ефект настає за 2-3 тижні. Малочутливі та перерослі бур'яни можуть не загинути, проте їх ріст і подальший розвиток припиняються. Ефективність гербіцидної обробки підвищується при теплій вологій погоді, а при сухій та холодній – уповільнюється.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Не застосовувати Канцлер, ВГ на насінневі кукурудзі.
- Не застосовувати Канцлер, ВГ, якщо температура в ніч перед внесенням була нижче, ніж +6°C, або ж очікувана у день внесення чи у день після обробки вище +25°C.
- Не застосовувати Канцлер, ВГ на полях кукурудзи, що були чи будуть оброблені системними фосфорорганічними інсектицидами протягом 14 днів.
- Застосовуйте Канцлер, ВГ один раз на сезон з нормою витрати не більше 25 г/га.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ КАНЦЛЕР, ВГ:

Який період захисної дії препарату Канцлер, ВГ?

Канцлер, ВГ володіє гербіцидним ефектом по відношенню до двосім'ядольних бур'янів до 30 діб.

Коли треба застосовувати Канцлер, ВГ для досягнення максимальної гербіцидної ефективності?

Слід пам'ятати, що максимальна ефективність препарату досягається при застосуванні його в ранні фази (2-4 листки для однорічних рослин) розвитку бур'янів. При застосуванні препарату в більш пізні строки суттєво затримується тільки ріст та розвиток бур'янів.

Як швидко Канцлер, ВГ може знищити оброблені ним бур'яни?

Ріст чутливих рослин призупиняється через декілька годин, перші ознаки гербіцидного ефекту спостерігаються через 5-10 діб, повна загибель – 15-25 діб.

Чи можна використовувати Канцлер, ВГ у бакових сумішах з іншими гербіцидами?

З метою посилення гербіцидної дії препарату можливе його використання в сумішах з іншими препаратами. Підбір компонентів в бакових сумішах здійснюється цілеспрямовано, з врахуванням видового складу та чисельності бур'янів в посівах. Проте доцільно перед виробничим використанням сумішей гербіцидів провести попередню перевірку сумісності з конкретним препаратом. При використанні у посівах льону не використовувати з грамініцидами та ПАР Флокс, РК – це може викликати фітотоксичність. Не застосовувати після внесення препарату Юпітер, РК у посівах сої.

Для підвищення ефективності

Якщо посіви зріджені, за високої чисельності та наявності стійких бур'янів, а також в жарку, суху погоду, слід обов'язково використовувати поверхнево-активну речовину Флокс, РК, що покращує змочування бур'янів робочим розчином і, таким чином, покращує гербіцидний ефект.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний). Малотоксичний для теплокровних, риб та птахів. Нетоксичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від -10°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +6°C до +25°C		200-400 л/га. В разі високого рівня забур'яненості потрібно враховувати максимальну норму витрати робочої рідини
	Погодні умови в період застосування		
	Гербіцид необхідно застосовувати у суху погоду. Дощ протягом 2-3 годин після застосування може знизити ефективність дії препарату		

Найчутливіші бур'яни	Помірночутливі бур'яни	Стіїкі бур'яни
<ul style="list-style-type: none"> • абутилон Теофраста • вероніка види • вика посівна • гібіскус трійчатий • гірчак види • гірчиця чорна та польова • грицики звичайні • жабрій види • зірочник середній • комеліна види • кропива види • курай • лобода біла • лобода гібридна 	<ul style="list-style-type: none"> • лутига розлога • незабудка польова • нетреба види • портулак городній • приворотень • редька види • роман собачий • ромашка види • рутка лікарська • соняшник однорічний • талабан польовий • фіалка види • щавель (види) • щиріця (види) 	<ul style="list-style-type: none"> • амброзія полинолиста (до 2-х листочків) • мак дикий • осот польовий • підмаренник чіпкий • рутка лікарська • берізка польова • дурман звичайний • паслін чорний

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербіцидів"

ГЕРБІЦИД КАНЦЛЕР, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Строк обробки	Норма витрати препарату, г/га
Пшениця озима	Обприскування посівів, починаючи з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка культури включно	15-20 г/га + ПАР Флокс, РК
Ячмінь ярий	Обприскування посівів, починаючи з фази 2-3 листків до виходу в трубку культури	10-15 г/га + ПАР Флокс, РК
Кукурудза	У фазі 3-7 листків кукурудзи	10 г/га + ПАР Флокс, РК або 15 г/га без ПАР Флокс, РК



СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Строк обробки	Норма витрати препарату, г/га
Соя	Після розкриття першого трійчастого листка до початку бутонізації культури, бур'яни: у фазі 2-4 листки, капустяні до 15 см	6-8 г/га + ПАР Флокс, РК, 200 мл/га
Льон-довгунець, льон олійний	5-12 см (фаза ялинки)	15-25 г/га

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Пшениця, ячмінь: Канцлер, ВГ (10 г/га) + Ультра Плюс, КЕ (0,5-0,6 л/га)
- Кукурудза: Канцлер, ВГ (10 г/га) + Крейсер, ВГ (30-50 г/га) + ПАР Флокс, РК (200 мл/га)
- Кукурудза: Канцлер, ВГ (10 г/га) + Дікам Плюс, РК (0,75 л/га) + ПАР Флокс, РК (200 мл/га)
- Соя: Канцлер, ВГ (6-8 г/га) + Ефес, РК (1,5-2,0 л/га)

Professional
Професійна серія
Корвет®, КС

**ПІСЛЯСХОДОВИЙ СЕЛЕКТИВНИЙ
ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ БОРОТЬБИ З
ОДНОРІЧНИМИ ТА ДЕЯКИМИ БАГАТОРІЧНИМИ
ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИМИ БУР'ЯНАМИ В ПОСІВАХ
ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

флуметсулам, 100 г/л + флорасулам, 75 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:

500 мл пластикова пляшка

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Висока ефективність проти перерослих бур'янів, в тому числі проблемних (підмаренник, мак, сокирки, падалиця соняшнику, стійкого до сульфонілсечовин та імідазолінонів, та ін.)
- Широке вікно застосування – до появи прапорцевого листка
- Не має обмежень у сівозміні
- Сумісний з більшістю засобів захисту рослин та добрив
- Ефективний при температурах від +5°C

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Корвет, КС – гербіцид системної дії, комбінація двох діючих речовин з хімічного класу триазолпіримідини, які за механізмом дії відносяться до групи інгібіторів синтезу ацетолактатсинтази (АЛС) – основний фермент в біосинтезі незамінних амінокислот: лейцин, ізолейцин та валін. Завдяки такому поєднанню досягається високий рівень контролю навіть стійких бур'янів, таких як підмаренник чіпкий, види ромашок та інші.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ КОРВЕТ, КС:

Високу чутливість до дії препарату проявляють види бур'янів: амброзія полинолиста, адоніс літній, вика польова, волошки сині, гірчак березковидний, горобейник польовий, грицики звичайні, зірочник середній (мокрець), кислиця польова, кучерявець Софії, мак-самосів, нагідки звичайні, паслін чорний, підмаренник чіпкий, редька дика, ромашки види, падалиця соняшнику, спориш звичайний, талабан польовий, щиріця біла.

Середню чутливість до дії препарату проявляють такі види бур'янів: гібіскус трійчастий, гречка татарська, жабрій звичайний, осот жовтий, рутка лікарська, фіалка польова.

Низьку чутливість до дію препарату проявляють наступні види бур'янів: види вероники, види жовтецю та інші.

Препарат не діє на злакові бур'яни.



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДУ КОРВЕТ, КС

В які фази розвитку бур'яни є найбільш чутливими до дії гербіциду?

Максимальна ефективність досягається при обробці молодих бур'янів на початкових етапах їх розвитку, коли умови середовища (температура, вологість) найбільш сприятливі для активного зростання. Обприскування слід проводити в момент активного росту бур'янів. Рослини чутливих видів бур'янів, які знаходяться на стадії активного зростання в фазі від 2 до 8 справжніх листків, є найбільш чутливими до дії препарату.

Чи ефективний гербіцид проти перерослих бур'янів?

Корвет, КС є найбільш ефективним гербіцидом в контролі підмаренника чіпкого, забезпечуючи знищення бур'яну на стадіях більше 5 кілець. Препарат в максимальних нормах витрати забезпечує високу ефективність на перерослих чутливих бур'янах при застосуванні в фазу виходу в трубку культури.

Коли настає повна загибель бур'янів після застосування гербіциду Корвет, КС?

Ріст рослин чутливих бур'янів припиняється на протязі доби після обробки. Перші видимі симптоми дії препарату проявляються уже через 1-2 дні після обприскування. Остаточного контролю чутливих бур'янів можна очікувати через 2-3 тижні в залежності від видового складу та стадії розвитку бур'янів під час обприскування, густоти стояння культури, умов навколишнього середовища до, під час та після обприскування та ін.

Який період захисної дії препарату?

Контролює тільки ті рослини чутливих видів бур'янів, сходи яких зазнали безпосередньої обробки препаратом. Крім того, має місце нетривалий (2-3 тижні) ґрунтову дію препарату на нові сходи деяких видів бур'янів за рахунок поглинання його корінням.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Уникайте застосування препарату при очікуванні заморозків в ніч після обробки або відразу ж після них. Не застосовувати на посівах, які знаходяться в стресовому стані (в період тривалої посухи, при сильному ураженні хворобами, при сильному пошкодженні шкідниками).

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

від +1°C до +30°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +8°C до +25°C		Рекомендована норма витрати робочого розчину при наземних обробках – 150-400 л/га
Погодні умови в період застосування			
	Опади, що випали через 2 години після застосування, не знижують ефективності препарату.		

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

Корвет, КС (0,05-0,07 л/га) + Сулам, СЕ (0,1-0,2 л/га) – бакова суміш за наявності великої кількості лободи білої.



Культура	Шкідливий об'єкт	Спосіб, час обробки, обмеження	Норма витрати препарату, л/га	Кратність обробок
Пшениця озима та яра	Однорічні та деякі багаторічні двосім'ядольні бур'яни	Під час вегетації, починаючи від фази 2-3 листків до фази прапорцевого листка включно	0,05-0,07	1
Ячмінь озимий та ярий				

Standard Стандартна серія Крейсер®, ВГ

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ОДНОРІЧНИМИ ТА БАГАТОРІЧНИМИ ЗЛАКОВИМИ ТА ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИМИ БУР'ЯНАМИ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА: римсульфурон, 250 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ: 1 кг фольгований пакет (20 пакетиків по 50 г)

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Широкий спектр дії проти злісних злакових бур'янів (мишію, пирію, гумаю) та деяких двосім'ядольних бур'янів (підмаренник чіпкий, щиріця звичайна)
- Можливість внесення до фази 7 листків кукурудзи
- Низька норма витрати
- Застосування на кукурудзі та картоплі

МЕХАНІЗМ ДІЇ: Селективний системний гербіцид, діюча речовина якого – римсульфурон – поглинається листками та коренями бур'янів, швидко переміщуючись, накопичується в меристематичних зонах. Дія гербіциду полягає у пригніченні діяльності ферменту ацетолактатсинтетази та ацетокарбоксилази, що призводить до блокування синтезу життєво необхідних амінокислот – валіну та ізолейцину. Це призводить до припинення поділу і порушення диференціації клітин у точках росту рослини. Ріст та розвиток бур'янів припиняється через декілька годин після застосування. Через декілька днів після внесення гербіциду візуально його дія спостерігається у вигляді пігментації точок росту та зупинки росту і розвитку бур'янів. Повна їх загибель настає через 2-3 тижні, залежно від погоднокліматичних умов.

Багаторічні злакові:	Однорічні злакові:	Двосім'ядольні	
<ul style="list-style-type: none"> • гумаю (насіння і ризомі) • пирій повзучий 	<ul style="list-style-type: none"> • вісого пустий • мишій (види) • пажитниця багатоквіткова • пальчатка кровоспиняюча • плоскуха звичайна • сорго двоколірне 	<ul style="list-style-type: none"> • абутилон Теофраста • амброзія (види) • будяк польовий • гірчак (види) • гірчиця (види) • грицики звичайні • жовтозілля звичайне • лобода біла 	<ul style="list-style-type: none"> • осот польовий • підмаренник чіпкий • ріпиця зморшкувата • ромашка (види) • руслиця попідтинна • рутка лікарська • соняшник однорічний • щиріця (види)

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербіцидів"

ГЕРБІЦИД КРЕЙСЕР, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, г/га	Спосіб, час обробки, обмеження	Максимальна кратність обробок
Кукурудза		40-50 г/га + 200 мл/га ПАР Флокс, РК	Обприскування посівів у фазі 1-7 листків культури	1
Картопля	Однорічні та багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	50 г/га + 200 мл/га ПАР Флокс, РК	Обприскування посівів за висоти культури 5-20 см	1
Картопля		(30 г/га + 20 г/га) + 200 мл/га ПАР Флокс, РК	Перша обробка після міжрядної обробки при висоті культури 5 см. Друга обробка – через 8-10 днів, максимальна висота культури 20 см	2

УВАГА! Гербіцид Крейсер, ВГ слід застосовувати з додаванням поверхнево-активної речовини (наприклад, ПАР Флокс, РК, із розрахунку 100 мл на 100 л робочого розчину)

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ КРЕЙСЕР, ВГ:

Як правильно зробити бакову суміш препарату Крейсер, ВГ з іншими препаратами?

При використанні бакових сумішей гербіциду Крейсер, ВГ з іншими гербіцидами спочатку з необхідної кількості гербіциду готують маточний розчин, який додають при ввімкненому режимі розмішування у заповнений на 1/3 водою бак обприскувача, потім додають інші продукти, і в останню чергу ПАР.

Чи є небезпека появи резистентності з боку бур'янів до цього препарату?

При використанні гербіциду Крейсер, ВГ згідно рекомендацій резистентність відсутня. Для запобігання виникнення резистентності з боку бур'янів в межах одного поля, необхідно проводити чергування цього гербіциду з гербіцидами, що мають інший механізм дії або застосовувати бакові суміші Крейсер, ВГ з гербіцидами інших хімічних груп.

Який період захисної дії цього препарату?

Крейсер, ВГ має гербіцидний ефект по відношенню до двосім'ядольних та злакових бур'янів в період до 30 діб.

Як впливають погодні умови на ефективність гербіциду Крейсер, ВГ?

Волога та тепла погода підсилює активність гербіциду, у той час як довготривалий посушливий період та відносно низька температура повітря знижують його активність. Дощ, який випадає через 3 години після внесення Крейсер, ВГ, не погіршує його ефективність, оскільки за цей час гербіцид повністю проникає у рослину.

Рекомендації по використанню у посушливих умовах:

- збільшити норму витрати робочого розчину до 300 л/га;
- збільшити норму ПАР Флокс, РК;
- додати у бакову суміш карбамід (3-5 кг/100 л робочого розчину);
- вносити препарат у вечірній та нічний час.

Для підвищення ефективності

Якщо посіви зріджені, за високої чисельності та наявності стійких бур'янів, а також в жарку, суху погоду, слід обов'язково використовувати поверхнево-активну речовину Флокс, РК, що покращує змочування бур'янів робочим розчином і, таким чином, покращує гербіцидний ефект.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВОЗОЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: III клас небезпечності (малотоксичний), помірно небезпечний для теплокровних, безпечний для бджіл, птахів, риб.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від -10°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C. Не використовувати гербіцид при температурі нижче +6°C і вище +25°C.	 200-400 л/га. В разі високого рівня забур'яненості потрібно застосувати максимальну норму витрати робочого розчину.
	Погодні умови в період застосування Забороняється проводити обробку, якщо культури мокрі від роси чи дощу та якщо культури сильно уражені хворобами, пошкоджені шкідниками, знаходяться під впливом значної посухи та спеки.	

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТИВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, г/га	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
Томати безрозсадні	Однорічні та багаторічні злакові та	100 г/га (50 г/га + 50 г/га) + ПАР Флокс, РК	Перше обприскування при 2-4 листків у культури; друге - по другій хвилі бур'янів (через 7-10 днів)	2
Томати розсадні	двосім'ядольні бур'яни	50 г/га + ПАР Флокс, РК	Перше обприскування через 4-10 днів після висаджування розсади; друге - по другій хвилі бур'янів (через 7-10 днів)	2

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

Для підсилення дії препарату на кукурудзі проти видів лободи, гірчаків, соняшнику однорічного, осоту рожевого та жовтого, амброзії, пасльону чорного, дурману, нетреби рекомендується застосування гербіциду Крейсер, ВГ у бакових сумішах з гербіцидами Дікам Плюс, РК, Футурин, ВГ у фазі 3-5 листків культури.

- Крейсер, ВГ (40 г/га) + Дікам Плюс, РК (1,0-1,2 л/га)
- Крейсер, ВГ (40-50 г/га) + Футурин, ВГ (0,15 кг/га)
- Крейсер, ВГ (40-50 г/га) + Сулам, СЕ (0,4-0,5 л/га)
- Крейсер, ВГ (40-50 г/га) + Легіон, ВГ (0,08 кг/га)
- Крейсер, ВГ (40-50 г/га) + Ультра Плюс, КЕ (0,5-0,6 л/га)



Гербіциди

Standard Стандартна серія Легіон®, ВГ

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ КОРЕНЕПАРОСТКОВИХ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ З РОДИН АЙСТРОВИХ, ГУБОЦВІТИХ ТА ПАСЛЬОНОВИХ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА: клопіралід, 750 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ: 2 кг фольгований пакет (20 пакетиків по 100 г)

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Найкращий у боротьбі з айстровими
- Винищує осоти на будь-якій стадії розвитку
- Незамінний у системах захисту буряків та ріпаку

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Легіон, ВГ - селективний системний гербіцид. Проникає у рослини через листя і корені та накопичується в меристематичних тканинах. Діюча речовина гербіциду - клопіралід - належить до класу синтетичних ауксинів, які спричиняють незворотні порушення гормональної регуляції у рослинах. Гербіцидна дія препарату проявляється у вигляді потовщення, згинання та скручування пагонів і стебел, гофрованості листя, утворення наростів і тріщин на стеблах та загибелі рослини.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ЛЕГІОН, ВГ:

Гербіцид використовується для пригнічення та знищення широкого спектру однорічних двосім'ядольних та багаторічних коренепаросткових бур'янів, що належать до родини айстрових, губоцвітих, пасльонових та деяких видів родини гречкових.

Найчутливішими до препарату виявились такі бур'яни: амброзія полинолиста, волошка синя, вика посівна, гірчак розлогий, молокан польовий, нагідки звичайні, осот жовтий, осот годній, осот рожевий, падалиця соняшника, роман польовий, види ромашок, королиця посівна, нетреба звичайна, паслін чорний та інші.

ГЕРБІЦИД ЛЕГІОН, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, кг/га	Максимальна кратність обробок
Пшениця, ячмінь	Однорічні двосім'ядольні, в т. ч. стійкі до 2,4-Д та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування від фази куцнення до виходу в трубку культури	0,06-0,12	1
Цукрові буряки	Однорічні двосім'ядольні та багаторічні, в т. ч. коренепаросткові бур'яни	Обприскування у фазі 1-3 справжніх листків у культурі	0,12-0,2	
Ріпак		Обприскування посівів у фазі 6-8 листків у однорічних бур'янів, у фазі розетки - початку формування генеративного пагону 2-8 см (проти осотів)	0,12-0,2	

Строки виходу на поле після обприскування: для проведення механізованих робіт – 3 дні, ручних робіт – 7 днів.



УВАГА! При пересіві основної культури в рік застосування гербіциду Легіон, врахувати, що безпечний пересів соняшником можливий не раніше ніж через 120 днів, а бобовими через 240 днів.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЛЕГІОН, ВГ:

Коли доцільно використовувати гербіцид Легіон, ВГ?

Максимальна ефективність препарату досягається при застосуванні його в ранні фази розвитку бур'янів: для однорічних - 2-4 листки; для багаторічних, коренепаросткових - від фази розетки до висоти рослин 10-15 см. При високій забур'яненості посівів осотами, гірчаком та при висоті рослин більше 15 см потрібно використовувати максимальну норму витрати препарату.

Як вплине несвоєчасне внесення препарату на ефективність гербіцидної обробки? При застосуванні препарату в більш пізні строки розвитку бур'янів гербіцидна дія може знизитися.

Упродовж якого часу проявляється гербіцидна дія препарату? Ріст чутливих рослин призупиняється через декілька годин, перші ознаки гербіцидного ефекту спостерігаються через 5-10 діб, повна загибель - через 15-25 діб. Ефективність дії препарату залежить від видового складу та стадії розвитку бур'янів, густоти стояння культури та погодно-кліматичних умов під час обприскування.

Чи можна використовувати гербіцид у суміші з іншими пестицидами? Гербіцид Легіон, ВГ за необхідності можна використовувати в бакових сумішах з препаратами інших хімічних груп та рідкими добривами. Підбір компонентів в бакових сумішах здійснюється цілеспрямовано, з врахуванням видового складу та чисельності шкідливих об'єктів в посівах. Проте необхідно перед виробничим використанням суміші гербіцидів провести попередню перевірку сумісності з конкретним препаратом.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: III клас (малотоксичний). Малотоксичний для ссавців. Малонебезпечний для риб та птахів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від -10°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		При наземному обприскуванні 200-400 л/га. В разі високого рівня забур'яненості потрібно використовувати максимальну норму витрати робочої рідини
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування
	Однією з умов ефективної дії препарату є відсутність опадів після внесення препарату протягом 2 годин.		Обприскування доцільно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, кг/га	Максимальна кратність обробок
Кукурудза, капуста, гірчиця	Однорічні та багаторічні двосім'ядольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів у фазі "розетки" (за висоти осотів 15-20 см) від фази 2 листків у культурі. Обприскування посівів від фази 3-4 листків до появи бутонів у культурі	0,2	1
Просо, овес	Однорічні двосім'ядольні та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування від фази куцнення до виходу в трубку культури	0,06-0,12	
Льон-довгунець (на технічні цілі)	Однорічні двосім'ядольні та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування у фазі «ялинки» культури	0,04-0,12	
Часник, цибуля (окрім «на перо»)	Однорічні двосім'ядольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д, та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів у фазі «розетки» (за висоти осотів 15-20 см) від фази 2 листків у культурі	0,1-0,16	
Газони	Однорічні та багаторічні двосім'ядольні бур'яни (кульбаба, подорожник, щавель, деревій, ромашка та ін.)	Обприскування по вегетуючим бур'янам після першого покосу	0,12-0,25	

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Буряки цукрові: Легіон, ВГ (0,12-0,2 кг/га) + Стилет, КЕ (0,8-1,5 л/га)
- Буряки цукрові: Легіон, ВГ (0,12-0,2 кг/га) + Шквал, КЕ (0,6-1,2 л/га)
- Кукурудза: Легіон, ВГ (0,08 кг/га) + Крейсер, ВГ (50 г/га)
- Кукурудза: Легіон, ВГ (0,1 кг/га) + Сулам, СЕ (0,4 л/га)





Standard
Стандартна серія

Меркурій®, ВГ

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ОДНОРІЧНИМИ ТА ДЕЯКИМИ БАГАТОРІЧНИМИ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИМИ БУР'ЯНАМИ В ПОСІВАХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: трибенурон-метил, 750 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ: 1 кг фольгований пакет (20 пакетиків по 50 г)

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Знищення бур'янів, стійких до 2,4-Д
- Тривалий період застосування – від 2-3 листків до появи прапорцевого листка культури
- Дія препарату не обмежується погодними та ґрунтовими умовами
- Відсутність фітотоксичності
- Зручність внесення
- Відсутність обмежень у сівозміні

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Гербицид проникає у рослини через листя і корені. На клітинному рівні дія препарату проявляється у припиненні ділення і порушенні диференціації клітин у точках росту рослини. Візуально гербицидний ефект проявляється у вигляді призупинення росту рослин через 5-8 днів, з послідуною їх загибеллю через 1-2 тижні. Тепла та волога погода підвищує швидкість дії гербициду, а прохолодна та суха – уповільнює її.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ МЕРКУРІЙ, ВГ:

Чутливі бур'яни: амброзія полинолиста (сім'ядолі - 2 листки), біфора промениста, гірчиця (види), грицики звичайні, дворятник (види), жабрій звичайний, жовтець (види), жовтозілля звичайне, зірочник середній, злинка канадська, кислиця (види), кропива глуха, кукіль звичайний, латук (молокан) компасний, льонок (види), мак дикий, редька дика, ріпак (падалиця), роман (види), ромашка (види), соняшник однорічний, спориш звичайний, сухоребрик (види), талабан польовий, фіалка польова, хрінниця (види), щиріця розлога, шпергель звичайний.

Середньочутливі: будяк польовий, волошка синя, гірчак березковидний, калачики, королиця (види), кульбаба лікарська, лобода біла, осот жовтий (польовий), підмаренник чіпкий (3-4 міжвузля), фіалка триколірна, щавель (види).

Стійкі бур'яни: березка польова, вероніка плющоліста, рутка лікарська, всі види злакових бур'янів.

ГЕРБІЦИД МЕРКУРІЙ, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, г/га	Максимальна кратність обробок
Озима пшениця	Однорічні та деякі багаторічні двосім'ядольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	Обприскування посівів від фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка включно	15-25	1
Ярий ячмінь		Обприскування посівів від фази 2-3 листків до виходу в трубку культури	15-20	
Соняшник (гібриди стійкі до трибенурон-метилу)		Обприскування в фазі від 2 до 8 справжніх листків культури та ранні фази росту бур'янів	20-50 + ПАР Флокс, РК (0,1л/100 л води)	



УВАГА! При використанні гербициду Меркурій на соняшнику стійкому до сульфонілсечовин, не рекомендується сумісне використання в бакових сумішах з протизлаковими гербицидами. Контроль злакових бур'янів можна проводити за 5-7 днів до або після застосування препарату Меркурій.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ МЕРКУРІЙ, ВГ:

Норма витрати та строки застосування.

Найкращий гербицидний ефект досягається при обробці посівів в період активного росту молодих бур'янів (2-4 листка – для однорічних, розетки – для багаторічних). Норма витрати препарату залежить від фази розвитку та видового складу бур'янів. Максимальна норма витрати доцільна при наявності перерослих (більше 4-х листків для однорічних, стеблунання – для багаторічних) чутливих бур'янів або значній кількості середньо чутливих і стійких до препарату бур'янів. Застосування в умовах жаркої сухої погоди:

- збільшити норму робочого розчину до 250-300 л/га;
- збільшити норму ПАР Флокс, РК;
- проводити обробку посівів у вечірній та нічний час.

Ознаки дії гербициду на бур'яни.

- Візуальні ознаки гербицидного ефекту залежать від виду бур'яну, стадії росту та погодних умов. Перші симптоми у вигляді хлорозу, некрозу з'являються через декілька днів після обробки, через 2-3 тижні бур'яни гинуть. Деякі середньочутливі бур'яни залишаються зеленими протягом тривалого часу, однак їх розвиток пригнічено.
- При обробці помірночутливих бур'янів в більш пізні строки розвитку та за посушливої погоди ознаки дії гербициду з'являються пізніше.
- Строки виходу після обприскування для механізованих робіт – 3 дні.

Бакові суміші.

- З метою підсилення гербицидної дії препарату можливе використання його в сумішах з іншими гербицидами, та рідкими добривами. Зазвичай використовується наступна пропорція: 10-15 г/га Меркурій, ВГ + 1/2-2/3 гектарної норми одного з препаратів: Дікам Плюс, РК, Леґіон, ВГ, Сулам, СЕ.
- Не рекомендується сумісне застосування з фосфорорганічними інсектицидами.

Для підвищення ефективності.

Якщо посіви зріджені, за високої чисельності та наявності стійких бур'янів, а також в жарку, суху погоду, слід обов'язково використовувати поверхнево-активну речовину Флокс, РК, що покращує змочування бур'янів робочим розчином і, таким чином, покращує гербицидний ефект.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: III клас (малотоксичний), помірно небезпечний для теплокровних, безпечний для бджіл, птахів, риб.

ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ: 6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від -10°C до +35°C

🌿	Оптимальні температурні умови застосування	🧪	Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C.		200-300 л/га
☁️ Погодні умови в період застосування			
☁️	<ul style="list-style-type: none"> • Тепла та волога погода підсилює активність препарату, але довготривалий посушливий період знижує його активність. • Дощ який випадає протягом трьох годин після внесення препарату може змити його з поверхні листків ще до повного проникнення, що також знижує активність його дії. 		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, г/га	Максимальна кратність обробок
Жито	Однорічні та багаторічні двосім'ядольні бур'яни	Обприскування посівів від фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка включно	20-25	1
Просо, овес, тритикале	Однорічні двосім'ядольні та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування посівів у фазі кушення культури Обприскування бур'янів у стадії росту 2-6 листків	15-20	





Professional
Професійна серія

Молтено®, РК

ГЕРБИЦИД ШИРОКОГО СПЕКТРУ ДІЇ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ОДНОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ І ДВОСИМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ В ПОСІВАХ БОБОВИХ КУЛЬТУР ТА СОНЯШНИКУ, СТІЙКОГО ДО ГЕРБИЦИДІВ З ХІМІЧНОЇ ГРУПИ ІМІДАЗОЛІНОНИ.



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
імазамокс, 40 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Максимально широкий спектр знищення злакових та двосім'ядольних бур'янів, в тому числі всіх рас вовчка
- Новий стандарт захисту ІМІ-соняшнику
- Більший ефект – менша післядія
- Має контактну-системну та ґрунтову дію, при достатній вологості ґрунту стримує появу наступних хвиль бур'янів
- Висока вибірковість по відношенню до культурних рослин
- Сумісний в бакових сумішах з інсектицидами, фунгіцидами, регуляторами росту та мікродобривами
- Стимує багаторічні бур'яни, в тому числі осот жовтий і пирій повзучий

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Імазамокс, як і інші гербіциди групи імідазолінонів, проникає в бур'яни через коріння і листя і пересувається по флоемі і ксилемі, накопичуючись в меристематичних ділянках. У чутливих рослин інгібує фермент ацетолактатсинтазу, що призводить до зниження в рослинних тканинах рівня амінокислот - валіну, лейцину і ізолейцину - з подальшим порушенням синтезу білка і нуклеїнових кислот. Ріст чутливих бур'янів зупиняється вже через кілька годин після обробки.

ГЕРБИЦИД МОЛТЕНО, РК ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливий об'єкт	Спосіб, час обробки, обмеження	Норма витрати препарату, л/га	Кратність обробок
Горох	Злакові та двосім'ядольні бур'яни	Обприскування посівів у фазу 3-5 справжніх листків у культури (злакові бур'яни у фазі 1-3 листки, дводольні – 2-4 листки)	0,75-1,0	1
Соя		Обприскування посівів у фазу 2-3 трійчастих листка у культури (злакові бур'яни у фазі 1-3 листки, дводольні – 2-4 листки)	0,75-1,0	
Соняшник		Обприскування посівів у фазі від 2 до 8 справжніх листків у культури (злакові бур'яни у фазі 1-3 листки, дводольні – 2-4 листки)	1,0-1,2	

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБИЦИДУ МОЛТЕНО, РК:

Як правильно проводити обробку препаратом?

Обробку слід проводити на ранніх стадіях росту бур'янів при оптимальній вологості повітря і ґрунту з низьким робочим тиском оприскувача, робочий розчин потрібно рівномірно нанести на поверхню поля. Для ефективної ґрунтової дії препарату, ґрунт повинен бути вологим та мати дрібногрудкувату структуру.

Які візуальні ознаки гербіцидної дії препарату?

Зазвичай ознаками дії гербіциду є хлороз молодого листя і відмирання точок росту.

Взаємодія гербіциду Молтено, РК з іншими препаратами:

- Забороняється застосовувати спільно з фосфорорганічними інсектицидами (Ріфос, КЕ)
- Не допускається спільне внесення з грамініцидами
- Після обробки препаратом протягом усього сезону забороняється застосування гербіцидів з групи сульфонілсечовин
- Для кращого контролю стійких та перерослих бур'янів в посівах бобових культур можна застосовувати бакову суміш з гербіцидом Ефес, РК

Застереження!

Після застосування препарату можна висівати:

- через 4 місяці – озиму пшеницю;
- через 9 місяців – пшеницю яру, овес, ячмінь ярий та озимий;
- через 11 місяців – кукурудзу, соняшник, сорго, рис;
- через 16 місяців – цукрові та кормові буряки, ріпак озимий та ярий, овочеві культури.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний), небезпечний для водних організмів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки з дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +15 до +25°C		Рекомендована норма витрати робочого розчину при наземних обробках – 200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування
	Опади, що випали через 1 годину після застосування, не знижують ефективності препарату		Не проводити обприскування при швидкості вітру більше 5 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

- Нут – 0,75-1,0 л/га. Обприскування посівів в ранні фази росту бур'янів (1-3 справжніх листків) і 1-3 справжніх листків культури.
- Люцерна – 1,0 л/га. Обприскування посівів в фазу 1-4 трійчастих листка, в ранні фази росту бур'янів.
- Люпин – 1,0 л/га. Обприскування ґрунту до сходів, після посіву культури.
- Конюшина – 0,75-1,0 л/га. Обприскування посівів до сходів, після посіву культури, або в фазі 1-2 трійчастих листки в ранні фази росту бур'янів.

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

Молтено, РК (0,7 л/га) + Ефес, РК (2,0 л/га)





Professional
Професійна серія

Нікоміл[®], МС

ГЕРБИЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ І БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ ТА ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ В ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
нікосульфурон, 60 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
суспензія, що змішується з олією

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Знижені норми витрати завдяки високій концентрації
- Стійкість до змивання опадами за рахунок удосконаленої системи ПАР
- Унікальна селективність до рослин кукурудзи
- Широкий період застосування – від 3 до 10 листків кукурудзи
- Сучасна препаративна форма
- Рослинна олія у якості розчинника

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина нікосульфурон проникає у рослини через листя, стебла та корені, швидко пересувається по рослині через флоему та ксилему до точок росту та пригнічує активність ферментів: ацетолактатсинтетази (ALS) та синтази ацетогідроксикислоти (AHAS). Внаслідок цього порушується синтез амінокислот валіну та ізолейцину, що приводить до припинення поділу клітин та росту рослини.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБИЦИДУ НІКОМІЛ, МС:

Чутливі бур'яни:

- злакові: віслюг звичайний, гумай (сорго алепське), мишії (види), пажитниця (види), пальчатка кровоспиняюча, пирій повзучий, плоскуха звичайна, просо волосовидне, райграс, тонконіг однорічний;
- двосім'ядольні: абутилон Теофраста, галінсога дрібноквітковая, гірчак (види), гірчиця польова, грицики звичайні, дурман звичайний, жабрій звичайний, зірочник середній, лобода біла, паслін чорний, портулак городній, редька дика, ріпак (падалиця), суріпиця звичайна, череда трироздільна, щиріця звичайна.

Малочутливі бур'яни:

березка польова, осот (види), хвощ польовий.

ГЕРБИЦИД НІКОМІЛ, МС ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати препарату, л/га	Строк обробки
Кукурудза	Однорічні і багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	0,7-1,0	Обприскування у фазі 3-10 листків у культури

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБИЦИДУ НІКОМІЛ, МС:

На яких фазах розвитку бур'яни найбільше чутливі до гербициду Нікоміл, МС?
Гербицид використовується для пригнічення та знищення широкого спектру однорічних і багаторічних злакових та двосім'ядольних бур'янів. Найбільшу ефективність препарат має на початкових стадіях розвитку бур'янів, в фазу 2-4 листка у однорічних широколистих, 3-5 листків у злакових бур'янів та при висоті багаторічних злакових бур'янів 20-30 см.

Що необхідно пам'ятати при роботі з препаратом Нікоміл, МС:

- Не застосовувати препарат на полях кукурудзи протягом 14 днів до чи після обробки фосфорорганічними інсектицидами.
- Не проводити обробку, якщо культура сильно ушкоджена хворобами, шкідниками, посухою та спекою.
- Не проводити обробку, якщо культура мокра від роси чи дощу.

Чи можливе використання препарату в бакових сумішах з іншими гербицидами?

З метою підсилення гербицидної дії препарату можливе його використання в бакових сумішах з гербицидами на основі сульфонілсечовини та дикамби. Підбір компонентів в бакових сумішах здійснюється цілеспрямовано, з врахуванням видового складу та чисельності бур'янів в посівах. Проте доцільно, перед виробничим використанням сумішей гербицидів, провести попередню перевірку сумісності з конкретним препаратом. Несумісний в бакових сумішах з гербицидами на основі піридату, бентазону (викликає опіки), 2,4-Д (знижує дію на злакові бур'яни), а також з фосфорорганічними інсектицидами.

Чому, на відміну від інших післясходових гербицидів Нікоміл, МС не пригнічує рослини кукурудзи до 10 листа включно?

Діюча речовина препарату Нікоміл, МС нікосульфурон належить до групи сульфонілсечовини, але відрізняється специфічною дією на фізіологічні процеси культури. Навіть на більш пізніх стадіях розвитку кукурудзи (фаза 6-10 листків), вона стійка до нікосульфурону завдяки селективності метаболізму (цитохром Р450, збуджений піримідин-5-гідроксилюванням) із послідовним сполученням з глюкозою.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: III клас небезпечності.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +1°C до +35°C

Іконка	Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
	Від +15°C до +30°C	200-300 л/га. В разі високого рівня забур'яненості потрібно застосовувати максимальну норму витрати робочого розчину
Погодні умови в період застосування		
Гербіцид необхідно застосовувати у суху погоду. Умовою ефективною дії препарату є відсутність опадів після обприскування протягом 3 годин. Не проводити обробку якщо культура мокра від роси чи дощу		

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Нікоміл, МС (0,7-1,0 л/га) + Футурин, ВГ (0,15 кг/га)
- Нікоміл, МС (0,7-1,0 л/га) + Сулам, СЕ (0,3-0,4 л/га)
- Нікоміл, МС (0,7-1,0 л/га) + Ультра Плюс, КЕ (0,5-0,6 л/га)



Віслюг звичайний



Гірчиця польова



Гірчак почечуйний

Professional Професійна серія **Пропозит®**, KE

ГРУНТОВИЙ ГЕРБІЦИД ДЛЯ БОРТЬБИ З ОДНОРІЧНИМИ ЗЛАКОВИМИ ТА ДЕЯКИМИ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИМИ БУР'ЯНАМИ В ПОСІВАХ ОСНОВНИХ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР. ПІСЛЯСХОДОВИЙ СЕЛЕКТИВНИЙ ГЕРБІЦИД В ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА: пропізохлор, 720 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ: 20 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Контроль однорічних злакових та деяких двосім'ядольних бур'янів
- Гнучкі терміни застосування: до сходів, а на кукурудзі і на ранніх стадіях розвитку
- Поєднання високої гербіцидної активності з відсутністю прояву фітотоксичності у культурних рослин за умов дотримання регламентів застосування
- Тривала захисна дія (30-60 днів)

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Пропізохлор, гербіцид системної дії, абсорбується корінням та проростками, пригнічує поділ клітин шляхом блокування синтезу білків та нуклеїнових кислот. Як і інші сполуки родини хлорацетамідів, пропізохлор також інгібує утворення вищих жирних кислот. Рослини кукурудзи особливо толерантні до дії пропізохлору, це дозволяє використовувати препарат навіть по сходах кукурудзи до 3-4 листка (фаза бур'янів: однорічні злакові – проростання – перший листок, однорічні двосім'ядольні – сім'ядолі).

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ПРОПОЗИТ, KE:

Чутливі ефективність (85-95%)	Середньочутливі ефективність (70-85%)	Середньостійкі ефективність (50-70%)
<ul style="list-style-type: none"> • вівсюг • галінсога, види • гумай (сорго алевське) з насіння • мишій зелений • мишій сизий • пальчатка, види • плоскуха звичайна • щиряца, види 	<ul style="list-style-type: none"> • волошка синя • гірчак почечуйний • гризика звичайні • кучерявець Софії • лобода біла • мак, види • пасльон чорний • підмаренник чіпкий • ромашка, види 	<ul style="list-style-type: none"> • гірчак розлогий • гірчиця польова • зірочник середній • кропива глуха • лутига розлога • редька польова

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербіцидів"

ГЕРБІЦИД ПРОПОЗИТ, KE ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб застосування	Норми внесення, л/га	Кратність обробки
Соняшник, ріпак, цукровий буряк, кукурудза	Однорічні злакові та деякі двосім'ядольні бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	2,0-3,0	1
Кукурудза		Обприскування у фазі до 3-4 листків у культури		

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ПРОПОЗИТ, KE:

Які технологічні особливості застосування гербіциду?

Поверхня ґрунту повинна бути вирівняна, та мати дрібногрудкувату структуру. Якщо ґрунт вологий, препарат не потребує заробки в ґрунт, але за тривалої посушливої погоди до сівби, коткування підвищує його ефективність. Після внесення препарату не доцільно проводити міжрядні обробки протягом 2-3 тижнів.

Від чого залежить норма внесення препарату?

На ґрунтах з вмістом гумусу більше 3% необхідно застосовувати максимальну норму препарату.

Чи можна застосовувати гербіцид у бакових сумішах?

Пропозит, KE є добрим партнером для ґрунтових гербіцидів з інших хімічних груп, та препаратів на основі сульфонілсечовин та дикамби (на кукурудзі), але перед використанням необхідно провести тест на сумісність.

Як готувати робочий розчин?

Заповніть бак оприскувача до половини водою, додайте необхідну дозу гербіциду та за необхідності компоненти бакової суміші і перемішайте розчин, потім додайте воду що залишилася. Перемішуйте суміш під час всього внесення.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

4 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування Від +10°C до +25°C		Приготування робочого розчину 200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування Ефективний незалежно від погодних умов, у тому числі пониженої вологості ґрунту при дотриманні технології застосування		Погодні умови в період застосування Обприскування доцільно проводити при швидкості вітру не більше 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Спосіб внесення	Шкідливі об'єкти	Норми внесення, л/га
Соя	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, але до появи сходів культури	Однорічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	2-3
Ріпак	Обприскування посівів у фазі до 2-4 листків у культури		

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

Пропозит, KE (2 л/га) + Рейтар, КС (2 л/га)





Standard
Стандартна серія

Рейтар®, КС

ГРУНТОВИЙ ГЕРБІЦИД ДЛЯ БОРТЬБИ З ОДНОРІЧНИМИ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИМИ ТА ЗЛАКОВИМИ БУР'ЯНАМИ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
прометрин, 500 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова канистра



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Контроль двосім'ядольних та злакових бур'янів
- Тривала захисна дія
- Ефективність проти бур'янів (амброзія полинолиста, гірчиця польова, редька дика, гірчак (сходи з насіння))

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина ґрунтового гербіциду відзначається високою гербіцидною активністю по відношенню до однорічних двосім'ядольних та деяких злакових бур'янів. Прометрин поглинається проростками та корінцями бур'янів, активно розноситься по ксилемі, накопичується в меристематичних тканинах. Діюча речовина препарату призводить до руйнування фотосинтетичної системи з подальшим припиненням поділу клітин та росту і розвитку рослин.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ РЕЙТАР, КС:

Буркун лікарський (сходи з насіння), вероніка плющелиста, галінсога, гірчак (сходи з насіння), гірчиця польова, дворятник степовий, дурман звичайний, жовтозілля звичайне, зірочник середній, калачики, плоскуха звичайна, кропива дводомна, курячі очка польові, лобода біла, осот рожевий (сходи з насіння), паслін чорний, редька дика, пальчатка кровоспиняюча, череда, мишій (види), щиріця (види).

ГЕРБІЦИД РЕЙТАР, КС ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Спосіб внесення	Бур'яни	Норми внесення, л/га
Кукурудза	Обприскування ґрунту до посіву, під час посіву або після, але до появи сходів культури	Однорічні двосім'ядольні та злакові	2,0-4,0
Соняшник			
Картопля	Обприскування ґрунту до появи сходів культури		3,0-4,0

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ РЕЙТАР, КС:

Чи можна використовувати препарат Рейтар, КС в бакових сумішах з іншими ґрунтовими гербіцидами?

Рейтар, КС сумісний в бакових сумішах з іншими ґрунтовими гербіцидами, але в кожному окремому випадку необхідно провести тест на сумісність.

Від чого залежить норма витрати препарату?

Норма витрати препарату регулюється залежно від типу ґрунтів та їх механічного складу:

- мінімальна норма витрати застосовується на малогумусних, легких за механічним складом ґрунтах;
- середня - на суглинкових із вмістом гумусу менше 4%;
- підвищена - на суглинкових і важких із вмістом гумусу 4-5% та торф'яних.

Як досягти найвищої ефективності від застосування препарату?

На прояв гербіцидного ефекту особливо впливає стан ґрунту перед внесенням гербіциду. Ґрунт перед внесенням препарату має бути оброблений згідно з рекомендаціями (зволоженим, дрібногрудкуватим з ретельно подрібненими рослинними рештками). У разі загрози пересихання верхнього шару ґрунту гербіцид після внесення необхідно заробити легкими або середніми боронами.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

II клас (помірнотоксичний). Безпечний для бджіл. Малотоксичний для риб.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +1°C до +35°C

Іконка	Оптимальні температурні умови застосування	Іконка	Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		200-400 л/га. Робочий розчин препарату необхідно використати протягом 24 годин з моменту приготування
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування
	Оптимальні умови для внесення - після дощу		Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Спосіб внесення	Бур'яни	Норми внесення, л/га
Морква	Обприскування ґрунту до висівання, до сходів або у фазі 2 справжніх листків культури	Однорічні двосім'ядольні та злакові бур'яни	2,0-3,0
Коріандр	Обприскування ґрунту до висівання, до сходів або у фазі 2-3 справжніх листків культури		3,0-4,0
Горох на зерно, соя, часник, чина (на кормові цілі)	Обприскування ґрунту до сходів культури		3,0-5,0
Горох овочевий	Обприскування ґрунту до сходів культури		2,0
Квасоля, кріп	Обприскування ґрунту до сходів культури (протягом 2-5 діб після висівання)		3,0-4,0
Петрушка	Обприскування ґрунту до сходів культури		4,0

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту селери, віки, кормових бобів.

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Рейтар, КС (2 л/га) + Екстрем, КЕ (2 л/га)
- Рейтар, КС (2 л/га) + Тайфун, КЕ (1,5 л/га)
- Рейтар, КС (2 л/га) + Пропозит, КЕ (2 л/га)





Standard
Стандартна серія

Стилет®, KE

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНО- ТА БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ БУР'ЯНІВ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

клетодим, 120 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ:

5 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Знищення злакових бур'янів
- Позбавлення від падалиці культурних злаків
- Незалежність від фази розвитку культури
- Альтернатива ґрунтовим гербіцидам

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Клетодим має системні властивості. Діюча речовина препарату проникає в рослину, концентрується в точках росту і блокує біосинтез ліпідів. Клетодим незворотно дезактивує життєво важливий для злакових бур'янів фермент ацетилкарбоксилазу. Препарат знищує як надземну, так і підземну (кореневу) частину злаків, запобігаючи відростанню багаторічних видів. Завдяки своїй селективності препарат не викликає фітотоксичності у двосім'ядольних культурних рослин, на яких рекомендований до застосування. Дія препарату на злакові бур'яни проявляється на 3-5 день, відмирання рослин відбувається через 7-21 день після обробки.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ СТИЛЕТ, KE:

Препарат контролює понад 40 видів однорічних та багаторічних злакових бур'янів. Серед них грятися збірна, гумай, гусятник малий, житняк гребінчастий, кипець гребінчастий, метлюг звичайний, овес дикий (вівсюг), різні види тонконогу, бромусу, мишію та пальчатки, стоколос безостий, падалиця культурних злаків, пирій повзучий, плевел багатівковий, плоскуха звичайна, свинорій пальчастий, ячмінь мишачий.

ГЕРБІЦИД СТИЛЕТ, KE ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробок, обмеження	Строки виходу людей на оброблені площі
Буряки цукрові, ріпак, соя, соняшник	Однорічні злакові	0,4-0,8	Обприскування посівів у фазу 2-6 листків у бур'янів (незалежно від фази розвитку культури)	Механічні роботи – 3 дні, ручні роботи – 7 днів
	Багаторічні злакові	1,4-1,8	Обприскування посівів при висоті бур'янів 10-20 см (незалежно від фази розвитку культури)	

Препарат застосовується одноразово.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ СТИЛЕТ, KE:

Як встановити оптимальну норму витрати препарату?

Норма витрати препарату та ефективність гербіцидної обробки залежать від видового складу бур'янів та їх вікового і фізіологічного стану. Найвищий рівень гербіцидної дії (до 95%) досягається при обробці злакових бур'янів у фазі 2-4 листки з нормою витрати 0,4-0,6 л/га, у фазі 4-6 листків – 0,6-0,8 л/га. Для контролю багаторічних злакових при відростанні їх до 10 см препарат застосовують з нормою 1,4-1,6 л/га, до 20 см – до 1,6-1,8 л/га.

Від яких факторів залежить ефективність гербіцидної обробки?

Ефективність застосування гербіциду залежить від якісного внесення препарату. Важливо суворо дотримуватись рекомендацій щодо температурних умов використання препарату. Слід ретельно підготувати обладнання для внесення препарату, дотримуватись рекомендацій по приготуванню робочого розчину. Перед внесенням препарату доцільно ретельно вивчити зміст тарної етикетки, технічної документації на обладнання для обприскування, провести навчання робітників. Обов'язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясне змочування рослин під час внесення препарату.

Чи сумісний гербіцид Стилет, KE в бакових сумішах з іншими препаратами?

Препарат можна використовувати в бакових сумішах з іншими препаратами. Під час приготування бакових сумішей необхідно ретельно вивчити рекомендації щодо застосування препарату.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Гербіцид Стилет, KE не рекомендовано застосовувати у баковій суміші з препаратами на основі бентазону.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: III клас (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +5°C до +30°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +15°C до +25°C		200-400 л/га.
	Погодні умови в період застосування Умовою ефективною дії препарату є відсутність опадів після обприскування протягом 6 годин. Не проводити внесення по мокрим від дощу чи роси рослинам або при швидкості вітру понад 3-4 м/с. У дні з високою температурою обприскування бажано проводити у вечірні години або вранці.		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
Морква, льон-довгунець, горох, цибуля (крім на «перо»), картопля	Однорічні злакові бур'яни	0,4-0,8	Обприскування посівів за висоти бур'янів 3-5 см	1
Льон-довгунець, морква, картопля	Багаторічні злакові бур'яни	1,4-1,8	Обприскування посівів за висоти бур'янів 15-20 см	
Горох, цибуля (крім на «перо»)		1,2-1,6		

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту столових, кормових буряків, гірчиці.

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Буряки цукрові: Стилет, KE (0,8-1,5 л/га) + Легіон, ВГ (0,12-0,2 кг/га)





Standard
Стандартна серія

Сулам®, СЕ

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ОДНОРІЧНИМИ ТА ДЕЯКИМИ БАГАТОРІЧНИМИ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИМИ БУР'ЯНАМИ НА ПОСІВАХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА КУКУРУДЗИ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: 2,4-Д-2-етилгексилловий ефір, 452,42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: суспо-емульсія

УПАКУВАННЯ: 5 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Високий гербіцидний ефект, зумовлений синергічною дією двох діючих речовин
- Широкий період застосування на зернових культурах
- Швидка дія, перші симптоми з'являються через 2-3 дня
- Висока ефективність проти стійких бур'янів (підмаренник чіпкий, ромашка)

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Системний гербіцид Сулам, СЕ – є комбінацією двох діючих речовин з різними механізмами дії: флорасулам та 2,4-Д у формі 2-етилгексиллового ефіру. Завдяки такому поєднанню досягається високий рівень контролю навіть стійких бур'янів до дії феноксиполук (2,4-Д), таких як підмаренник чіпкий, ромашка непахуча, зірочник середній, роман польовий та інші. Флорасулам належить до групи триазолпіримідинів, що пригнічують ацетолактатсинтетазу (АЛС) – основний фермент в біосинтезі незамінних амінокислот: лейцин, ізолейцин та валін. 2,4-Д - гербіцид групи феноксиоцтової кислоти. Завдяки рухомій ефірній його формі (2-етилгексил) швидко поглинається листям, коренями та проростками чутливих видів бур'янів та переміщується у точки росту. В них він діє як інгібітор росту, на гормональному рівні порушуючи ростові процеси рослинних клітин у чутливих бур'янів.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ СУЛАМ, СЕ:

Найчутливіші бур'яни: абутилон Теофраста, амброзія полинолиста, волошка синя, гірчиця польова, грицики звичайні, кардарія крупковидна, кучерявець Софії, лобода біла, мак дикий, нетреба звичайна, ріпак падалиця, редька дика, соняшник падалиця, сухоребрик Льюзеллів, талабан польовий, щиріця види.

Середньочутливі бур'яни: березка польова, бодяк рожевий, осот жовтий

ГЕРБІЦИД СУЛАМ, СЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб та час обробки	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кратність обробок
Пшениця	Однорічні та деякі багаторічні двосім'ядольні бур'яни	Обприскування від фази кушення до утворення 2 міжвузлів культури	0,4-0,6	1
Ячмінь			0,4-0,6	
Кукурудза		Обприскування з фази 3 до фази 7 листків культури, включно	0,4-0,6	



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ СУЛАМ, СЕ:

Чи можна використовувати препарат Сулам, СЕ в бакових сумішах з іншими препаратами?

Препарат сумісний з фунгіцидами, інсектицидами, протидводольними гербіцидами, рідкими азотними добривами та регуляторами росту рослин. Сумісний з грамініцидами на основі ізопротурону та хлортолурону. Несумісний з грамініцидами на основі феноксапролу, клодинафоп-пропаргілу та диклофопу. Перед приготуванням робочої суміші рекомендується перевірити змішуваність препаратів у малій ємкості.

Як швидко можна побачити перші прояви дії гербіциду?

Видимі симптоми з'являються вже через 1-3 дні після обробки, повна загибель настає через 2-3 тижні.

Чи є обмеження у сівозміні після застосування препарату Сулам, СЕ?

При дотриманні регламенту застосування, немає обмежень у сівозміні. Діючі речовини препарату швидко розкладаються у ґрунті до нешкідливих речовин.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +8°C до +25°C		150-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування
	Не слід проводити обробку відразу після заморозку або при очікуванні заморозків в ніч після обробки		Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
Просо	Однорічні та деякі багаторічні двосім'ядольні бур'яни	0,4-0,6	Від фази кушення до виходу в трубку	1
Сорго			Фаза 3-5 листків культури	





Standard
Стандартна серія

Тайфун®, KE

ГРУНТОВИЙ ГЕРБІЦИД ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ, ЦУКРОВОГО БУРЯКУ, СОНЯШНИКУ ТА РІПАКУ ВІД ЗЛАКОВИХ ТА ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: метолахлор, 960 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ: 20 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Відсутність фітотоксичності
- Тривала захисна дія
- Проникнення в стеблові частини проростків

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина ґрунтового гербіциду Тайфун, KE відзначається високою гербіцидною активністю по відношенню до однорічних злакових та деяких двосім'ядольних бур'янів. Метолахлор діє на проростаючі бур'яни. Діюча речовина препарату проникає переважно у тканини шилець, активно гальмує розвиток і поділ клітин через порушення ліпідного обміну. В результаті дії метолахлору проростки бур'янів призупиняють ріст і розвиток та гинуть.

СПЕКТР ДІЇ ПРЕПАРАТУ ГЕРБІЦИДУ ТАЙФУН, KE:

Чутливі бур'яни: галінсога дрібноквіткова, зірочник середній, мишій зелений, мишій мутувчатий, мишій сизий, пальчата горизонтальна, пальчатка кровоспиняюча, плоскуха звичайна, просо (види), тонконіг однорічний.

Помірно чутливі бур'яни: грицики звичайні, гумай (сорго алепське), портулак городній, щириця біла, щириця жминдовидна, щириця звичайна.

ГРУНТОВИЙ ГЕРБІЦИД ТАЙФУН, KE ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Спосіб внесення	Бур'яни	Норма внесення, л/га
Кукурудза	Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури	Однорічні злакові та деякі двосім'ядольні	1,6-2,1
Соняшник			1,6-2,6
Цукровий буряк			
Ріпак			

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ТАЙФУН, KE:

Від яких факторів залежить ефективність дії гербіциду Тайфун, KE?

При внесенні препарату ґрунт має бути оброблений згідно з рекомендаціями і бути зволеним, дрібногрудкуватим, з ретельно подрібненими рослинними рештками. Після внесення гербіцид відразу необхідно заробити середніми або легкими бородами. В разі існування загрози підсушування ґрунту доцільно провести коткування для його ущільнення.

Як визначити необхідну норму внесення гербіциду Тайфун, KE?

Норма витрати препарату регулюється залежно від типу ґрунтів та їх механічного складу. Так, мінімальна норма витрати застосовується на малогумусних та легких за механічним складом ґрунтах, середня - на суглинкових, із вмістом гумусу менше 4%, підвищена - на суглинкових і важких, із вмістом гумусу 4-5% та торф'яних.



Чи зміниться ефективність гербіциду Тайфун, KE при високому рівні забур'яненості?

Слід пам'ятати, що при прогнозуванні великої кількості сходів гірчиці польової, амброзії полинолистої, чорнощирю нетреболистого, пасльону чорного, редьки дикої, видів гірчаків і щириці, грициків звичайних, портулака городнього, гумая (сорго алепське) та падалиці попередньої культури гербіцидний ефект від застосування препарату може не перевищити 70%, особливо за умов посухи. В зв'язку з цим необхідно планувати додаткові заходи щодо захисту посівів від цих бур'янів.

Як застосовувати гербіцид в умовах недостатнього зволоження ґрунту?

В умовах посухи для підсилення гербіцидного ефекту гербіцид доцільно вносити під передпосівну культивуацію на глибину 5 см. Якщо препарат вноситься після сівби, то після заробки гербіциду бородами необхідно провести коткування для ущільнення ґрунту.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: III клас (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +1 °C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування
	Оптимальні умови для внесення препарату - після випадання дощу або зрошення нормою 10-20 мм		Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Спосіб внесення	Бур'яни	Норма внесення, л/га
Сорго	Обприскування ґрунту до висівання або до сходів культури (у зонах недостатнього зволоження - із загортанням), обприскування в фазу 3-5 листків культури. Обов'язковою умовою застосування є обробка насіння сорго антидотом.	Однорічні злакові та деякі двосім'ядольні	1,6-2,0
Горох	Обприскування ґрунту до висівання або до сходів культури (у зонах недостатнього зволоження - із загортанням)		1,6
Картопля	Обприскування ґрунту до посадки, але до появи сходів культури		1,6
Кавуни	Обприскування ґрунту до висівання або до сходів культури (у зонах недостатнього зволоження - із загортанням на глибину не більше 5 см.)		1,6-2,1
Томати (розсадні), капуста (розсадна)	Обприскування ґрунту до висаджування розсади		1,6
Томати безрозсадні	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури		1,2
Картопля	Обприскування ґрунту після посадки, але до сходів культури		1,6-2,1
Соя	Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури		1,1-2,0

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту буряка столового, тютюну.

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Соняшник, кукурудза: Тайфун, KE (1,5 л/га) + Рейтар, КС (2,0 л/га)



Standard Стандартна серія Ультра Плюс®, KE



ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ОДНОРІЧНИМИ ТА ДЕЯКИМИ БАГАТОРІЧНИМИ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИМИ БУР'ЯНАМИ В ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ, ЯЧМЕНЮ ТА КУКУРУДЗИ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: 2-етилгексилловий ефір 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти, 850 г/л, у кислотному еквіваленті – 564 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ: 20 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Використання від +8°C
- Рухлива ефірна форма
- Не змивається дощем через годину після обробки
- Ефективність проти двосім'ядольних бур'янів
- Ідеальний партнер для бакових сумішей
- Ефективність дії препарату в умовах посухи не знижується

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина гербіциду швидко поглинається рослиною через її надземну частину та корені. Активно переміщується по всіх органах рослини і накопичується в меристематичних зонах (точках росту) та коренях. Порушує процеси метаболізму та різко скорочує надходження в рослину азоту, фосфору та калію, а також водний обмін, що і викликає в'янення рослини. Препарат діє як інгібітор росту.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ УЛЬТРА ПЛЮС, KE:

Найчутливіші бур'яни	Середньочутливі бур'яни	Стойкі бур'яни
<ul style="list-style-type: none"> • абутилон Теофраста • амброзія полинолиста • бурачок шорсткий • гикавка сіра • гірчиця польова • гризички звичайні • дворядник тонколистий • жовтушник розчепірений • кардарія крупковидна • кучерявець Софії • лобода біла • мак дикий 	<ul style="list-style-type: none"> • нетреба колюча • рижій дрібноплідний • ріпак (падалиця) • ріпиця багаторічна • редька дика • соняшник однорічний • сухоребрик Льозелів • талабан польовий • хориспора ніжна • хрінниця смердюча • щиряця загнута 	<ul style="list-style-type: none"> • берізка польова • осот жовтий • осот рожевий
<ul style="list-style-type: none"> • гірчак шорсткий • гірчак березковидний • жовтозілля весняне • жабрій (види) • зірочник середній • полин звичайний • рутка лікарська • роман польовий • ромашка (види) • смілка звичайна • фіалка польова 		

ГЕРБІЦИД УЛЬТРА ПЛЮС, KE ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб і строки застосування	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кількість обробок
Пшениця озима, ячмінь ярий	Однорічні та деякі багаторічні двосім'ядольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі кущення – до виходу в трубку культури	0,6-0,8	1
Кукурудза		Обприскування посівів у фазі 3-5 листків у культури	0,7-0,8	

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ УЛЬТРА ПЛЮС, KE:

Наскільки швидко гербіцид може подіяти на бур'ян?

Видимі симптоми гербіцидної дії з'являються через 15-20 годин після обробки, повна загибель – через 2-3 тижні.

Коли доцільно застосувати гербіцид Ультра Плюс, KE?

Обробку препаратом необхідно проводити в момент активного росту бур'янів: у фазі 2-10 листочків у однорічних, та 15-20 см (фаза розетки) у багаторічних.

Як візуально можна визначити дію препарату?

Симптоми дії препарату: пагони, листя та стебла бур'янів потовщуються, згинаються та скручуються. Листя стає гофрованим, утворюються тверді нарости та тріщини на листках та стеблах.

Чи можна застосовувати препарат Ультра Плюс, KE в бакових сумішах з іншими препаратами?

З метою підсилення гербіцидної дії препарату можливе використання його в сумішах з іншими гербіцидами, що використовуються в посівах зернових культур. Препарат також можна використовувати в бакових сумішах з фунгіцидами, інсектицидами, регуляторами росту рослин та рідкими добривами. Підбір компонентів в бакових сумішах здійснюється цілеспрямовано, з врахуванням видового складу та чисельності бур'янів в посівах. При приготуванні бакових сумішей гербіцидів необхідно провести попередній тест на їх сумісність в невеликій ємності.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

4 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування Від +8°C до +25°C		Приготування робочого розчину 200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування Не слід проводити обробку відразу після заморозку, або при очікуванні заморозків в ніч після обробки.		Погодні умови в період застосування Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб і строки застосування	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кількість обробок
Жито			0,6-0,8	1
Овес, просо, сорго	Однорічні двосім'ядольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі кущення культури	0,6-0,7	

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Пшениця, ячмінь: Ультра Плюс, KE (0,4-0,6 л/га) + Меркурій, ВГ (10-15 г/га)
- Кукурудза: Ультра Плюс, KE (0,5-0,6 л/га) + Канцлер, ВГ (10 г/га)
- Кукурудза: Ультра Плюс, KE (0,5-0,6 л/га) + Крейсер, ВГ (40-50 г/га)
- Кукурудза: Ультра Плюс, KE (0,5-0,6 л/га) + Нікоміл, МС (0,7-1,0 л/га)
- Землі несільськогосподарського призначення: Ультра Плюс, KE (0,5-0,6 л/га) + Аболір, РГ (1,0-1,5 кг/га)



Professional
Професійна серія
Футорин®, ВГ

ГЕРБИЦИД СИСТЕМОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ В ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ, ЯЧМЕНЮ ТА КУКУРУДЗИ (У ТОМУ ЧИСЛІ СТІЙКИХ ДО 2,4-Д ТА 2М-4Х)



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

дикамби натрієва сіль, 600 г/кг + тифенсульфурон-метил, 60 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:

гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ:

2,5 кг фольгований пакет (10 пакетиків по 250 г)

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Не має аналогів
- Ефект дії від +6°C до +25°C
- Без післядії

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Препарат складається з двох діючих речовин, які у вдалому поєднанні доповнюють одна одну. Діюча речовина тифенсульфурон-метил належить до класу сульфонілсечовин і діє як інгібітор активності ацетолактатсинтези (АЛС). Потрапляючи у рослини через листя, стебла та корені, вона активно пересувається через флоему та ксилему до точок росту, припиняючи поділ клітин, ріст пагонів та коренів. Діюча речовина дикамба належить до класу синтетичних ауксинів. Поглинаючись листками та корінням рослин, вона швидко розподіляється по тканинах і діє як інгібітор росту.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБИЦИДУ ФУТОРИН, ВГ:

Абутилон Теофраста, амброзія полинолиста, березка польова, вероніка (види), вика посівна, волошка синя, гірчиця чорна та польова, гірчак (види), гібіскус трійчатий, грицики звичайні, жабрій (види), зірочник середній, комеліна (види), кропива (види), курай, лобода біла, лобода гібридна, лутига розлога, мак дикий, незабудка польова, нетреба (види), осот польовий (рання стадія), підмаренник чіпкий, портулак городній, редька (види), роман собачий, ромашка (види), рутка лікарська, соняшник однорічний, спориш, талабан польовий, фіалка (види), цибуля польова, щиріця (види), щавель (види).

ГЕРБИЦИД ФУТОРИН, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норми витрати препарату, кг/га	Строки обробки
Озима пшениця, ячмінь ярий	0,15-0,2	Обприскування посівів від фази кущення культури і до виходу в трубку
Кукурудза	0,2-0,25	У фазі 3-5 листків культури

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ФУТОРИН, ВГ:

Яких умов слід уникати під час використання препарату?

При використанні гербіциду Футорин, ВГ забороняється:

- застосування на полях кукурудзи протягом 14 днів до чи після обробки фосфорорганічними інсектицидами;
- проводити обробку, якщо культура сильно ушкоджена хворобами, шкідниками, посухою та спекою;
- проводити обробку, якщо культура мокра від роси чи дощу.

Яка швидкість дії цього препарату?

Швидкість дії препарату складає 3-7 діб з моменту його застосування.

Який період захисної дії препарату Футорин, ВГ?

Препарат володіє гербіцидним ефектом по відношенню до двосім'ядольних бур'янів впродовж вегетації культури за умови відсутності наступної хвилі бур'янів.

Яких правил необхідно дотримуватись для досягнення високої біологічної ефективності від застосування препарату Футорин, ВГ?

Гербіцид необхідно застосовувати у суху погоду. Дощ протягом 2-3 годин після застосування може знизити ефективність препарату. Слід пам'ятати, що максимальна ефективність препарату досягається при застосуванні його в ранні фази розвитку: 2-4 листків для однорічних рослин та фаза розетки для багаторічних бур'янів. При застосуванні препарату в більш пізні фази розвитку бур'янів його ефективність може помітно знижуватись.

Для підвищення ефективності

Якщо посіви зріджені, за високої чисельності та наявності стійких бур'янів, а також в жарку, суху погоду, слід обов'язково використовувати поверхнево-активну речовину Флокс, РК, що покращує змочування бур'янів робочим розчином і, таким чином, покращує гербіцидний ефект.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний). Малотоксичний для теплокровних. Малонебезпечний для риби та птахів. Нетоксичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від -10°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C Забороняється використання препарату при температурі нижче +6°C і вище +25°C	200-400 л/га. В разі наявності високого рівня забур'яненості потрібно застосовувати максимальну норму витрати робочої рідини
	Погодні умови в період застосування Гербіцид необхідно застосовувати у суху погоду. Умовою ефективною дії препарату є відсутність опадів після обприскування протягом 2-3 годин. Не проводити внесення по мокрим від дощу чи роси рослинам	

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Кукурудза: Футорин, ВГ (0,15 кг/га) + Нікоміл, МС (0,7-1,0 л/га)
- Кукурудза: Футорин, ВГ (0,15 кг/га) + Крейсер, ВГ (40-50 г/га)



Гербіциди

Professional
Професійна серія
Хантер®, РК

**ГЕРБИЦИД СИСТЕМНОЇ ТА ҐРУНТОВОЇ ДІЇ
ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ ТА
ЗЛАКОВИХ БУР'ЯНІВ У ПОСІВАХ ГІБРИДІВ
СОНЯШНИКУ, СТІЙКИХ ДО ДІЮЧИХ
РЕЧОВИН ГРУПИ ІМІДАЗОЛІНОНИ.**



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
імазапір, 15 г/л + імазамокс, 33 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Знищення як злакових, так і двосім'ядольних бур'янів
- Одна обробка за сезон
- Контроль вовчка соняшникового
- Добра ґрунтова дія на наступні хвилі сходів бур'янів
- Висока ефективність при застосуванні в мінімальній та нульовій системах обробки ґрунту

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діючі речовини імазапір та імазамокс в короткий термін поглинаються через листя та проникають через кореневу систему рослини. Імазапір та імазамокс потрапляють через ксилему і флоему, діючи як інгібітор ензиму ацетогідроксиацидсинтазу (AHAS) або ацетолактатсинтазу (ALS). AHAS є каталізатором амінокислот: валіну, лейцину та ізолейцину. Вказані амінокислоти є головними для білків, необхідних для росту рослинних клітин. Інгібування AHAS діючими речовинами групи імідазолінони сприяють зниженню синтезу цих амінокислот, які в свою чергу призводить до загибелі бур'янів.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБИЦИДУ ХАНТЕР, РК:

Абутилон Теофраста (*Abutilon theophrasti Medicus*), амброзія, види (*Ambrosia spp.*), берізка польова (*Convolvulus arvensis*), вівсюг звичайний (*Avena fatua*), вовчок (*Orobanche Cumanana*), гірчак березковидний (*Polygonum convolvulus*), гірчиця польова (*Sinapis arvensis*), грицики звичайні (*Capsella bursa-pastoris*), жабриї звичайний (*Galeopsis tetrahit*), зірочник середній (*Stellaria media*), лобода біла (*Chenopodium album*), мишій, види (*Setaria spp.*), молочай, види (*Euphorbia, spp.*), нетреба звичайна (*Xanthium strumarium*), осот жовтий (*Sonchus arvensis*), осот рожевий (*Cirsium arvense*), паслін чорний (*Solanum nigrum*), підмаренник чіпкий (*Galium aparine*), просо куряче (*Echinochloa crus-galli*), просо, види (*Panicum spp.*), редька дика (*Raphanus raphanistrum*), ромашка, види (*Matricaria spp.*), рутка лікарська (*Fumaria officinalis*), талабан польовий (*Thlaspi arvense*), щириця, види (*Amaranthus spp.*).

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати препарату, л/га	Спосіб і строки застосування
Соняшник (гібриди стійкі до даного гербициду)	Злакові та двосім'ядольні бур'яни	1,0-1,2	Обприскування у фазі 4 листків культури та на початкових фазах розвитку бур'янів

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ХАНТЕР, РК:

Чи можна застосовувати гербицид Хантер, РК в сумішах з добривами для позакореневого підживлення або додавати аміачну селітру для покращення дії препарату?

Ні. При застосуванні робочого розчину даного гербициду в суміші з мінеральними добривами відбувається більш швидке поглинання діючих речовин, що може привести до фітотоксичності.

Протягом якого часу робочий розчин придатний для використання?

Протягом однієї доби, необхідно його ретельно перемішати перед застосуванням.

Чи має значення жорсткість води при приготуванні робочого розчину?

Іони Са ++ мають буферну здатність, тому жорсткість води в даному випадку не є проблемою, при використанні м'якої води слід застосовувати мінімальну норму витрати препарату – 1 л/га.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Після застосування гербициду Хантер, РК важливо дотримуватись наступного чергування культур у сівозміні: без обмежень (гібриди соняшнику, гібриди ріпаку стійкі до діючих речовин групи імідазолінонів); через 4 місяці (пшениця, жито); через 9 місяців* (кукурудза, ячмінь**, овес, рис, соняшник, соя, горох, боби, сорго); через 18 місяців (овочі, картопля); через 24 місяці (цукрові та кормові буряки, ріпак, гречка, просо, інші культури).

* коли рН ґрунту вище 6,2 і сума опадів більша ніж 200 мм.

** якщо сума опадів менша ніж 200 мм і рН нижче 6,2, існує небезпека прояву фітотоксичності, негативні наслідки якої можуть бути знижені за рахунок механічного обробітку ґрунту на глибину не менше 15 см.

За недостатньої кількості опадів та перебування поверхневого шару ґрунту протягом літа в сухому стані, можливе пригнічення озимої пшениці та озимого жита. Слід уникати використання пестицидів групи ALS інгібіторів у попередніх полях та наступній культурі (сульфонілсечовини та інші).

Препарати з групи імідазолінони не повинні використовуватись на одному полі частіше ніж один раз на три роки.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний). Небезпечний для водних організмів. Препарат помірно токсичний для теплокровних.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування
	У дні з високою температурою, обприскування бажано проводити у вечірні години або вранці. При стандартному застосуванні препарат стійкий до змивання дощем через годину після обприскування.		Не проводити внесення при швидкості вітру понад 3-4 м/с



Гербициди



Standard
Стандартна серія

Шквал®, KE

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ БУР'ЯНІВ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА: хізалопф-П-етил, 125 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ: 20 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Повне знищення однорічних та багаторічних злакових бур'янів
- Застосування незалежно від фази розвитку культури
- Ефективність навіть при помірно низьких температурах (+10 °C)
- Швидкість поглинання діючої речовини

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина препарату проникає в рослину через листки та стебла і пересувається по ній через флоему та ксилему до точок росту. Препарат знищує як надземну, так і підземну (кореневу) частину злаків, запобігаючи відростанню багаторічних видів. Не викликає фітотоксичності у культурних рослин, на яких рекомендований до застосування. Гербіцид знищує тільки ті бур'яни, які були в посівах на момент обробки.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ШКВАЛ, KE:

Однорічні злакові: бромус розчепірений, вівсюг звичайний, канаркова трава короткоколоса, плоскуха звичайна, лисохвіст лучний, метлюг білий, миші сизий, миші зелений, пальчатка кровоспиняюча, падалиця зернових, пажитниця однорічна, тонконіг однорічний. Багаторічні злакові: гумай (сорго алепське), очерет звичайний, польовиця біла, пирій повзучий, свинорий пальчастий, тонконіг звичайний. На двосім'ядольні бур'яни препарат не діє.

ГЕРБІЦИД ШКВАЛ, KE ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб і строки застосування	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кратність обробок
Буряки цукрові, соняшник, соя	Однорічні злакові	Обприскування посівів у фазу 2-4 листків у бур'янів (незалежно від фази розвитку культури)	0,4-0,8	1
Ріпак ярий та озимий	Багаторічні злакові (пирій)	Обприскування посівів при висоті пір'ю 10-15 см (незалежно від фази розвитку культури)	0,8-1,2	



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Слід уникати використання максимальних норм витрат препарату Шквал, KE на соняшнику та ріпаку за несприятливих погодних умов (екстремально високі температури та ін.): рекомендуємо знижувати максимальну норму застосування препарату до 0,8 л/га та застосовувати більше робочої рідини - до 300 л/га - для зниження концентрації робочого розчину. При застосуванні препарату в бакових сумішах з гербіцидами проти двосім'ядольних бур'янів за несприятливих погодних умов можливе зниження дії на злакові бур'яни (пирій, види проса, та деякі інші).

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ШКВАЛ, KE:

Яка швидкість дії гербіциду Шквал, KE?

Дія препарату на злакові бур'яни проявляється через 5-10 днів після обробки, повна загибель їх відбувається через 7-20 днів (залежно від видового складу бур'янів та погодних умов).

Яких вимог треба дотримуватись для досягнення максимальної ефективності від внесення препарату?

Слід пам'ятати, що норма витрати препарату та ефективність гербіцидної обробки буде залежати від чисельності та видового складу бур'янів, стану посівів культурних рослин. Найвищий рівень гербіцидної дії (до 95%) досягається при обробці посівів в період активного розвитку бур'янів: від фази 2-4 листків до початку кушення для однорічних бур'янів, та при висоті до 10 см у багаторічних бур'янів. Обов'язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясне змочування рослин під час проведення внесення препарату.

Яких дій треба уникати при використанні цього препарату?

- Забороняється проводити обприскування при швидкості вітру більше 3-4 м/с, а також коли культура пошкоджена хворобами, шкідниками або знаходиться у стресовому стані під дією вітру, морозу чи внесених раніше гербіцидів.
- У дні з високою температурою обприскування бажано проводити у вечірні години або вранці.
- Для досягнення високої ефективності препарату після обприскування протягом 6 годин не повинні випадати атмосферні опади.

Наскільки ефективним буде використання препарату Шквал, KE при прохолодних погодних умовах?

Завдяки тому, що діюча речовина хізалопф-П-етил належить до складних органічних ефірів (арилоксифеноксипропіонатів), вона відрізняється підвищеною легкістю та рухливістю у рослинах. Це обумовлює високу ефективність препарату в умовах більш низьких температур порівняно з діючими речовинами інших хімічних груп.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

II клас небезпечності (малотоксичний). Малотоксичний для ссавців, риб і бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		200-400 л/га. В разі високого рівня забур'яненості потрібно застосовувати максимальну норму витрати робочого розчину.
	Погодні умови в період застосування		
	Забороняється проводити обприскування при швидкості вітру більше 3-4 м/с, а також коли культура пошкоджена хворобами, шкідниками, або знаходиться у стресовому стані під дією вітру, морозу чи внесених раніше гербіцидів.		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб і строки застосування	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кратність обробок
Томати, цибуля, морква, капусти	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування посівів у фазі 2-4 листків у бур'янів незалежно від фази розвитку культури	0,4-0,8	1
Картопля	Однорічні та багаторічні злакові бур'яни, в т. ч. пирій повзучий	Обприскування посівів у фазі 2-4 листків у однорічних бур'янів і висоті пір'ю 10-15 см незалежно від фази розвитку культури	0,6-1,2	
Томати, цибуля, морква, капусти	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування посівів за висоти бур'янів 10-15 см незалежно від фази розвитку культури	0,8-1,2	1
Льон-довгунець	Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	Обприскування посівів у фазі «ялинки» культури (за висоти пір'ю повзучого 10-15 см.)	0,8-1,2	

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту столових і кормових буряків, огірків, кавунів, гороху, конопель.

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Буряки цукрові: Шквал, KE (0,6-1,2 л/га) + Леґіон, ВГ (0,12-0,2 кг/га)





Standard
Стандартна серія

Юпітер®, РК

ГЕРБИЦИД СИСТЕМОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ ДВОСИМ'ЯДОЛЬНИХ ТА ЗЛАКОВИХ БУР'ЯНІВ У ПОСІВАХ ГОРОХУ ТА СОЇ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
імазетапір, 100 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикової каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Одна обробка за сезон
- Тривала дія
- Застосування до сходів культури або по вегетації
- Широкий діапазон температур

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина гербициду поглинається коренями та листками рослин, переміщується по флоємі та ксилемі і накопичується в меристематичних тканинах. Імазетапір знижує активність ферментів ацетолактатсинтетази та ацетогідроксилази з подальшим порушенням синтезу валіну, лейцину та ізолейцину, порушення синтезу ДНК, що призводить до зупинки поділу клітин та росту рослин.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБИЦИДУ ЮПІТЕР, РК:

Гербицид використовується для пригнічення та знищення широкого спектру злакових та двосім'ядольних бур'янів.

Злакові:	Двосім'ядольні	
<ul style="list-style-type: none"> • гумай (сорго алепське) • мишій зелений • пальчатка кровоспиняюча • пальчатка лінійна • плоскуха звичайна • просо посівне • сить бульбонсна • сить їстівна 	<ul style="list-style-type: none"> • амброзія полинолиста • галінсога дрібноkwіткова • гірчак березко видний • гірчиця (види) • гречка посівна • гриздики звичайні • дурман звичайний • зірочник середній • кропива глуха 	<ul style="list-style-type: none"> • кропива дводомна • кучерявець Софії • лобода (види) • молочай болотний • молочай плямистий • нетреба звичайна • осот польовий • паслін чорний • підмаренник чіпкий • повитиця польова • портулак городній • редька дика • рутка лікарська • соняшник однорічний • сурипиця звичайна • сухоребрик • талабан польовий • хрінниця віржинська • хрінниця польова • чорношкір звичайний • щавель горобиний • щавель кучерявий • щиряця (види) • якріці сланкі

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербицидів"

ГЕРБИЦИД ЮПІТЕР, РК ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб і строки застосування	Норма витрати препарату, л/га
Соя	Злакові та однорічні двосім'ядольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, до появи сходів або по сходах у фазі 2-3 справжні листки	0,5-1,0
Горох			0,5-0,75

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЮПІТЕР, РК:

Як правильно провести обробку препаратом Юпітер, РК при досходовому застосуванні? При досходовому застосуванні препаратом можна провести обробку шляхом наземного обприскування до або після посіву культури. Передпосівна обробка препаратом здійснюється у добре оброблений ґрунт з загортанням у шар до 6 см під культивуацію. Післяпосівна обробка проводиться протягом 2-3 днів після посіву культури.

Від чого залежить ефективність дії гербициду Юпітер, РК? Слід пам'ятати, що ефективність гербицидної обробки залежатиме від чисельності та видового складу бур'янів, стану посівів культурних рослин; обов'язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясне змочування рослин під час проведення внесення препарату. Застосовувати препарат тільки за рекомендаціями. Обробку посівів проводити своєчасно в ранні фази розвитку бур'янів (до 4 справжніх листків). Для збереження «гербицидного екрану» не проводити міжрядних культивацій протягом 2-3 тижнів після обробки.

Який період захисної дії препарату? Препарат ефективний впродовж всього вегетаційного періоду за відсутності другої хвилі бур'янів.

Яка швидкість дії гербициду Юпітер, РК? Гербицид починає діяти відразу після внесення, відмирання рослин відбувається в період від 2 до 8 тижнів.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Культури, які можна вирощувати в наступному році на площах, де раніше застосовувався гербицид Юпітер, РК: Після збирання врожаю та глибокого обробітку ґрунту можна сіяти такі культури: бобові, люцерну, конюшину, озиму пшеницю, жито, яру пшеницю, кукурудзу; через 1,5 року після обробки препаратом – соняшник, картоплю, жито, овочеві культури та однорічні трави; через 2 роки після обробки – цукровий та кормовий буряк, озимий та ярий ріпак. Після застосування гербициду не можна вносити препарати з групи сульфонілсечовина та імідазолінів протягом всієї вегетації культур і навіть пізньої осені. Не можна застосовувати у бакових сумішах з протизлаковими гербицидами.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний). Малотоксичний для ссавців, риб і бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +1°C до +30°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування
	Умовою ефективною дії препарату є відсутність опадів після обприскування протягом 6 годин. У дні з високою температурою обприскування бажано проводити у вечірні години або вранці.		Не проводити внесення при швидкості вітру понад 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб і строки застосування	Норма витрати препарату, л/га
Люцерна (безпокровна)	Злакові та однорічні двосім'ядольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, до появи сходів культури або після появи сходів у фазі 1-2 трійчастих листків культури. Або через 7-10 днів після першого покосу (не частіше 1 разу на 3 роки на одному полі).	1,0
Люпин		Обприскування посівів у фазі 2-3 справжніх листків	0,4-0,5
Соняшник (гібриди, стійкі до гербицидів групи імідазолінонів)		2-3 пари справжніх листків культури	0,8-1,0

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Соя: Юпітер, РК (0,5 л/га) + Ефес, РК (2,0 л/га)





Standard
Стандартна серія

Альтекс®, KE

КОНТАКТНО-ШЛУНКОВИЙ ІНСЕКТИЦИД ДЛЯ БОРОТЬБИ З ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ШКІДНИКІВ РОСЛИН

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: альфа-циперметрин, 100 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ: 1 л, 5 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Миттєва дія та надійний ефект
- Знищення широкого спектру шкідників
- Незалежність від стадій розвитку комах
- Зберігання високих показників врожаю
- Можливість авіавнесень

МЕХАНІЗМ ТА СПЕКТР ДІЇ:

Інсектицид має контактно-шлункову дію, застосовується для захисту пшениці, гороху, цукрових буряків, капусти, ріпаку, картоплі, яблуні, земель несільськогосподарського призначення та лісових насаджень від найнебезпечніших шкідників.

Активний компонент препарату альфа-циперметрин, як і всі синтетичні піретроїдні сполуки, спричиняє загибель шкідників через сильне збудження нервових клітин комах з наступним проявом паралічу електричної активності центральної та периферійної нервової системи.

ІНСЕКТИЦИД АЛЬТЕКС, KE ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Строки обробки	Максимальна кратність обробок
Пшениця	П'явиці, клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс, попелиці, блішки, цикадки	0,1-0,15	Обприскування в період вегетації	2
		0,1-0,15 (авіа)		
Горох	Зернівка горохова, трипси, попелиці	0,15-0,25		
Буряки цукрові	Лучний метелик, попелиці, блішки, довгоносики	0,1-0,25		
		0,1-0,15 (авіа)		
Капуста	Міль, совки, білани	0,1-0,15		
Ріпак	Ріпаківий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, цикадки	0,1-0,15		
Яблуна	Плодожерки, листовійки, попелиці	0,15-0,25		
Землі несільськогосподарського призначення (дика рослинність, узбіччя доріг)	Саранові	0,2		
Лісові насадження	Золотогуз, шовкопряди	0,05-0,1		

Строки виходу для проведення механізованих робіт – 4 дні, ручних – 10 діб.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АЛЬТЕКС, KE:

Як правильно обрати оптимальну норму витрати препарату для обробки?

Максимальна норма витрати відповідає ефективності препарату 80-95%, мінімальна – 60-70% за умов високоякісної організації і вчасного внесення препарату. Для досягнення високої ефективності в боротьбі зі шкідниками обробку рослин препаратом необхідно починати при чисельності шкідників, що відповідає економічному порозу шкодочинності. У разі виявлення в посівах чисельності шкідників, при якій можливе зниження врожаю більше 25%, заздалегідь планують повторні обробки.

Якою мірою препарат токсичний для бджіл?

Препарат має репелентні та антифідінгові властивості по відношенню до корисних комах. У зв'язку з цим, після обробки інсектицид безпечний для медоносних бджіл.

Чи має інсектицид фітотоксичну дію?

Фітотоксичні властивості у препарату відсутні, при його використанні некротичні плями на листках капусти та плодах яблуні не спостерігаються. Тому даний інсектицид є оптимальним препаратом для захисту капусти та яблуні впродовж всього періоду вегетації.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

II клас (помірнотоксичний). Помірнотоксичні для ссавців та риб.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.


ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +1°C до +35 °C

Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
Від +12°C до +25°C	На польових культурах та землях несільськогосподарського призначення – 200-400 л/га; у садах – 600-800 л/га. При проведенні обприскування авіаційним методом – 50 л/га
Погодні умови в період застосування	
У спекотливі дні обприскування бажано проводити у вечірні години або вранці	

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб та час обробки, обмеження	Максимальна кратність обробок
Люцерна (насіневі посіви)	Саранові, попелиці, довгоносики, клопи	0,05-0,1	Обприскування в період вегетації	2
Льон-довгунець	Блішки	0,1-0,15	Обприскування сходів	
Зернові колосові (ячмінь)	П'явиці, клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс, попелиці, блішки, цикадки	0,1-0,15	Обприскування в період вегетації	
Виноград	Листовійка, листова філоксера	0,24-0,36	Обприскування в період вегетації	
Незавантажені складські приміщення	Шкідники запасів	0,2 мл/м ²	Обробка вологим способом (200 мл роб. розчину/1 м ² допуск людей через 20 днів)	

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту шипшини, гірчичі, тютюну.





Professional
Професійна серія

Дестрой®, КС

СИСТЕМНИЙ ІНСЕКТИЦИД КОНТАКТНО-ШЛУНКОВОЇ ДІЇ ДЛЯ БОРТЬБИ З ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ШКІДНИКІВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

імідаклоприд, 250 г/л + лямбда-цигалотрин, 80 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:

1 л, 5 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Висока швидкість дії
- Тривалий захисний період
- Репелентний ефект
- Відсутність резистентності шкідників до препарату
- Ефективна дія навіть від +10°C

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Системний інсектицид контактної-шлункової дії для боротьби з широким спектром шкідників на пшениці, ріпаку та яблуні.

Одна з діючих речовин імідаклоприд швидко поглинається рослинами та переноситься по них акропетально. Імідаклоприд діє як антагоніст постсинаптичних нікотинових рецепторів, з наступним руйнуванням центральної нервової системи комах. Діюча речовина лямбда-цигалотрин належить до класу синтетичних піретроїдів. Лямбда-цигалотрин має контактну-кишкову дію та репелентні властивості. При потраплянні в організм шкідників впливає на нервову систему, порушуючи діяльність нейронів шляхом взаємодії з натрієвим каналом. Симптоми дії проявляються у вигляді сильного збудження нервової системи, судом кінцівок, з наступним паралічем та загибеллю комах.

ДЕСТРОЙ, КС ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідник	Норма витрати препарату, л/га	Строки обробки	Строк останньої обробки до збирання врожаю, днів	Максимальна кратність обробок
Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, трипси, п'явиці, попелиці	0,1-0,15	Обприскування в період вегетації	30	1
Ріпак ярий та озимий	Ріпаківий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, попелиці				2
Яблуня	Яблунева плодожерка, листовійки, каліфорнійська щитівка, попелиці				

Проведення механізованих робіт – 4 доби, ручних робіт – 10 діб.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ДЕСТРОЙ, КС:

У чому полягає унікальність цього препарату?

Поєднання у препараті системної та контактної діючих речовин з різних хімічних родин дозволяє:

- значно розширити спектр дії проти шкідників
- забезпечити довготривалий захисний ефект і одночасно скоротити строк очікування після внесення препарату
- уникнути резистентності шкідників до препарату

Чи впливає температура та вологість повітря на ефективність препарату?

Інсектицид застосовується у широкому інтервалі температур та вологості повітря. Для виявлення системних властивостей препарату температура має бути не менше +10°C.

Чи має інсектицид фітотоксичну дію?

За умов дотримання регламентів та норм застосування препарату проявів фітотоксичності не спостерігається.

Чи можна використовувати препарат у бакових сумішах з іншими препаратами?

Препарат сумісний з більшістю препаратів, проте перед приготуванням бакової суміші необхідно провести пробне змішування. Бакову суміш слід використовувати відразу після приготування.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

II клас небезпечності (малотоксичний). Препарат токсичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +5°C до +25°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		На польових культурах: 200-400 л/га У яблуневих садах: 800-1000 л/га
	Погодні умови в період застосування		
Забороняється проводити обприскування при швидкості вітру більше 3-4 м/с			

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Препарати з аналогічними діючими речовинами використовують для захисту сої, кукурудзи, цукрових буряків, виноградників, картоплі, томатів, гороху, капусти, сорго, соняшнику.



Зелена яблунева попелиця



Клоп шкідлива черепашка



Ріпаківий квіткоїд





Standard
Стандартна серія

Ін Сет, ВГ

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ, ТА ОДИН З НАЙБЕЗПЕЧНИШИХ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, КОНТАКТНО-ШЛУНКОВИЙ ІНСЕКТИЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ПРОТИ ШИРОКОГО СПЕКТРУ ШКІДНИКІВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: імідаклоприд, 700 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ: 1 кг фольгований пакет (10 пакетиків по 100 г)

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Тривала захисна дія
- Незалежність від стадій розвитку шкідників
- Високі системні властивості
- Відсутність резистентності шкідників до препарату

МЕХАНІЗМ ТА СПЕКТР ДІЇ:

Системний інсектицид з контактною та шлунковою дією для боротьби з широким спектром шкідників в посівах основних сільськогосподарських культур. Діюча речовина препарату швидко поглинається рослинами та поширюється по них акропетально. Імідаклоприд діє як антагоніст постсинаптичних нікотинових рецепторів, з наступним руйнуванням центральної нервової системи комах, внаслідок чого шкідники гинуть.

ІНСЕКТИЦИД ІН СЕТ, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:



Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, кг/га	Строки обробки	Строк останньої обробки до збирання врожаю, днів	Максимальна кратність обробок
Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка	0,1	Обприскування в період вегетації	30	1
	Попелиці, п'явиці, трипси	0,05-0,07			
Ріпак ярий та озимий	Ріпаківий квіткоїд, хрестоцвітні блішки, попелиці	0,05-0,07		30	1
Яблуня	Каліфорнійська щитівка, яблунева плодожерка, попелиці	0,07		30	2
Виноград	Виноградна листовійка, листова форма філоксери	0,07	30	1	

Проводити механізовані роботи дозволяється через 1 добу, ручні роботи – 3 доби.



Зелена яблунева попелиця



Клоп шкідлива черепашка



Ріпаківий квіткоїд

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ІН СЕТ, ВГ:

У чому полягає унікальність цього препарату?

Завдяки системним властивостям препарат має особливо високу ефективність в обмеженні шкодочинності комах з сисним ротовим апаратом. При цьому препарат використовується з низькими нормами витрати, при яких ризики забруднення навколишнього природного середовища мінімальні.

Чи впливає температура та вологість повітря на ефективність препарату?

Інсектицид застосовується у широкому інтервалі температур та вологості повітря, ефективність його дії менше залежить від цих факторів.

Чи має інсектицид фітотоксичну дію?

Фітотоксичні властивості у препарату відсутні, при його використанні некротичних плям на плодах яблуні не спостерігається. Тому даний інсектицид є оптимальним препаратом для захисту яблуні від каліфорнійської щитівки та попелиці впродовж всього періоду вегетації.

Чи можна використовувати препарат у бакових сумішах з іншими препаратами?

Препарат сумісний з більшістю препаратів, проте перед приготуванням бакової суміші необхідно провести пробне змішування. Бакову суміш слід використовувати відразу після приготування.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (помірнотоксичний). Препарат токсичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від -10°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		На польових культурах: 200-400 л/га У яблуневих садах та на виноградниках: 800-1000 л/га
	Погодні умови в період застосування		
	Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с		


СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб та час обробки, обмеження	Максимальна кратність обробок
Зернові культури (ячмінь ярий)	Злакові мухи, п'явиці, блішки, клоп шкідлива черепашка	0,045-0,05	Обприскування в період вегетації	1
Томати, баклажани	Колорадський жук, попелиці, трипси	0,045-0,05		
Цибуля	Попелиці, трипси	0,045-0,05		
Томати, огірки закритого ґрунту	Попелиці, білокрилка теплична, трипси	0,05-0,07		
Хміль	Попелиця хмельова	0,17	вручну методом мазка	Обприскування в період вегетації
Буряки цукрові	Комплекс сисних шкідників	0,09		
Соя	Акацієва вогнівка, трипси та інші сисні шкідники	0,07		

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту груш, слив.

РЕКОМЕНДОВАНІ БАКОВІ СУМІШІ:

- Ін Сет, ВГ (50-70 г/га) + Альтекс, КЕ (0,1 л/га)



Standard
Стандартна серія
Ріфос®, KE

**ІНСЕКТИЦИД ШИРОКОГО СПЕКТРУ ДІЇ
ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ШКІДНИКІВ З ГРИЗУЧИМ І
ЧАСТКОВО З КОЛЮЧЕ-СИСНИМ РОТОВИМ
АПАРАТОМ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ: 10 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Контактно-шлункова дія
- Фумігантні та репелентні властивості
- Діє на дорослих особин та личинки у будь-якій стадії розвитку
- Знищення кліщів, стійких до диметоату
- Відмінна дія на комах, що ведуть скритний спосіб життя (листовійки, мінуючи молі)

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Хлорпірифос відноситься до класу фосфорорганічних сполук (ФОС), які є речовинами нервовопаралітичної дії. Механізм дії пов'язаний з пригніченням активності естераз, насамперед ацетилхолінестерази (АХЕ), яка грає важливу роль в передачі нервового імпульсу. За умов блокування цього ферменту пестицидом вільний ацетилхолін накопичується в синаптичній щілині, і нормальне проходження нервових імпульсів порушується - в результаті настає тремор (судорожна активність м'язів), що переходить в параліч.

Циперметрин належить до класу піретроїдів, яким притаманна відносна фотостабільність, селективна токсичність з урахуванням метаболічної деградації. Це інсектициди контактнотшлункової дії з високою початковою біологічною активністю. Механізм дії пов'язаний з порушенням процесу обміну іонів натрію, деполарізацією мембрани. Діюча речовина пролонгує відкриття каналів для натрію, порушує обмін йонів кальцію, що призводить до виділення великої кількості ацетилхоліну при проходженні нервового імпульсу через синаптичну щілину.

СПЕКТР ДІЇ ІНСЕКТИЦИДУ РІФОС, KE:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Строки обробки	Строк останньої обробки до збирання врожаю, днів	Максимальна кратність обробок
Пшениця	Клоп шкідлива черепашка, трипси, п'явиці, злакова попелиця, хлібні жуки, хлібна жужелиця	0,75-1,0	Обприскування культур за наявності шкідників в період вегетації	30	1
Ріпак	Прихованохоботники	0,5-0,6		30	2
Яблуна	Плодожерки, листовійки, молі, кліщі, попелиці	1,0-1,5		30	2

* Інтервал між обробками залежить від швидкості появи нової хвилі шкідників та може складати 15-20 днів, залежно від кліматичних умов, що склалися.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Ріфос, KE не можна використовувати у спекотні дні (з температурою понад +25°C)!

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ РІФОС, KE:

Чи завдає шкоди культурним рослинам використання Ріфос, KE?

Препарат не завдає шкоди культурним рослинам, при умові дотримання регламенту застосування.

Коли найбільш доцільно застосовувати препарат Ріфос, KE?

Для досягнення високої ефективності препарату Ріфос, KE, обробку рослин необхідно починати при чисельності шкідників, що відповідає економічному порозу шкодочинності.

Обприскування пшениці, ячменю та інших культур рекомендується проводити в період вегетації, яблуневі сади – до і після цвітіння.

Обов'язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясне змочування рослин під час внесення препарату.

Чи можна використовувати інсектицид Ріфос, KE у суміші з іншими препаратами?

Препарат можна використовувати у бакових сумішах з іншими препаратами, які мають слабо кисле або нейтральне значення рН. Не змішувати з пестицидами, які мають лужну реакцію (сірчане вапно, мідь тощо). Забороняється використовувати препарат з іншими препаратами, що містять діючі речовини на основі сульфонілсечовин (Гурон, ВГ, Крейсер, ВГ, Футурин, ВГ, Меркурій, ВГ, Апач, ВГ та ін.), а також використання Ріфос, KE до 14 днів після внесення даних препаратів. При використанні препарату з іншими інсектицидами обов'язково провести тест на сумісність.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: II клас (помірнотоксичний). Токсичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування
	Обов'язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясне змочування рослин під час проведення внесення препарату. У дні з високою температурою обприскування бажано проводити у вечірні години або вранці.		Не проводити внесення при швидкості вітру понад 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТИВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Строки обробки	Строк останньої обробки до збирання врожаю, днів	Максимальна кратність обробок
Ячмінь	П'явиці, хлібна жужелиця	0,5-0,75	Обприскування в період вегетації	30	1
Буряки цукрові	Звичайний та сірий буряковий довгоносики, щитоносики	0,8		40	1
Гірчиця	Хрестоцвітні блішки, ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники	0,5-0,6		30	2
Горох	Горохові плодожерка та зернівка, попелиці	1		30	2





Standard
Стандартна серія

Штурм®, ЗП

**КОНТАКТНИЙ АКАРИЦИД, ЩО ВОЛОДІЄ
ВИСОКОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПРИ БОРІТБІ
З РІЗНИМИ ВИДАМИ КЛІЩІВ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
піридабен, 200 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:
змочуваний порошок

УПАКУВАННЯ:
1 кг фольгований пакет (10 пакетиків по 100 г)

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Високоєфективний проти різних видів кліщів
- Знищує білокрилку
- Забезпечує високу швидкість дії
- Має тривалий період захисту

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина препарату піридабен пригнічує біохімічний процес мітохондріального транспорту електронів в клітинах шкідників, має швидкий та довготривалий ефект.

СПЕКТР ДІЇ АКАРИЦИДУ ШТУРМ, ЗП:

Високоєфективний проти широкого спектру видів кліщів, у тому числі:

- кліщ павутинний (*Panonychus* spp., *Tetranychus* spp.);
- кліщ виноградний (*Phyllocopotruta* spp., *Calepitrimerus* spp.);

Препарат також має побічну дію на білокрилку (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*).

АКАРИЦИД ШТУРМ, ЗП ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідники	Норма витрати препарату, кг/га	Строк обробки	Максимальна кратність обробок
Яблуня	Кліщі	0,5-0,9	Обприскування в період вегетації	1
Виноградники				



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ШТУРМ, ЗП:

Чи можна використовувати Штурм, ЗП в бакових сумішах з іншими препаратами?

Для розширення спектру дії препарат можна використовувати в бакових сумішах з усіма традиційними інсектицидами та фунгіцидами, окрім сильно лужних речовин (наприклад, бордоською рідиною). Перед приготуванням бакової суміші необхідно провести пробне змішування. Бакову суміш слід використовувати відразу після приготування.

Як досягти максимальної ефективності від застосування препарату Штурм, ЗП?

Штурм, ЗП – контактний акарицид, тому для досягнення максимального ефекту обов'язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясного змочування рослин під час проведення внесення препарату.

З метою досягнення високої ефективності в боротьбі зі шкідниками, обробку рослин препаратом доцільно починати при чисельності шкідників, яка відповідає економічному порозу шкодочинності.

Як впливає температура повітря на ефективність дії препарату?

Коливання температури суттєво не впливає на ефективність препарату.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний)

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

від -10°C до +40°C



	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +5°C до +25°C		1000 л/га
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування
	Умовою ефективної дії препарату є відсутність опадів після обприскування протягом 3 годин		Не проводити внесення при швидкості вітру понад 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту груші, персиків, огірків, томатів, баклажанів, суніці, чаю, цитрусових, декоративних рослин.

Professional
Професійна серія
Арбалет[®], КС



ФУНГІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ БОРТЬБИ З ХВОРОБАМИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ, ЯЧМЕНЮ ЯРОГО, СОНЯШНИКУ ТА РІПАКУ ОЗИМОГО

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
азоксистробін, 200 г/л + флутріяфол, 120 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Системна, контактна, трансламінарна та фумігантна дія
- Ефективний проти збудників грибних хвороб з чотирьох класів
- Широкий спектр та універсальність застосування - один фунгіцид для багатьох культур
- Довгий захисний період
- Подовжує процес фотосинтезу та уповільнює старіння

МЕХЕНІЗМ ДІЇ:

Завдяки комбінації діючих речовин, препарат системної та трансламінарної дії Арбалет, КС володіє довготривалими захисними та лікувальними властивостями. Діюча речовина азоксистробін при проникненні крізь листову пластинку інгібує проростання спор та апресоріїв, негативно впливаючи на проростання гіфів грибів. Діюча речовина препарату - флутріяфол поглинається листовою поверхнею культури та переноситься по рослині акропетально по ксилемі. Флутріяфол діє як інгібітор біосинтезу ергостеролу грибних організмів, що призводить до руйнування клітинних мембран та зупинки розвитку грибних захворювань.

ФУНГІЦИД АРБАЛЕТ, КС ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб внесення	Кількість обробок
Озима пшениця	Борошниста роса, септоріоз, піренофороз, іржасті хвороби	0,5-0,75	Обприскування в період вегетації	2
Ячмінь ярий	Борошниста роса, сітчастий, смугастий гельмінтоспоріоз, іржасті хвороби			
Соняшник	Фомоз, іржа, несправжня борошниста та борошниста роса, фомопсис	0,6-1,0		
Озимий ріпак	Фомоз, альтернاریоз, біла гниль, пероноспороз, сіра гниль			

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АРБАЛЕТ, КС:

Як готувати робочий розчин фунгіциду Арбалет, КС?

Заповнити бак оприскувача на 1/4-1/3 водою, включити мішалку і додати в оприскувач необхідну кількість препарату, добре струснувши каністру, та долити необхідну кількість води. Внесення слід проводити з включеною мішалкою.

Як швидко слід використати робочий розчин?

Робочий розчин необхідно повністю використати не пізніше ніж через 24 години після приготування.

Сумісність з іншими препаратами:

Фунгіцид Арбалет, КС сумісний з більшістю препаратів. В кожному окремому випадку перед приготуванням бакової суміші необхідно перевірити препарати на сумісність.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +30°C



Іконка	Оптимальні температурні умови застосування	Іконка	Приготування робочого розчину
	Від +15°C до +25°C		200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування Забороняється проводити обприскування при швидкості вітру більше 3-4 м/с		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Препарати з аналогічними діючими речовинами застосовуються для захисту сої, гороху, цукрових буряків.



Альтернاریоз ріпаку



Бура (листова) іржа



Септоріоз листя та колосу пшениці



Сітчаста плямистість ячменю

Professional
Професійна серія
Баліста®, KE

ФУНГІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ БОРТЬБИ З ХВОРОБАМИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ТА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

тебуконазол, 120 г/л + спіроксамін, 300 г/л + дифеноконазол, 30 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ:

5 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Унікальне поєднання трьох компонентів
- Один фунгіцид від декількох хвороб
- Відсутність резистентності
- Найшвидша дія

МЕХЕНІЗМ ДІЇ:

Завдяки наявності трьох діючих речовин які відносяться до різних хімічних класів (тебуконазол та дифеноконазол – азоли, спіроксамін – спірокеталаміни) препарат Баліста, KE інгібує процес деметилування біосинтезу стеролів на різних рівнях що призводить до руйнування клітинних мембран та зупинки розвитку грибних захворювань. Препарат володіє довготривалою захисною та лікувальною дією.

ФУНГІЦИД БАЛІСТА, KE ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб внесення	Кількість обробок
Озима пшениця	Борошниста роса, септоріоз, піренофороз, іржасті хвороби	0,5-0,6	Обприскування в період вегетації	2
Ячмінь ярий	Борошниста роса, сітчастий, смугастий гелмінтоспоріоз, іржасті хвороби			



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ БАЛІСТА, KE:

Коли слід застосовувати фунгіцид Баліста, KE?

Препарат має відмінні лікувальні та викорінюючі властивості, але для максимальної ефективності слід застосовувати його профілактично, або за перших ознак захворювання. Найкращого захисту можна досягти при дворазовій обробці посівів з інтервалом в 14 днів.

За яких умов потрібна повторна обробка?

Повторна обробка потрібна в разі значного ураження хворобами та якщо тривають сприятливі погодні умови для їх розвитку.

Яка швидкість дії препарату?

Препарат повністю проникає в рослину через дві години після застосування.

ВИКОРИСТАННЯ У БАКОВИХ СУМІШАХ:

Препарат сумісний з більшістю пестицидів, та в кожному випадку обов'язково провести окреме змішування на виявлення осаду чи інших негативних факторів.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:




III клас (малотоксичний). Малонебезпечний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до + 30°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +15°C до +25°C		200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		
	Забороняється проводити обприскування при швидкості вітру більше 3-4 м/с		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Препарати з аналогічними діючими речовинами застосовуються для захисту сої, гороху, цукрових буряків.



Борошниста роса пшениці



Бура (листова) іржа



Карликова іржа ячменю



Сітчаста плямистість ячменю



Септоріоз листя та колосу пшениці



Standard Стандартна серія Корнет®, КС

ФУНГЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ХВОРОБАМИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, ВИНОГРАДУ ТА ЯБЛУНИ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
флутриафол, 250 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова каністра



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Пригнічення широкого спектру хвороб
- Довготривалий ефект
- Підвищення витривалості рослин
- Профілактичні та лікувальні властивості
- Висока мобільність діючої речовини

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Корнет, КС - контактний та системний фунгіцид з лікувальними та захисними властивостями. Діюча речовина препарату поглинається листовою поверхнею культури та переноситься по рослині акропетально по ксилемі. Флутриафол діє як інгібітор біосинтезу ергостеролу грибних організмів, що призводить до руйнування клітинних мембран збудників хвороб та зупинки їх розвитку.

СПЕКТР ДІЇ ФУНГЦИДУ КОРНЕТ, КС:

Фунгіцид Корнет, КС застосовується в боротьбі з широким спектром хвороб листя та колосу (борошнеста роса, ринхоспоріоз, септоріоз, іржа, гельмінтоспоріоз та ін.) в посівах сільськогосподарських культур. Препарат володіє довготривалою захисною та лікувальною дією.

ФУНГЦИД КОРНЕТ, КС ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб внесення	Максимальна кратність обробок
Озима пшениця	Борошнеста роса, плямистості, септоріоз, стеблова бурея іржа, кореневі гнилі, фузаріоз, ринхоспоріоз	0,5	Обприскування в період вегетації	2
Ярий ячмінь				
Буряки цукрові	Борошнеста роса, церкоспороз	0,25		
Виноградники	Оїдіум	0,1		
Яблуня	Борошнеста роса, парша	0,15		

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ КОРНЕТ, КС:

У чому полягає унікальність фунгіциду Корнет, КС?

Унікальність цього препарату полягає в тому, що він має потрібну захисну дію: системну, контактну і фумігаційну. Однією з особливостей препарату є фумігаційна властивість: розчин, розпилюючись чи випаровуючись, активно проникає у рослину.

Коли доцільно застосовувати препарат Корнет, КС?

Найбільший фунгіцидний ефект препарату забезпечується у разі застосування його на ранніх стадіях розвитку хвороб. З метою досягнення високої ефективності в боротьбі з хворобами обробку рослин фунгіцидом доцільно починати при появі перших ознак хвороби.

За яких умов обробку препаратом повторюють?

Повторні обробки планують заздалегідь за умов високого рівня ураженості рослин хворобами та сприятливих для їх розвитку гідротермічних умов.

Чи можна використовувати препарат у бакових сумішах з іншими препаратами?

Фунгіцид Корнет, КС сумісний з більшістю препаратів. В кожному окремому випадку перед приготуванням бакової суміші необхідно перевірити препарати на сумісність.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний), помірно небезпечний для теплокровних, токсичний для риб.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +30°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		На польових культурах: 200-400 л/га У садах і на виноградниках: 600-800 л/га
	Погодні умови в період застосування		
	Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб внесення	Максимальна кратність обробок
Жито	Борошнеста роса, іржасті хвороби, кореневі гнилі	0,5	Обприскування в період вегетації	2



Сітчаста плямистість ячменю



Карликова іржа ячменю



Септоріоз листя та колосу пшениці



Церкоспороз





Professional
Професійна серія

Ретардин® EW, EB

ФУНГІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ОБРОБКИ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ТА РІПАКУ ВІД ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ ХВОРОБ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ. МАЄ РЕТАРДАНТНУ ДІЮ НА РОСЛИНИ ОЗИМОГО РІПАКУ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
тебуконазол, 250 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
емульсія, масло (олія) у воді

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Висока ефективність в обмеженні розвитку та поширення хвороб
- Інноваційна та практична препаративна форма поліпшує дію препарату та спрощує приготування робочого розчину
- Має добрий ретардантний ефект на озимий ріпак: запобігає переростанню в осінній період та обмежує ріст вегетативної маси в весняно-літній період

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина тебуконазол швидко поглинається рослинами через вегетативні органи та переміщуючись переважно акропетально, рівномірно розподіляється у ксилемі. Дія тебуконазолу проявляється в пригніченні синтезу ергостеролу в мембранах клітин грибів-патогенів. Ретардин EW, EB володіє не тільки захисною, але й профілактичною дією. Препарат забезпечує високу ефективність в боротьбі з широким спектром хвороб рослин, таких як септоріоз, фузаріоз, борошниста роса, іржа, альтернаріоз.

РЕТАРДИН EW, EB ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Спосіб обробки	Збудники хвороб	Норма внесення, л/га	Кількість обробок
В якості фунгіциду				
Пшениця озима	Обприскування рослин при появі перших симптомів захворювання	Септоріоз листя, фузаріоз колоса, борошниста роса, бура листова іржа	0,5-1,0	2
Ріпак озимий		Альтернаріоз, сіра гниль	0,8-1,0	2
В якості ретарданту				
Ріпак озимий	Обприскування рослин в фазі 5-7 листків	Інгібування росту листя та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов	0,5-0,75	1

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ РЕТАРДИН EW, EB:

Який захисний період препарату?

Біологічна ефективність продовжується протягом 2-4 тижнів, в залежності від погодних умов та розвитку хвороб.

Як швидко починає діяти препарат?

Діюча речовина проникає в рослину протягом 2-3 годин.

Які переваги має препаративна форма EB?

РЕТАРДИН EW, EB, з діючою речовиною тебуконазол, у препаративній формі EB (емульсія, масло (олія) у воді) являє собою дисперсію розчинених в розчиннику крапель діючої речовини в воді. Заміна більшої частини розчинника водою має наступні переваги:

- Висока швидкість і якість приготування робочого розчину
- Присутність комплексу ПАВ, які створюють стабільний розчин та забезпечують прилипання і швидке проникнення в рослину
- Дозволяє знизити загальну токсичність препаративної форми на культурні рослини та теплокровних, порівняно з концентратами емульсій, без зниження цільової активності.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

4 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		
	Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб внесення	Кратність обробок
Ячмінь	Борошниста роса, сітчаста плямистість, темно-бура плямистість	1	Обприскування від час вегетації	2
	Іржа	0,5		
Овес	Корончата іржа, борошниста роса, червоно-бура плямистість	1		
Жито	Бура іржа, борошниста роса, рихноспоріоз, фузаріоз колосу			
Соя	Борошниста роса, антракноз, іржа	0,4		
Капуста	Альтернаріоз, борошниста роса, плямистості			
Льон олійний	Альтернаріоз, борошниста роса, фузаріоз, іржа			
Морква	Альтернаріоз, борошниста роса, склеротиніоз			
Виноград	Оїдіум	0,4		



Professional Професійна серія Ретардин®, ВГ

СИСТЕМНИЙ ФУНГІЦИД ТА РЕТАРДАНТ ІЗ ЗАХИСНОЮ ТА ЛІКУВАЛЬНОЮ ДІЄЮ ДЛЯ ОБРОБКИ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ТА ОЗИМОГО РІПАКУ ВІД ШИРОКОГО СПЕКТРУ ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ ХВОРОБ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: тебуконазол, 500 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ: 2,5 кг фольгований пакет (5 пакетиків по 500 г)

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Унікальний допоміжний компонент
- Яскравий ретардантний ефект
- Надійна Perezимівля рослин

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина тебуконазол швидко поглинається рослинами через вегетативні органи та переміщуючись переважно акропетально, рівномірно розподіляється у силемі. Дія тебуконазолу проявляється в пригніченні синтезу ергостеролу в мембранах клітин грибів-патогенів. Ретардин, ВГ володіє не тільки захисною, але й профілактичною дією. Препарат забезпечує високу ефективність в обмеженні розвитку широкого спектру хвороб рослин, таких як септоріоз, борошниста роса, бура іржа, альтернаріоз, сіра гниль.

РЕТАРДИН, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Спосіб обробки	Збудники хвороб	Норма внесення, кг/га
В якості фунгіциду			
Пшениця озима	Обприскування рослин при появі перших симптомів захворювання	Септоріоз, фузаріоз колоса, борошниста роса, бура іржа	0,25-0,50
Ріпак озимий		Альтернаріоз	0,40-0,50
В якості ретарданту			
Ріпак озимий	Обприскування рослин в фазі 5-7 листків	Інгібування росту листя та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов	0,25-0,38



Борошниста роса пшениці



Септоріоз листя та колосу пшениці



Альтернаріоз ріпаку



Сіра гниль ріпаку



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ РЕТАРДИН, ВГ:

Як довго триває дія фунгіциду на шкідливі об'єкти?

Період захисної дії препарату 25-35 днів з моменту обробки.

Коли саме необхідно починати застосування препарату?

Обробку препаратом необхідно проводити при появі перших симптомів захворювання.

Які хвороби можна контролювати за допомогою препарату Ретардин, ВГ?

Препарат забезпечує високу ефективність в обмеженні розвитку широкого спектру хвороб рослин, таких як септоріоз, борошниста роса, бура іржа, альтернаріоз, сіра гниль.

Від чого залежить ефективність проведення обробки препаратом?

Ефективність фунгіцидної обробки залежить від якості внесення препарату. Тому слід ретельно дотримуватися правил регулювання обладнання для внесення препарату, приготування робочого розчину та організації проведення робіт по застосуванню пестицидів.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від -10°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		
	Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб внесення	Кратність обробок
Ячмінь	Борошниста роса, сітчаста плямистість, темно-бура плямистість	0,375-0,5	Обприскування в період вегетації	2
	Іржа	0,25		
Жито	Бура листова іржа, борошниста роса, рихноспоріоз, фузаріоз колосу	0,25-0,5		
Овес	Борошниста роса, іржа, червонобура плямистість	0,25-0,6		
Соя	Борошниста роса, антракноз, іржа	0,5		
Виноград	Оїдум, сіра гниль	0,2-0,3	Перед цвітінням і до закінчення росту ягід	





Standard
Стандартна серія

Форсаж®, КС

СИСТЕМНИЙ ФУНГІЦИД ЗАХИСНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
карбендазим, 500 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикової каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- 2 в 1: протруйник насіння та фунгіцид
- Профілактичні та лікувальні властивості
- Швидка дія
- Довготривалий ефект
- Широкий діапазон внесення
- Ефективний за низьких температур
- Стійкий до змивання дощем

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Системний фунгіцид використовується для захисту зернових, ріпаку, цукрових та кормових буряків від комплексу хвороб. Особливість дії препарату полягає в тому, що діюча речовина, карбендазим, поглинається через коріння та зелені тканини і рухається по рослині знизу вгору, пригнічує синтез бета-тубуліну, що викликає порушення обміну речовин патогенних грибів.

ФУНГІЦИД ФОРСАЖ, КС ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб внесення	Максимальна кратність обробок
Пшениця яра та озима	Борошниста роса, септоріоз	0,4-0,5	Обприскування в період вегетації	2
Ячмінь ярий та озимий				
Жито озиме				
Ріпак озимий та ярий	Альтернاریоз, септоріоз	0,6		
Буряки цукрові та кормові	Церкоспороз	0,3-0,4		



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ФОРСАЖ, КС:

У чому полягає унікальність фунгіциду Форсаж, КС?

Препарат належить до найефективніших препаратів проти збудників хвороб з роду Septoria, Alternaria, Cercospora та ін.

Коли доцільно застосовувати препарат Форсаж, КС?

Найбільший фунгіцидний ефект препарату забезпечується у разі застосування його на ранніх стадіях розвитку хвороб.

За яких умов обробку препаратом повторюють?

Повторні обробки заздалегідь планують за умов високого рівня ураженості рослин хворобами та сприятливих для їх розвитку гідротермічних умов.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +30°C

Іконка	Оптимальні температурні умови застосування	Іконка	Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		
	Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб внесення	Максимальна кратність обробок
Соняшник	Біла та сіра гнилі, фомоз, фомопсис, борошниста роса	1,5	Обприскування в період вегетації	2
Яблуна	Парша, борошниста роса	0,4		



Альтернاریоз ріпаку



Церкоспороз буряка



Борошниста роса жита



Септоріоз листя та колосу пшениці





Standard
Стандартна серія

Юнкер®, ЗП

ФУНГІЦИД СИСТЕМНОЇ ТА КОНТАКТНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ, ТОМАТІВ ТА ВИНОГРАДНИКІВ ВІД ГРИБНИХ ХВОРОБ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок, що змочується

УПАКУВАННЯ: 1 кг, 2,5 кг фольгований пакет

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Швидкість проникнення речовини
- Тривалість захисту навіть при вологій погоді
- Широкий діапазон внесення
- Підвищення життєздатності рослин

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Металаксил потрапляє у рослину через листя, стебла і коріння. Має захисні та лікувальні фунгіцидні властивості, що проявляються у пригніченні синтезу рибосомної РНК. Як наслідок - інгібування протеїну в клітинах патогенів грибних організмів. Діюча речовина металаксил попереджає зараження культурних рослин збудниками грибних хвороб фітофторозу та альтернаріозу. Діюча речовина манкоцеб інгібує сульфогідридні групи у амінокислот та ферментів в клітинах грибів, що негативно позначається на метаболізмі ліпідів, процесах дихання і синтезу АТФ. Манкоцеб ефективно пригнічує розвиток фітофторозу, альтернаріозу, макроспоріозу та кладоспоріозу.

ФУНГІЦИД ЮНКЕР, ЗП ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, кг/га	Норма витрати робочого розчину, л/га	Спосіб внесення	Максимальна кратність обробок
Картопля	Альтернаріоз, фітофтороз	2,0-2,5	200-400	Обприскування при загрозі розповсюдження хвороб та при появі їх перших ознак	2 рази за вегетаційний період, через 10-14 днів після першого застосування
Томати відкритого ґрунту	Фітофтороз	2,25	200-400	Обприскування при виявленні перших ознак хвороби	2-3 рази з інтервалом 7-10 днів
Виноградники	Мілдью	2,5	500-800		



Альтернаріоз, або суха плямистість (зональна плямистість) томатів



Альтернаріоз картоплі



Фітофтороз картоплі



Мілдью



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЮНКЕР, ЗП:

У чому полягає унікальність фунгіциду Юнкер, ЗП?

Унікальність цього препарату полягає у тому, що він складається з двох діючих речовин: системної (металаксил) і контактної (манкоцеб), які у вдалому поєднанні доповнюють одна одну та збільшують довготривалість захисної та лікувальної дії препарату.

Коли доцільно застосовувати препарат Юнкер, ЗП?

Найбільший фунгіцидний ефект препарату забезпечується у разі застосування його на ранніх стадіях розвитку хвороб.

За яких умов обробку препаратом повторюють?

Враховуючи біологію збудників фітофторозу картоплі та томатів, мілдью виноградників, повторні обробки планують заздалегідь, особливо за сприятливих для патогенів гідротермічних умов.

Чи можна застосовувати Юнкер, ЗП одночасно з іншими препаратами?

Препарат може застосовуватись сумісно з фунгіцидами інших хімічних груп. Перед застосуванням бакових сумішей препарати бажано перевірити на сумісність.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний). Помірно небезпечний для теплокровних, токсичний для риб.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

4 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

Іконка	Оптимальні температурні умови застосування	Іконка	Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		На картоплі і томатах: 200-400 л/га У виноградниках: 500-800 л/га
Погодні умови в період застосування			
Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с			

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб обробки	Кількість обробок
Огірки	Несправжня борошниста роса	2,5	Обприскування в період вегетації	3
Ріпак озимий	Альтернаріоз, пероноспороз	2,5		
Хміль	Несправжня борошниста роса	2,5		
Тютюн	Пероноспороз	2,5		
Цибуля (крім на перо)	Несправжня борошниста роса	2,5		



Professional Професійна серія Аболір®, РГ

ДЕСИКАНТ СИСТЕМНОЇ ДІЇ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

гліфосат, у вигляді амонійної солі, 757 г/кг у кислотному еквіваленті, 687 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:

розчинні гранули

УПАКУВАННЯ:

10 кг фольгований пакет

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Швидке знищення бур'янів (однорічні – 12 годин, багаторічні – 5 днів)
- Найнижча норма застосування
- Опади не знижують ефективність дії препарату через годину після застосування
- Відмінна розчинність
- Найбільш досконала формула діючої речовини
- Висока ефективність за несприятливих погодних умов

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина – гліфосат є інгібітором ферментативної системи, яка відповідає за синтез ароматичних амінокислот. Гліфосат проникає у рослину через надземну її частину та активно розноситься по всіх органах, у тому числі і у коріння. Бур'яни гинуть за рахунок поліпшеної формуляції вже через 8-10 діб. Перші ознаки гербіцидного ефекту з'являються через 7 днів, спочатку у вигляді пожовтіння, потім в'янення листя. Препарат є ефективним у широкому діапазоні концентрації природних катіонів кальцію і магнію у воді.

ДЕСИКАНТ АБОЛІР, РГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати, кг/га	Спосіб, час обробки, обмеження	Строк обробки до збирання врожаю, діб
Зернові	Підсушування культурних рослин та знищення бур'янів	1,5	Обприскування посівів за 2 тижні до збирання за вологості зерна не більше 30%	14
Ріпак			Обприскування посівів при побурінні 70% стручків культури	



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕСИКАНТУ АБОЛІР, РГ:

Як правильно приготувати робочий розчин десиканту Аболір, РГ?

З необхідної кількості препарату спочатку готують маточний розчин в заповненому на 1/3 баку обприскувача. Через 15 хвилин долити водою до повного об'єму бака.

Як встановити норму витрати препарату?

Норма витрати препарату встановлюється за результатами обстеження на виявлення чисельності, видового складу та встановлення стадії росту і розвитку бур'янів. При проведенні боротьби з однорічними односім'ядольними та двосім'ядольними бур'янами норму витрати встановлюють в залежності від висоти рослин.

З метою знищення багаторічних бур'янів норма витрати встановлюється мінімальною, в період відростання бур'янів, максимальною в більш пізні фази росту і розвитку рослин.

Для боротьби з березкою польовою норму витрати встановлюють максимальну.

Чи залежить ефективність обробки від жорсткості води?

Завдяки досконалій формулі гербіциду Аболір, РГ добре працює навіть у жорсткій воді, та не потребує додавання у бакову суміш спеціальних компонентів для її пом'якшення.

Як впливають на дію гербіциду складні погодні умови?

За дощової погоди опади майже не знижують гербіцидний ефект вже через годину після внесення препарату. Також, як посушлива так і холодна погода істотно не позначаються на його ефективності.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (високотійкий у воді). Нетоксичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		50-300 л/га
Погодні умови в період застосування			
Не проводити внесення при швидкості вітру понад 3-4 м/с			

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати, кг/га	Спосіб, час обробки, обмеження	Строк обробки до збирання врожаю, діб
Кукурудза	Підсушування культурних рослин та знищення бур'янів	1,5	Обприскування посівів за 2-3 тижні до збирання за вологості зерна не більше 30%	14
Горох			Обприскування посівів при побурінні 70-75% бобів культури	
Соя			Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів	
Соняшник			Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	



Standard Стандартна серія Везувій®, РК

ДЕСИКАНТ КОНТАКТНОЇ ДІЇ. ДЛЯ ДЕСИКАЦІЇ ГОРОХУ, СОНЯШНИКУ ТА СОЇ. ПОЛЕГШУЄ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ ЗА РАХУНОК ПІДСУШУВАННЯ РОСЛИН ПРИ НЕРІВНОМІРНОМУ ДОЗРІВАННІ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА: дикват дибромід, 150 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ: 20 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Висока швидкість дії
- Рівномірне дозрівання
- Значне зниження вологості насіння
- Пригнічення хвороб
- Можливість авіаційних внесень
- Покращення якості насіння
- Безпечність застосування на насінневих ділянках і культурах харчового призначення за рахунок швидкого розкладання препарату
- Не змивається дощем через 10 хвилин після обробки

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Препарат потрапляє в рослини через листя, з частковим переміщенням по силемі. Діюча речовина дикват дибромід порушує в рослинах процес фотосинтезу. В них утворюються сильні оксиди, які пошкоджують клітинні мембрани та цитоплазму, що призводить до зневоднення клітин та повного висихання рослин. Діє відразу після внесення препарату, візуально ефект десикації видно через 5-7 днів, залежно від температури повітря та фази розвитку культури.

ДЕСИКАНТ ВЕЗУВІЙ, РК ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб та час застосування*	Строк очікування (в днів до збирання врожаю)
Соняшник	2,0-3,0	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	6
Горох	2,0-3,0	Обприскування у період пожовтіння нижніх бобів (вологість зерна до 45%)	7
Соя	2,0-3,0	Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього та середнього ярусів	6

* В посівах соняшнику та гороху препарат застосовується методом наземного та авіаційного обприскування, на сої – наземним методом.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ВЕЗУВІЙ, РК:

Коли доцільно починати десикацію препаратом Везувій, РК?

Починати обробку посівів слід при фізіологічній стиглості насіння за вологості 30-50% залежно від культури, десикація в більш ранні строки може призвести до зниження врожайності культури. Інтенсивність десикації залежить від норми витрати препарату, оброблюваної культури, густоти стояння, засміченості посівів, погодних умов в момент обробки та після неї.

В якому випадку необхідно застосовувати максимальну норму витрати препарату?

Збільшення норми витрати препарату можна пояснити наявністю великої кількості листя на культурі, підвищеною засміченістю культури бур'янами, підвищеною вологістю, а також у разі необхідності проведення передчасного збору врожаю.

Чи можна використовувати десикант Везувій, РК в суміші з іншими препаратами?

Бакові суміші препарату Везувій, РК з іншими пестицидами не рекомендуються через неспівпадання строків застосування. Для збільшення ефективності обробки, Везувій, РК використовують в бакових сумішах з сечовиною або аміачною селітрою.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

Іконка	Оптимальні температурні умови застосування	Іконка	Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		при наземному застосуванні – 200-400 л/га, при авіаційному – 50 л/га
	Погодні умови в період застосування Обробку необхідно проводити ввечері або вдень в хмарну погоду, оскільки при сонячних та жарких погодних умовах десикація проходить дуже швидко, але менш ефективно. Вранці обприскування проводити не рекомендується.		Погодні умови в період застосування Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с, за умови відсутності опадів.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Спосіб та час обробок	Норма витрати препарату, л/га	Строк очікування до збирання врожаю, дів
Люцерна (насінневі посіви)	При побурінні 85-90% бобів	3,0-4,0	7
Сорго (насінневі посіви)	У період, воскової стиглості насіння за його вологості 45-50%	4,0	4-6
Морква (насінневі посіви)	Обприскування у період початку повної стиглості насіння в зонтиках другого порядку за вологості загальної маси насіння не більше 50%	2,0-3,0	5-10
Капуста (насінневі посіви)	У період початку біологічної стиглості насіння за його вологості не більше 50%	2,0-3,0	10
Хміль	Обприскування бур'янів за висоти культури 4-5 м	1,5-2,0	10
Картопля	За 10 днів до збирання культури, в період закінчення формування бульб	1,5-2,0	10
Зернові (насінневі посіви)	За 2 тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30%	1,5-2,0	7
Буряки цукрові, столові, кормові (насінневі посіви)	У період побуріння 30-40% клубочків	4,0-6,0	8-10
Конюшина червона (насінневі посіви)	У період побуріння 75-80% голівок	3,0-4,0	5-7
Боби кормові (насінневі посіви)	У період пожовтіння насіння нижніх бобів, насінневий рубчик-чорний	4,0-5,0	8-10
Редька (насінневі посіви)	У період воскової стиглості насіння	4,0-5,0	10
Турнепс (насінневі посіви)	У період воскової стиглості насіння, за його вологості 45-50%	3,0-4,0	6-7
Ріпак	При побурінні 70% стручків культури	3,0	7
Рис	У фазі повної стиглості рослин за 5 днів до збирання	2,0	5
Льон	У фазі ранньої жовтої стиглості культури	2,0-3,0	7
Мак	За 10-12 днів до збирання врожаю	2,0-3,0	10-12

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують як гербіцид суцільної дії для досходового захисту цибулі, картоплі, моркви проти однорічних та багаторічних злакових та двосім'ядольних бур'янів.





Standard
Стандартна серія

Вулкан® Плюс, РК

ДЕСИКАНТ СИСТЕМНОЇ ДІЇ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

гліфосат у формі ізопропіламіної солі, 480 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:

20 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Висока швидкість дії
- Зменшена чутливість до рівня жорсткості води
- Низький рівень піноутворення
- Звільнення від багаторічних бур'янів
- Зменшення кількості втрат врожаю від осипання
- Можливість авіаційних внесень

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина гліфосат є інгібітором ферментативної системи, яка відповідає за синтез необхідних для життєдіяльності рослин ароматичних амінокислот. Гліфосат поглинається рослинами надземною частиною та активно розповсюджується по всіх органах, у тому числі і у коріння, при контакт з ґрунтом розкладається на нетоксичні сполуки. Перші ознаки гербіцидного ефекту при десикації з'являються через 3-5 днів, спочатку у вигляді пожовтіння, потім - в'янення листя.

ДЕСИКАНТ ВУЛКАН ПЛЮС, РК ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Спосіб внесення	Призначення	Норми внесення, л/га		Строк очікування до збирання врожаю, дб	Максимальна кратність обробок
			наземним устаткуванням	авіацією (літак АН-2)		
Зернові	Обприскування посівів за два тижні до збирання, за вологості зерна не більш 30%	Підсушування культурних рослин та знищення бур'янів	3,0	3,0	14	1
Горох	Обприскування при побурінні 70-75% бобів культури			-		
Соя	Обприскування у фазу початку побуріння бобів			-		
Ріпак	Обприскування посівів при побурінні 70% стручків культури			-		
Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків			-		



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕСИКАНТУ ВУЛКАН ПЛЮС РК:

Чи можна використати десикант Вулкан Плюс, РК в бакових сумішах з іншими препаратами?

Для прискорення підсихання рослин Вулкан Плюс, РК використовують в бакових сумішах з сечовиною або аміачною селітрою.

Коли необхідно проводити десикацію культур?

Десикацію зернових культур препаратом доцільно проводити за 14 дб до збирання врожаю (за вологості зерна не більше 30%). Десикацію ріпаку проводять за 14 дб до збирання врожаю або при побурінні 70% стручків у культури, гороху – за 14 дб до збирання врожаю або при побурінні 70-75% бобів культури, сої – за 14 дб до збирання врожаю або у фазу початку побуріння бобів, соняшнику – за 14 дб до збирання врожаю або у фазу початку побуріння кошиків.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний). Нетоксичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

Температура	Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C	
Погодні умови в період застосування		
Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТИВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Спосіб та час обробок	Норма витрати препарату, л/га	Строк очікування до збирання врожаю, дб	Максимальна кратність обробок
Льон-довгунець	Обприскування посівів у фазі ранньої жовтої стиглості льону	3,0	14	1



Пшениця до десикації



Пшениця після десикації



Десикація соняшника



Professional Професійна серія Деліт®, РК

ДЕСИКАНТ СИСТЕМНОЇ ДІЇ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

гліфосату калійна сіль, 613 г/л, у кислотному еквіваленті, 500 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ

розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:

20 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Висококонцентрована препаративна форма
- Менша норма застосування
- Містить прилипач нового покоління
- М'який ефект десикації
- Краще проникнення в рослину
- Швидша дія за рахунок більш рухомої діючої речовини
- Полегшення та зменшення втрат при збиранні врожаю
- Відмінний контроль однорічних та багаторічних бур'янів

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина гліфосат є інгібітором ферменту (EPSPS), який відповідає за синтез необхідних для життєдіяльності рослин ароматичних амінокислот. Препарат дифузно проникає через листову поверхню і розподіляється по всій рослині, включаючи кореневища, при контакті з ґрунтом розкладається на нетоксичні сполуки. Перші ознаки гербіцидного ефекту з'являються через 2-3 дні, спочатку у вигляді пожовтіння, потім в'янення листя. Завдяки вмісту у препараті гліфосату в калійній формі стало можливим підвищити концентрацію діючої речовини та знизити норму витрати у порівнянні з традиційними формами гліфосату (наприклад ізопропіламіної).

ГЕРБИЦИД ДЕЛІТ, РК ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ СУЦІЛЬНОГО ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ДЕСИКАНТУ НА НАСТУПНИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Спосіб внесення	Норма витрати препарату, л/га	Строк обробки до збирання врожаю, днів	Максимальна кратність обробок
Десикація зернових	Обприскування за 2 тижні до збирання за вологості зерна не >30%	1,5-2,0	14	1
Десикація соняшнику	Десикація у фазі початку побуріння кошиків			

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕСИКАНТУ ДЕЛІТ, РК:

Як правильно встановити норму витрати препарату?

Норма витрати залежить від видового складу бур'янів та фази розвитку рослин. При переважній кількості однорічних бур'янів можна застосовувати мінімальні норми препарату. При сильному забур'яненні посівів багаторічними бур'янами слід використовувати максимальні норми препарату.



Чи можна використати десикант Деліт, РК в бакових сумішах з іншими препаратами?

Для прискорення підсихання рослин Деліт, РК використовують в бакових сумішах з сечовиною або аміачною селітрою.

Коли необхідно проводити десикацію культур?

Десикацію зернових культур препаратом доцільно проводити: за 14 днів до збирання врожаю; за вологості зерна не більше 30%; зберіть 20 зерен з центра різних колосків, натисніть нігтем великого пальця на зернину, якщо тиснення залишається на зернині, культура готова до десикації.

Десикацію соняшнику проводять: за 14 днів до збирання врожаю або у фазу початку побуріння кошиків (листки розташовані біля кошика сухі); вологість насіння в межах 20-25% (за сухих погодних умов вона може бути нижче 20%). Проводити десикацію соняшнику можна і за вищої вологості (25-30%), оскільки врожай насіння від цього не зменшується. **Застереження:** у такому разі підсихання рослин відбувається повільніше і може дещо знижуватись вміст олії.

Десикацію ріпаку – за 14 днів до збирання врожаю або при побурінні 70% стручків у культури та при вологості насіння менше 30%.

Десикацію кукурудзи: за 14 днів до збирання врожаю; вологість зерна 29-32%; поява так званої «чорної точки» на зерні для гібридів з ФАО вище 250, 2-3 верхніх засохлих листочки для ФАО нижче 250.

Десикацію сої: за 14 днів до збирання врожаю; у фазу початку побуріння бобів за вологості насіння 50% і нижче (врожайність і маса 1000 насінин при цьому вже не зменшуються, вміст білка й олії – також без змін).

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:




III клас (малотоксичний). Не токсичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		100-200 л/га
	Погодні умови в період застосування		
	Ефективною умовою застосування препарату Деліт, РК є відсутність опадів протягом 3 годин після внесення. Препарат доцільно вносити у вечірні години або вранці, але до випадання роси.		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Спосіб та час обробок	Норма витрати препарату, л/га	Строк очікування до збирання врожаю, днів	Максимальна кратність обробок
Кукурудза	Обприскування посівів при появі так званої «чорної точки» на зерні для гібридів з ФАО вище 250	2,0	14	1
Ріпак	Обприскування посівів при побурінні 70% стручків культури			
Соя	Обприскування у фазу початку побуріння бобів			





Standard
Стандартна серія

Фосфір®, ТБ

**ФУМІГАНТ ДЛЯ БОРЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ ЗАПАСІВ
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР МЕТОДОМ ФУМІГАЦІЇ (ГАЗАЦІЇ)**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: фосфід алюмінію, 560 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: таблетки

УПАКУВАННЯ: 1 кг металева пляшка

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Ефективний проти амбарних шкідників, кліщів, мишовидних гризунів, щурів
- 100% загибель шкідників запасів
- Швидка проникаюча здатність
- Висока біологічна активність



МЕХАНІЗМ ТА СПЕКТР ДІЇ:

Фосфір, ТБ – фумігант з інсектицидною та родентицидною дією. В результаті контакту препарату з атмосферним повітрям відбувається хімічна реакція фосфіду алюмінію з вологою, що міститься у повітрі. Внаслідок цього відбувається розклад препарату з виділенням безбарвного газу фосфіну, вуглекислого газу і аміаку. Газ фосфін викликає параліч нервової системи шкідника, в результаті чого настає порушення процесів метаболізму і блокується надходження кисню до організму. Як результат настає смерть. Швидкість впливу препарату Фосфір, ТБ на шкідників залежить від концентрації газу фосфіну в повітрі. Повна загибель шкідників, що живуть відкрито, досягається при забезпеченні показника концентрації фосфіну на час експозиції на рівні 7 г/год/м³, шкідників у прихованій формі зараження зерна та зернопродуктів – 25 г/год/м³.

Препарат широко застосовується на хлібоприймальних підприємствах, у колективних та насінницьких господарствах для обробки складів, млинів, елеваторів, зерна насінневого та продовольчого призначення, борошна, крупи, сухих овочів та іншої сільськогосподарської продукції. Використовуються на об'єктах, заражених найбільш небезпечними і стійкими проти пестицидів шкідниками хлібних запасів (комірними, рисовими довгоносиками, булавовусим і малим борошняним хрущачками, зерновим шашелем та іншими). За умов виконання герметизації препарат Фосфір, ТБ придатний для знезараження складських приміщень будь-якого типу, контейнерів, трюмів суден, елеваторів силосного типу, силососховищ, транспортного рухомого складу (вагони, причепи), зерна насипом та затареного у мішки, зернопродуктів, шроту, круп, овочів та фруктів, тари і пакувальних матеріалів. Ефективно знищує всі види шкідників запасів незалежно від фази їх розвитку.

ФУМІГАНТ ФОСФІР, ТБ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ:

Об'єкт, що обробляється	Норма витрати препарату г/м ³ , т	Спосіб, час обробки, обмеження
Зерно хлібних злаків, незавантажені складські приміщення	6-9 (2-3 таблетки)	Допуск людей та завантаження складських приміщень – після повного провітрювання (7 днів) та вмісту фосфороводню не більше ГДК у повітрі робочої зони. Реалізація зерна – через 20 днів після фумігації за наявності залишків фосфороводню не вище МДР

Норми витрати препарату залежать від умов зберігання продуктів.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ФОСФІР, ТБ:

У чому полягає технологія застосування препарату Фосфір, ТБ?

У зерно, що зберігається насипом, таблетки вводять за допомогою спеціальних зондів. При обробці затарених матеріалів таблетки препарату розміщують на підставках. Невеликі партії зерна та зернопродуктів (до 200 т, висота бурта до 2,5 м) обробляють під плівкою, яку розміщують на каркасі так, щоб забезпечити між зерном та плівкою вільний простір до 50 см. Під час проведення фумігації препарат розміщують на підлозі, поверхні зерна, проміж мішків з насінням, продукцією з урахуванням загальної витрати, обчисленої на весь обсяг приміщення, незавантаженого чи із зерном, іншою продукцією.

Впродовж якого часу спостерігається дія препарату Фосфір, ТБ?

Препарат Фосфір, ТБ починає працювати через 30-60 хвилин після контакту з атмосферним повітрям. Інтенсивність виділення газу фосфіну залежить від вологості та температури повітря. При вологості повітря 60% та температурі 20°C вже через 24 години виділяється 50% газу. Максимальна концентрація фосфіну на об'єкті досягається через 60-72 години. Тривалість фумігації складає від 4 до 10 днів.

Чи можна використовувати препарат Фосфір, ТБ в суміші з іншими препаратами та які основні вимоги безпечного його застосування?

Фосфір, ТБ не застосовується в суміші з іншими препаратами. Категорично забороняється застосування препарату Фосфір, ТБ відразу після проведення обробок приміщень іншими препаратами із використанням великої кількості води. При контакті з водою препарат може викликати самозаймання.

Через який час після фумігації можна проводити завантаження складських приміщень?



Допуск людей та завантаження складських приміщень дозволяється після повного провітрювання протягом 5 днів. Реалізація продукту дозволяється через 20 днів після фумігації за наявності фосфіну не вище МДР.

Класифікація ВООЗ, токсичність:

(I клас) токсичний.

Гарантійний термін зберігання:

4 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

Оптимальні температурні умови застосування	Застереження
 <p>Повна загибель комплексу шкідників запасів залежить від температури оточуючого середовища: +26...+27°C – через 3 доби +22...+24°C – через 4 доби +16...+18°C – через 5 днів +12...+14°C – через 7 днів +5...+8°C – через 11 днів</p>	 <p>Препарат Фосфір, ТБ вогне- та вибухонебезпечний, особливо при контакті з водою</p>

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для обробки цукру, чаю, тютюну, сухофруктів та горіхоплідних затарених у мішки, коробки, бочки, складські контейнери.



Складські приміщення



Гризуни



Шкідники





Standard
Стандартна серія

Флокс®, РК

ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНА РЕЧОВИНА

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

етоксилат ізодецилового спирту, 90%

ФОРМУЛЯЦІЯ:

розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:

5 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Забезпечує суцільне покриття оброблюваних рослин
- Підсилює дію гербіцидів
- Сприяє проникненню робочого розчину через кутикулу

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Завдяки своїм властивостям ПАР Флокс, РК утворює однорідну плівку на поверхні рослин, що зменшує поверхневий натяг гербіциду. За рахунок цього діюча речовина гербіцидів краще поглинається рослиною, тим самим прискорюючи швидкість дії і ефективність гербіциду.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ:

ПАР Флокс, РК застосовується спільно з препаратами, діючі речовини яких відносяться до хімічної групи сульфонілсечовини:

- Апач, ВГ
- Гурон, ВГ
- Канцлер, ВГ
- Крейсер, ВГ
- Меркурій, ВГ
- Футурин, ВГ

НОРМИ ВИТРАТИ:

ПАР Флокс, РК застосовується в концентрації – 0,1-0,2% (100 мл/100 л води) при нормі виливу робочої рідини від 200 до 300 літрів на гектар. Рівень концентрації ПАР Флокс, РК залежить від препарату. Завжди уважно читайте тарну етикетку перед застосуванням.

При обробках з меншим об'ємом слід використовувати 200 мл ПАР Флокс, РК на гектар. В посушливих та жарких умовах для захисту посівів кукурудзи від злакових видів бур'янів рекомендуються збільшити норму ПАР Флокс, РК до 0,15-0,2% та збільшити норму виливу робочого розчину.



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПАР ФЛОКС, РК:

Приготування робочого розчину:

Ефективність гербіцидної обробки залежить від якісного внесення препарату. Тому слід ретельно дотримуватися правил регулювання обладнання для внесення препарату, приготування робочого розчину та організації проведення робіт по застосуванню пестицидів.

Перед внесенням необхідно ретельно перевірити справність систем обприскувача, провести ретельне промивання баку, магістральних трубопроводів та наконечників для розбризкування робочої суміші. Перед роботою відрегулювати обприскувач на завданий режим роботи. Бак на 1/3 заповнюють водою і при працюючій мішалці додають пестициди. Потім мішалку зупиняють і додають ПАР Флокс, РК, після чого доливають в бак води до необхідного об'єму і знову включають мішалку.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний). Безпечний для теплокровних, нетоксичний для риб.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +40°C



Professional
Професійна серія

Флокс® Експерт, РК

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СИЛІКОНОВИЙ АГЕНТ, ОРГАНО-СИЛІКОНОВА ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНА РЕЧОВИНА, ЩО ПІДВИЩУЄ ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ, ФУНГІЦИДІВ ТА ІНСЕКТИЦИДІВ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

поліефір трисилоксан

ФОРМУЛЯЦІЯ:

розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:

5 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Значно покращує змочування поверхні рослин робочим розчином
- Завдяки інноваційній формулі дозволяє знижувати норму витрати препарату
- Забезпечує високу і стабільну ефективність засобів захисту рослин і добрив завдяки значному збільшенню площі покриття
- Підвищує системність препаратів та стійкість до змивання опадами
- Забезпечує надійне змочування навіть сильно опушених об'єктів

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Завдяки своїм властивостям Флокс Експерт, РК утворює однорідну плівку на поверхні рослин, що зменшує поверхневий натяг робочого розчину. За рахунок цього, робочий розчин краще поглинається рослиною, тим самим прискорюючи швидкість дії та поліпшує ефективність обробки рослини.

З ЯКИМИ ПРЕПАРАТАМИ СЛІД ЗАСТОСОВУВАТИ ФЛОКС ЕКСПЕРТ, РК?

Рекомендовано застосовувати з наступними препаратами:

- | | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| • Аболір, ВГ | • Крейсер, ВГ | • Ріфос, КЕ |
| • Апач ВГ | • Легіон, ВГ | • Арбалет, КС |
| • Вулкан Плюс, РК | • Меркурій, ВГ | • Корнет, КС |
| • Гурон, ВГ | • Футурин, ВГ | • Ретардин, ВГ |
| • Дікам Плюс, РК | • Альтекс, КЕ | • Форсаж, КС |
| • Ефес, РК | • Дестрой, КС | • Юнкер, ЗП |
| • Канцлер, ВГ | • Ін Сет, ВГ | • Везувій, РК |
- мікродобривами
• регуляторами росту

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

Коли слід використовувати Флокс Експерт, РК?

Флокс Експерт, РК слід додавати в бакову суміш в наступних випадках:

- До гербіцидів – за наявності бур'янів в умовах посухи та наявності бур'янів з потужним восковим нальотом (лобода біла, гірчак рожевий, амброзія полинолиста, та ін.)
- Для захисту від хвороб, шкідників та підживлення сільськогосподарських культур, листя яких має восковий наліт (ріпак, буряки, горох, цибуля, часник)
- В разі застосування мінімальних норм використання засобів захисту рослин

Флокс Експерт, РК може використовуватися в якості інгредієнта в рецептурах, за умови, що всі інгредієнти сумісні. Силіконова поверхнево-активна речовина стабільна в водних розчинах при рН = 6,5-7,5, але швидко розкладається в більш кислотних та лужних.

НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ:

Група препаратів	Витрата (мл/100л робочого розчину)
Регулятори росту	25-50*
Гербіциди	25-150*
Інсектициди	25-100*
Фунгіциди	15-50*
Добрива	15-100*

* – максимальні норми слід застосовувати за наступних обставин: обробка рослин з потужним восковим нальотом, складні погодні умови (жарка, посушлива погода).



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Флокс Експерт, РК безпечний для оброблюваних рослин. Однак, при застосуванні препарату в бакових сумішах можливий прояв фітотоксичності, щоб запобігти цьому, перед внесенням на великих площах рекомендується обробити невелику ділянку даною комбінацією.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

4 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +2°C до +35°C



Чи варто використовувати ПАР (поверхнево-активні речовини)?



Professional
Професійна серія

Флокс® Профі, РК

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СИЛІКОНОВИЙ АГЕНТ, ОРГАНО-СИЛІКОНОВА ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНА РЕЧОВИНА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕСТИЦИДІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ ҐРУНТОВИХ ГЕРБІЦИДІВ ТА ПРЕПАРАТІВ НА ОЛІЙНІЙ ОСНОВІ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
поліефір полісиліоксан

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
1 л пластикова пляшка

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Найширший спектр застосування серед ПАР, в тому числі з ґрунтовими гербіцидами та препаратами на олійній основі
- Зменшує норму витрати препарату до 20%, а також обсяг витрати робочої рідини на 20 - 50%
- На відміну від інших ПАР забезпечує не лише покриття, а й швидке проникнення препаратів в рослини
- Підвищує стійкість до змивання препарату опадами, запобігає розкладанню ультрафіолетовими променями
- Ефективний в широкому діапазоні рН (від 6 до 8)
- Не піниється при приготуванні робочого розчину

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Флокс Профі, РК значно сильніше знижує поверхневий натяг водних сільськогосподарських сумішей, ніж це досягається при використанні звичайних поверхнево-активних речовин. При таких низьких концентраціях, як 0,01 відсотка, він знижує поверхневий натяг нижче 23 дин/см, що забезпечує дуже швидке змочування і розтікання по важко змочуваним поверхням, таким як листя з восковим нальотом.

На додаток до швидкого змочування і поширення, Флокс Профі, РК також значно збільшує поглинання хімічних речовин в рослинних тканинах. Додавання силіконової поверхнево-активної речовини в суміш для гербіцидів може значно підвищити їх ефективність, особливо в боротьбі з широколистяними бур'янами за допомогою водорозчинних гербіцидів. Швидке поглинання запобігає змиванню.

З ЯКИМИ ПРЕПАРАТАМИ СЛІД ЗАСТОСОВУВАТИ ФЛОКС ПРОФІ, РК?

Флокс Профі, РК рекомендовано застосовувати з наступними препаратами:

- Деліт, РК
- Екстрем, КЕ
- Корвет, КС
- Нікоміл, МС
- Пропозит, КЕ
- Рейтар, КС
- Сулам, СЕ
- Тайфун, КЕ
- Баліста, КЕ
- Ретардин EW, EB
- мікродобривами
- регуляторами росту

Флокс Профі, РК може використовуватися в якості інгредієнта в рецептурах, за умови, що всі інгредієнти сумісні. Силіконова поверхнево-активна речовина стабільна в водних розчинах при рН = 6,0-8,0, але швидко розкладається в більш кислотних та лужних.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

Коли слід використовувати Флокс Профі, РК?

Флокс Профі, РК слід додавати в бакову суміш в наступних випадках:

- До гербіцидів за наявності умов посухи та наявності бур'янів з потужним восковим нальотом (лобода біла, гірчак рожевий, амброзія полинолиста, та ін.). Для підвищення ефективності ґрунтових гербіцидів та гербіцидів з ґрунтовою дією
- Для захисту від хвороб, шкідників та підживлення сільськогосподарських культур, листя яких має восковий наліт (ріпак, буряки, горох, цибуля, часник)
- В разі застосування мінімальних норм використання засобів захисту рослин.

НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ:

Група препаратів	Витрата (мл/100л робочого розчину)
Регулятори росту	30-50*
Гербіциди страхові	30-150*
Гербіциди ґрунтові	150-200*
Фунгіциди	30-100*
Добрива	20-100*

* – максимальні норми слід застосовувати за наступних обставин: обробка рослин з потужним восковим нальотом, складні погодні умови (жарка, посушлива погода).



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Флокс Профі, РК безпечний для оброблюваних рослин. Однак, при застосуванні препарату в бакових сумішах можливий прояв фітотоксичності, щоб запобігти цьому, перед внесенням на великих площах рекомендується обробити невелику ділянку даною комбінацією.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

IV клас небезпечності.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

4 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +2°C до +35°C



ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ОРГАНО-СИЛІКОНОВИЙ ПІНОГАСНИК

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

полідиметилсилоксан 40%

ФОРМУЛЯЦІЯ:

масляна емульсія

УПАКУВАННЯ:

1 л пластикова пляшка

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- попереджає утворення піни
- зменшує витрати часу на приготування робочого розчину
- не змінює структуру робочого розчину
- покращує ефективність застосування пестицидів
- забезпечує швидкий результат

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Принципом дії ЛЕНС® є утворення непроникної плівки, яка підвищує поверхневий натяг води та запобігає утворенню пухирців газу (піни). Як результат, утворення піни стає неможливим, тобто у воді препарат заміщує молекули поверхнево-активної речовини, які знаходяться у верхньому шарі. В результаті цього моношарова плівка поверхнево-активної речовини утворює пори (руйнується). За рахунок цього підвищується корисна ємність обладнання та зменшуються витрати часу на приготування робочого розчину, процес стає максимально економним та продуктивним.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ:

ЛЕНС® - ад'ювант для приготування бакових сумішей, який сумісний з усіма засобами захисту рослин. Препарат можна застосовувати з усіма формуляціями пестицидів і зокрема з КС, ЕВ, МЕ і МС. Але в будь-якому випадку слід перевірити на сумісність. Найбільш ефективний у роботі з пестицидами на основі водних розчинів (РК), що схильні до надмірного піноутворення.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:



Приготування робочого розчину:

Перед використанням ємність з препаратом слід ретельно струсити. Частково наповніть бак обприскувача водою на 1/3-1/2 від об'єму. Увімкніть мішалку обприскувача і продовжуйте перемішування протягом приготування робочого розчину та обприскування. Додайте ЛЕНС® у рекомендованих нормах. Далі заповніть на 2/3 бак, додайте інші компоненти в послідовності: водорозчинні порошки (ВП), водорозчинні гранули (РГ), концентрат суспензії (КС), концентрат, що емульгуються (КЕ), емульсія, масло (олія) у воді (ЕВ) або суспо-емульсії (СЕ), розчинні концентрат (РК). Долийте бак обприскувача до повного. Після внесення препарату необхідно провести ретельне промивання баку, магістральних трубопроводів та наконечників чистою водою.



УВАГА! Не залишайте бакову суміш з силіконовим піногасником у обприскувачі без постійного перемішування більше ніж на добу, бо це може призвести до забивання форсунок і поломки робочих частин обприскувача.

Коли піна в робочому розчині вже утворилася, що робити?

Необхідно розвести ЛЕНС® у воді (10 частин води + 1 частина препарату). Даний розчин розповсюджувати на піну до досягнення необхідного ефекту.



УВАГА! ЛЕНС® повинен завжди додаватися в воду, а не навпаки.

НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ:

5 – 10 мл на 100 л робочого розчину.

* – норми застосування можуть варіювати відповідно до розміру баку, типу перемішування, характеристики інгредієнтів та води. Для сумішей, які утворюють важкоконтрольовану піну може знадобитися максимальна норма.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

IV клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

2 роки при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +5°C до +40°C. Забороняється зберігання у пошкодженій тарі.



Professional
Професійна серія

Бор Маджестик®, Рід

МІКРОДОБРИВО РЕКОМЕНДОВАНЕ ДЛЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ КУКУРУДЗИ, ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР (СОНЯШНИКУ) І РОСЛИН З СИМПТОМАМИ ДЕФІЦИТУ БОРУ (ЗЕРНОВІ)



СКЛАД: бор (В) – 11%, азот (N) – 4,8%, фосфор (P₂O₅) – 2%, калій (K₂O) – 4% та мікроелементи: Cu (EDTA) – 0,05%, Fe (EDTA) – 0,075%, MgO – 0,5%, Mn (EDTA) – 0,031%, Mo (молібдат) – 0,001%, Zn (EDTA) – 0,05%

ФОРМУЛЯЦІЯ: рідина

УПАКУВАННЯ: 10 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ МІКРОДОБРИВА:

- Високоєфективний і простий у використанні
- Підвищена засвоєність бору, завдяки наявності азоту й фосфору
- Підвищує жаро-, посухо-, морозостійкість рослин
- Підвищує стійкість до бактеріальних і грибкових захворювань
- Зміцнює зв'язки з майже всіма засобами захисту рослин та карбамідом
- Оптиміальна концентрація мікроелементів для виведення рослин зі стресового стану
- Підвищує врожайність культур
- Регулює запилення та запліднення, знижує абортивність у сої

ОПИС ПРОДУКТУ:

Бор Маджестик, Рід – це концентроване мікродобриво з високим вмістом бору, азоту та мікроелементів для коригування та усунення дефіциту бору у сої, цукрових буряків і кукурудзи, а також інших культур. Наявність додаткових речовин посилює дію бору й запобігає можливому дисбалансу елементів живлення. Катіони мікроелементів Cu, Fe, Mn та Zn повністю хелатовані EDTA.

ВЛАСТИВОСТІ:

Функції бору пов'язані з процесами метаболізму вуглеводів і перенесення цукрів через мембрани, синтезу нуклеїнових кислот (ДНК і РНК) і фітогормонів, формування стінок клітин, регуляції росту, дихання.

Симптоми дефіциту бору починають проявлятися у злаків при вмісті цього елемента 5–10 мг/кг, у більшості дводольних – при зменшенні його концентрації до 20–70 мг/кг сухої маси.

Типовою ознакою нестачі бору є пригнічення точок росту у рослин, головним чином, у дводольних при нестачі бору порушується формування генеративних органів рослин, пригнічується ріст бруньок і молодого листя. При гострому дефіциті бруньки відмирають. Міжвузля стають укороченими, рослини набувають ознак куцуватості. У листя з'являється межжилковий хлороз.

Найбільш чутливі до дефіциту бору буряк, льон, цвітна капуста, бруква, турнепс, яблуня, груша.

Підживлення препаратом Бор Маджестик, Рід сприяє кращому запиленню й зав'язуванню плодів, зменшує абортивність, регулює водний баланс клітин рослини, впливає на ріст і розвиток меристеми, сприяє кращому поділу клітин. Він збільшує швидкість перенесення цукрів від зрілих листків до активно зростаючих частин рослини.

Препарат стійкий до змиття та випаровування, рівномірно проникає у рослину та має ефект реактивації (навіть після висихання відносна вологість атмосфери забезпечує реактивацію в'язкого осаду, запобігає утворенню нерозчинних сольових сполук). Для досягнення необхідного ефекту можна проводити декілька позакорневих обробок препаратом за сезон.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ:

Обприскування вегетуючих рослин в баковій суміші з добривами і засобами захисту рослин після проби на сумісність. Можливе застосування Бор Маджестик, Рід як при листових підживленнях рослин, так в системі крапельного поливу. Використовується як самостійно (в критичні фази розвитку борофільних культур), так і в бакових сумішах з макродобривами і мікродобривами для забезпечення повноцінного живлення рослин. Використовують будь-яке стандартне обладнання. Робочий розчин готують перед вживанням, розбавляючи 1:100 – 1:200 до концентрації 0,5–1%. Оптиміальна температура робочого розчину +15–20°C, при температурі повітря +10–25°C і середньодобовій температурі не нижче +5°C. Підживлення проводять рано вранці або ввечері, уникаючи яскравого сонця, дощу і сильного вітру.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

4 роки при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

від +1°C до +35°C

БОР МАДЖЕСТИК, РІД ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробки
Озима пшениця, кукурудза, соняшник, томати	1,0–3,0	Позакореневе живлення

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Фази внесення	Норма витрати, л/га
Ріпак	Осінь: формування розетки; весна: подовження квітконіжки; бутонізація, до початку цвітіння	1,0–2,0
Буряки цукрові та столові	2 обробки: 4–6 справжніх листків – до змикання міжрядь	2,0–3,0
Соя	4–6 трійчастих листків, бутонізація	1,0–3,0
Картопля	Бутонізація, утворення столонів	1,0–2,0
Виноград	2 обробки: початок повного цвітіння – кінець цвітіння	2,0–3,0



Кукурудза



Соняшник



Томати



Буряк



Картопля



Соя



Виноград



Ріпак





Professional
Професійна серія

Цинк Маджестик[®], Рід



МІКРОДОБРИВО РЕКОМЕНДОВАНЕ ДЛЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ КУКУРУДЗИ, ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР (СОНЯШНИКУ) І РОСЛИН З СИМПТОМАМИ ДЕФІЦИТУ ЦИНКУ (ЗЕРНОВІ)

СКЛАД: цинк (Zn) (EDTA) – 13%, солі гумінових кислот – 10 г/л, азот (N) – 5%, фосфор (P₂O₅) – 2%, калій (K₂O) – 4% та мікроелементи:
бор (B) – 0,15%, Cu (EDTA) – 0,05%, Fe (EDTA) – 0,075%, Mn (EDTA) – 0,031%, Mo (молібдат) – 0,001%, MgO – 0,05%

ФОРМУЛЯЦІЯ: рідина

УПАКУВАННЯ: 10 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ МІКРОДОБРИВА:

- Швидке проникнення через листок і висока безпечність для культури
- Наявність спеціальних добавок забезпечує оптимальне поглинання поживних речовин незалежно від погодних умов
- Сумісний з більшістю пестицидів
- Підвищує водоутримуючу здатність рослин, їх жаро-, посухо-, морозо- і солестійкість
- Підвищують стійкість до бактеріальних і грибкових захворювань (фітофтора картоплі та ін.)
- Прискорює рухливості пилку в насінневих трубках, підвищує запилення рослин
- Підвищує засвоєння рослинами азоту (N) з ґрунту і добрив
- Підвищує врожайність культур

ОПИС ПРОДУКТУ:

Цинк Маджестик, Рід – це концентроване хелатне мікродобриво у вигляді рідини, яке рекомендується для профілактики й усунення дефіциту у широкого спектра культур. Відрізняється високим вмістом цинку в комплексі з іншими мікроелементами. Цинк Маджестик, Рід активізує біохімічні процеси в тканинах і клітинах рослин, підвищує стійкість культур до різних захворювань. Сприяє побудові 24 цинкозалежних ферментів, дихальних ферментів цитохромів А і Б, цитохромоксидази, алкогольдегідрози і гліцілгліциндіпептидази, утилізатора вуглекислого газу – карбоангідрози. Підживлення препаратом Цинк Маджестик, Рід впливають на кількість і якість врожаю багатьох культур. Кукурудза – істотно підвищується врожайність. Жито, овес, яра пшениця – збільшується врожайність, підвищується продуктивність колоса. При цьому соломина коротшає, а маса зерен збільшується. Вміст в зерні фосфору підвищується, а калію знижується. Цукровий буряк (коренеплоди) – збільшується врожайність і вміст цукру. Вишня, слива, персик – при обприскуванні в період цвітіння і повторно через 14 днів, не тільки значно збільшується врожайність, але й на 7-10 днів прискорюється дозрівання, збільшується розмір плодів, підвищується цукристість, кислотність зменшується. Яблуна – при внесенні цинкових мікродобрив у ґрунт збільшується приріст пагонів, поліпшується хімічний склад і лежкість яблук. Суниця, виноград – внесення цинкових добрив призводить до збільшення врожайності, підвищенню цукристості ягід. Позитивно впливає цинк на врожайність цілого ряду овочевих культур: томатів, огірків, капусти та інших. Однак, треба зазначити, що важливим чинником, що визначає ефективність застосування добрива, є ступінь забезпеченості рослин іншими елементами живлення.

ВЛАСТИВОСТІ:

Цинк в рослинах бере безпосередню участь у синтезі ауксинів, ДНК, рибосом та метаболізмів

вуглеводів, фосфатів і протеїнів. Крім того, цинк впливає на проникність мембран, що підвищує стійкість рослин до сухого і жаркого клімату, грибкових і бактеріальних захворювань. Підвищений рівень азоту і фосфору у ґрунті призводить до дефіциту цинку. Дефіцит цинку пригнічує поділ клітин в два-три рази. У всіх рослин дефіцит цього елемента призводить до затримки росту. Характерні зовнішні ознаки нестачі цинку – загальмований процес зростання, короткі міжвузля, маленька площа поверхні листової пластинки. Ці симптоми можуть поєднуватися з хлорозом. З часом на листках з'являються жовті цятки або плями сіро-бурого і бронзового кольору. Тканина цих ділянок відмирає. У плодівих дерев на кінцях гілок утворюються укорочені пагони з дрібним листям у вигляді розетки («розетність»), а при сильному дефіциті з'являється «суховершинність» і «карликовість». У кукурудзи – «побіління» або хлороз верхніх листків, а нове листа блідно-жовтого кольору. У томатів – «дрібнолистість» скручування листових пластинок і черешків. Крім того, при дефіциті цинку, зростання пагонів пригнічується більше, ніж ріст коренів, а урожай насіння знижується сильніше, ніж зменшується маса вегетативних органів. Підвищена чутливість до нестачі цинку у хмелю, гречки, картоплі, буряків, конюшини лучної. Найбільш чутливі до нестачі цинку плодіві культури. Добриво з високим вмістом цинку підвищує життєздатність рослини, сприяє кращому заплідненню, та збільшенню врожайності. Покращує якість врожаю, вміст цукрів. Для досягнення необхідного ефекту можна проводити декілька позакореневих обробок препаратом за сезон.



ІНСТРУКЦІ З ВИКОРИСТАННЯ:

Обприскування вегетуючих рослин в баковій суміші з азотно-калійними добривами і засобами захисту рослин після проби на сумісність. Використовують будь-яке стандартне обладнання. Робочий розчин готують перед вживанням, розбавляючи 1:100-1:200 до концентрації 0,5-1%. Оптимальна температура робочого розчину +15-20°C, при температурі повітря +10-25°C і середньодобовій температурі не нижче +5°C. Підживлення проводять 2 рази з інтервалом 3-4 тижні рано вранці або ввечері, уникаючи яскравого сонця, дощу і сильного вітру.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

4 роки при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

від +1°C до +35°C

ЦИНК МАДЖЕСТИК, РІД ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробки
Озима пшениця, кукурудза, соняшник, томати	1,0-3,0	Позакореневе живлення

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Фази внесення	Норма витрати, л/га
Ріпак	Осінь: формування розетки; весна: 5-7 листків; фаза зеленого бутону	1,0-2,0
Буряки цукрові та столові	6-8 справжніх листків – до змикання міжрядь	1,0-2,0
Соя	4-6 трійчастих листка, бутонізація	1,0-2,0
Картопля	Бутонізація, утворення столонів	1,0
Виноград	Перед початком цвітіння; перед початком досягання ягід	1,0-2,0
Кісточкові	Через 2-3 тижні після цвітіння	1,0
Зерняткові	У фазу рожевого бутону	1,0
Суниця	На початку вегетації перед цвітінням	1,0

УВАГА! З розчинними солями фосфорної кислоти і лужними продуктами утворює осад! Високоєфективний препарат, передозування неприпустиме!



Professional
Професійна серія

Калій Фреш®, П

ПРЕПАРАТ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ КАЛІЮ
ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ
ПРОДУКЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ РОСЛИН
ДО НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВ У РОЗВИНУТИХ
РОСЛИН

СКЛАД: гіберелін – 10 г/кг, азот (N) – 5%, фосфор (P₂O₅) – 15%,
калій (K₂O) – 38%
та мікроелементи: бор (B) – 0,025%, Cu (EDTA) – 0,01%,
Fe (EDTA) – 0,07%, Mg – 3%, Mn (EDTA) – 0,04%,
Mo (молібдат) – 0,04%, Zn (EDTA) – 0,025%

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ: 9,5 кг поліпропіленовий пакет

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Містить легкозасвоювані рослинами форми макроелементів та хелатовані мікроелементи
- До складу препарату входять азот в амонійній формі, фосфор у легкокорозійній формі дигідрофосфату
- Активізує процеси фотосинтезу та обміну речовин у листі рослин
- Покращує якісні показники продукції
- Поповнює дефіцит калію при його тимчасовій недоступності або нестачі в ґрунті
- Сприяє кращому засвоєнню поживних речовин через листя та з ґрунту
- Підвищує стійкість рослин до несприятливих погодних умов (заморозки, спека, посуха, надмірні опади)
- Підвищує стійкість рослин до грибних хвороб
- Присутність у складі речовин, які володіють поверхневою активністю, для покращення поглинання елементів живлення у листя рослин
- Фітотоксичність відсутня навіть при використанні у великій кількості
- Відсутність катіонів Na⁺ та аніонів Cl⁻
- Відмінна розчинність у воді
- Низький рівень електропровідності
- Забезпечується додаткове підвищення урожаю сільськогосподарських культур та особливо поліпшується його якість

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Це композиція водорозчинних та легко засвоюваних форм макроелементів живлення та мікроелементів у формі хелатів металів для коригування метаболічних процесів у клітинах та оптимізації трофічних зв'язків між органами у рослин. Результатом застосування препарату є покращення якісних показників продукції та підвищення стійкості рослин до несприятливих умов у розвинутих рослин.

Ефективність застосування препарату проявляється в покращенні якісних показників продукції і рекомендується до застосування після цвітіння рослин.

Калій Фреш, П доцільно також вносити до цвітіння в разі нестачі калію у ґрунті для подолання наслідків стресових умов. Рішення щодо застосування препарату з підвищеним рівнем калію приймається на підставі результатів рослинної діагностики та при прояві перших ознак дефіциту калію в рослинах. Для підсилення ефекту листового підживлення в кінці вегетації рослин можливо застосовувати в сумішах з препаратом Універсал Фреш, П. Калій Фреш, П може застосовуватися для підживлення всіх культур.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

КАЛІЙ ФРЕШ, П ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб, час обробки
Кукурудза, соняшник, ячмінь ярий	0,5-1,0	Позакореневе живлення



Professional
Професійна серія

Універсал Фреш®, П

ПРЕПАРАТ З РЕТЕЛЬНО ПІДБРАНОЮ
КОМПОЗИЦІЄЮ ЛЕГКО ЗАСВОЮВАНИХ
ФОРМ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ NPK
ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ФОРМІ ХЕЛАТІВ МЕТАЛІВ
ДЛЯ КОРИГУВАННЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТРОФІЧНИХ
ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ОРГАНАМИ У РОСЛИН

СКЛАД: бурштинова кислота – 40 г/кг, азот (N) – 20%,
фосфор (P₂O₅) – 20%, калій (K₂O) – 20%
та мікроелементи: бор (B) – 0,025%, Cu (EDTA) – 0,01%,
Fe (EDTA) – 0,07%, Mg – 3%, Mn (EDTA) – 0,04%,
Mo (молібдат) – 0,04%, Zn (EDTA) – 0,025%

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ: 9,5 кг, 10 кг поліпропіленовий пакет

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Містить легкозасвоювані для листя рослин форми макроелементів та хелатовані мікроелементи
- У складі препарату переважають амідні та амонійні форми азота, фосфор – у легкокорозійній формі дигідрофосфату
- Активізує процеси фотосинтезу та обміну речовин у листі рослин
- Сприяє кращому засвоєнню поживних речовин з ґрунту
- Підвищує стійкість рослин до несприятливих погодних умов (заморозки, спека, посуха, надмірні опади)
- Підвищує стійкість рослин до грибних хвороб
- Присутність у складі речовин, які володіють поверхневою активністю, для покращення поглинання елементів живлення листям рослин
- Відсутність прояву токсичної дії на рослини навіть при використанні у великій кількості
- Відсутність катіонів Na⁺ та аніонів Cl⁻
- Відмінна розчинність у воді
- Низький рівень електропровідності
- Забезпечується додаткове підвищення урожаю сільськогосподарських культур та покращується його якість

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Це ретельно підібрана композиція водорозчинних та легко засвоюваних форм макроелементів живлення та мікроелементів у формі хелатів металів для коригування метаболічних процесів у клітинах та оптимізації трофічних зв'язків між органами рослин. Результатом застосування препарату є активізація ростових процесів кореневої та вегетативної систем рослин. Універсал Фреш, П застосовується при нестачі чи тимчасовій недоступності поживних речовин в ґрунті, для покриття дефіциту елементів живлення для рослин в стресових умовах (погодні умови, хімічні обробки).

Для досягнення максимального ефекту від листового підживлення доцільно вносити неодноразово.

Кількість обробок може сягати трьох.

Універсал Фреш, П застосовується для підживлення всіх культур протягом вегетації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

УНІВЕРСАЛ ФРЕШ, П ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб, час обробки
Кукурудза, соняшник, ячмінь ярий	0,5-1,0	Позакореневе живлення





Professional
Професійна серія

Фосфор Фреш®, П

ПРЕПАРАТ З РЕТЕЛЬНО ПІДБРАНОЮ КОМПОЗИЦІЄЮ ЛЕГКО ЗАСВОЮВАНИХ ФОРМ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ НРК ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ФОРМІ ХЕЛАТІВ МЕТАЛІВ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ФОСФОРУ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ АКТИВІЗАЦІЇ РОСТОВИХ ПРОЦЕСІВ У КОРЕНЕВІЙ СИСТЕМІ В ПЕРІОД ЇЇ УТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ



СКЛАД: індолілмасляна кислота – 10 г/кг, азот (N) – 10%, фосфор (P₂O₅) – 40%, калій (K₂O) – 11% та мікроелементи: бор (B) – 0,025%, Cu (EDTA) – 0,01%, Fe (EDTA) – 0,07%, Mg – 3%, Mn (EDTA) – 0,04%, Mo (молібдат) – 0,04%, Zn (EDTA) – 0,025%

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ: 9,5 кг поліпропіленовий пакет

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Містить легкозасвоювані листям рослин форми макроелементів та хелатовані мікроелементи
- У складі препарату міститься фосфор у легкокорозчинній формі дигідрофосфату
- Прискорює та активізує процеси утворення і розвитку кореневої системи на початку вегетації
- Покращує споживання фосфору за його тимчасової недоступності або нестачі в ґрунті
- Сприяє кращому засвоєнню поживних речовин з ґрунту
- Підвищує стійкість рослин до несприятливих погодних умов (заморозки, спека, посуха, надмірні опади)
- Підвищує стійкість рослин до грибних хвороб
- Присутність у складі речовин, які володіють поверхневою активністю, для покращення поглинання елементів живлення у листя рослин
- Фітотоксичність відсутня навіть при використанні у великій кількості
- Відсутність катіонів Na⁺ та аніонів Cl⁻
- Відмінна розчинність у воді
- Низький рівень електропровідності
- Забезпечується додаткове підвищення урожаю сільськогосподарських культур та покращується його якість

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Це водорозчинна композиція з легко засвоюваних форм макроелементів живлення та мікроелементів у формі хелатів металів з підвищеним вмістом фосфору для коригування метаболічних процесів у клітинах та оптимізації трофічних зв'язків у тканинах коренів рослин. Результатом застосування препарату є максимальна активізація ростових процесів у кореневій системі в періоді утворення та розвитку. Особливо актуальним є застосування під час активного формування кореневої системи в період від сходів до цвітіння рослин. Фосфор Фреш, П також застосовується при нестачі чи тимчасовій недоступності фосфору для рослин. Як правило, це проявляється в особливо стресових умовах (погодні умови, хімічні обробки). Рішення щодо застосування препарату з підвищеним рівнем фосфору приймається на підставі результатів рослинної діагностики та перших симптомів дефіциту фосфору в рослинах. Для підсилення ефективності листового підживлення можливе поєднання застосування в сумішах з препаратом Універсал Фреш, П. Фосфор Фреш, П може застосовуватися для підживлення всіх культур.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

ФОСФОР ФРЕШ, П ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб, час обробки
Кукурудза, соняшник, ячмінь ярий	0,5-1,0	Позакореневе живлення



Professional
Професійна серія

Аміно Фреш®, Рід

РЕГУЛЯТОР РОСТУ НА ОСНОВІ АМІНОКИСЛОТ ІЗ ВИСОКИМ ВМІСТОМ АЗОТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕМБРАННОЇ, МЕТАБОЛІЧНОЇ І ГЕНЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СИСТЕМ У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТРОФІЧНОЇ І ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІВ РОСЛИН



СКЛАД: амінокислоти – 150 г/л, бурштинова кислота – 0,5 г/л, екстракт морських водоростей – 0,5 г/л, солі гумінових або фульвових кислот – 0,5 г/л, гіберелін – 0,05 г/л, індолілмасляна кислота – 0,05 г/л, азот (N) – 11%, фосфор (P₂O₅) – 2%, калій (K₂O) – 4% та мікроелементи: бор (B) – 0,15%, Cu (EDTA) – 0,5%, Fe (EDTA) – 0,7%, Mg – 0,05%, Mn (EDTA) – 0,7%, Mo (молібдат) – 0,01%, Zn (EDTA) – 0,5%

ФОРМУЛЯЦІЯ: рідина

УПАКУВАННЯ: 10 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ:

- Високий вміст амінокислот, проамінокислот та білкових речовин
- Превалювання у препараті фізіологічно важливих амінокислот, серед яких особливо цінними є триптофан, аргінін, аспарагін та інші
- До складу регулятора росту входить азот в амідній та амонійній формі, тому препарат є одночасно добривом з властивостями коригувати та регулювати азотний обмін у рослин
- Застосуванням препарату досягається швидкий ефект у коригуванні обмінних процесів, явним проявом дії стимулятора є підвищення вмісту хлорофілу у клітинах та збільшенню фотосинтетичної активності
- Покращуються фізіологічні процеси пов'язані з функціонуванням покривних тканин листя і водно-повітряного і поживного обміну та обміну поживних речовин між рослинами та зовнішнім середовищем
- Цей регулятор росту є композицією фізіологічно активних речовин, з властивостями нівелювання негативних наслідків дії високих температур на фоні дефіциту вологи в ґрунті та пестицидів після обробки рослин
- Відсутність прояву токсичної дії на рослини навіть при використанні регулятора росту у великій кількості

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Аміно Фреш, Рід - це композиція фізіологічно важливих амінокислот з високим вмістом азоту для коригування мембранної, метаболічної і генетичної активності систем у клітинах та оптимізації трофічної і електрофізіологічної систем регуляції між органами у рослин.

При застосуванні регулятора росту досягається швидкий ефект у підвищенні вмісту хлорофілу у клітинах та збільшенню фотосинтетичної активності, оптимізується азотний обмін.

Аміно Фреш, Рід доцільно вносити для подолання негативних наслідків дії високих температур на фоні дефіциту вологи в ґрунті та нівелювання токсичної дії пестицидів при застосуванні в несприятливих погодних умовах для росту і розвитку рослин. Для досягнення максимального ефекту від листового підживлення доцільно проводити декілька внесень. Кількість обробок може сягати трьох. Регулятор росту застосовується на всіх культурах протягом вегетації.

НОРМИ ВНЕСЕННЯ РЕГУЛЯТОРУ РОСТУ АМІНО ФРЕШ, РІД ПРИ ЛИСТОВОМУ ПІДЖИВЛЕННІ

Норма внесення регулятора росту становить від 0,5 до 1,0 л на гектар. Кратність застосування 3 рази. Інтервал між обробками може становити 7-10 днів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 4 роки при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

АМІНО ФРЕШ, РІД ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробки
Озима пшениця, кукурудза, ячмінь ярий, соняшник	0,5-1,0	Позакореневе живлення

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Необхідність застосування	Норма витрати, л/га
Для підсилення гербіцидного ефекту; для підкислення робочого розчину	0,2
Для зняття гербіцидного стресу	0,5-1,0





Professional
Професійна серія

Гуміленд Фреш®, Рід

РЕГУЛЯТОР РОСТУ ДЛЯ РОСЛИН НА ОСНОВІ ГУМІНОВОЇ ТА ФУЛЬВОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕМБРАННОЇ І МЕТАБОЛІЧНОЇ АКТИВНОСТІ У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТРОФІЧНОЇ І ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІВ РОСЛИН



СКЛАД: солі гумінових кислот – 120 г/л, солі фульвокислот – 60 г/л, амінокислоти – 0,5 г/л, бурштинова кислота – 0,5 г/л, екстракт морських водоростей – 0,5 г/л, гіберелін – 0,05 г/л, індолілмасляна кислота – 0,05 г/л, азот (N) – 2,5%, фосфор (P₂O₅) – 2%, калій (K₂O) – 4% та мікроелементи: бор (B) – 0,15%, Cu (EDTA) – 0,05%, Fe (EDTA) – 0,075%, Mg – 0,05%, Mn (EDTA) – 0,031%, Mo (молібдат) – 0,008%, Zn (EDTA) – 0,076%

ФОРМУЛЯЦІЯ: рідина

УПАКУВАННЯ: 10 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ:

- Високий вміст фізіологічно активних речовин - фульвокислот, які відновлюють функції мембран і стінок клітин та є будівельним матеріалом для синтезу продуктів вторинного обміну з антистресовими властивостями
- Фульвокислоти належать до комплексонат утворюючих речовин з неорганічними та органічними сполуками. Тому, підвищують ефективність застосування мікродобрив, інсектицидів та фунгіцидів при листовій обробці
- До складу рід регулятора входить калій - важливий елемент для коригування та регулювання процесів живлення, функціонування мембран у клітин та отримання якісної продукції рослинництва
- Препарат відзначається особливою ефективністю для оптимізації поживного режиму в рослинах при холодній та вологій погоді, перезволоженні та недостатній аерації ґрунту
- Застосуванням препарату прискорюються ростові процеси, активізується розвиток рослин
- Відсутність прояву токсичної дії на рослини навіть при використанні рід регулятора у великій кількості

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Препарат створений на основі калійних солей фульвокислот, які належить до легкорозчинної фракції гумінових речовин. Представляють собою високомолекулярні сполуки. Завдяки біохімічній близькості до мембран та стінок клітин фульвокислоти легко проникають у рослини. Фульвокислоти є чудовим будівельним матеріалом для клітинних мембран та стінок, продуктів вторинного обміну відповідальних до підвищення стійкості рослин до дії стресових факторів.

Фульвові кислоти здатні до активного утворення комплексних сполук з елементами живлення такими як азот, фосфор, калій та мікроелементами, а також з багатьма органічними сполуками. Комплекс на основі фульвокислот також легко проникає у клітини рослин. Тому, при застосуванні фульвокислот разом з мікродобривами, інсектицидами або фунгіцидами ефективність дії значно підвищується.

Калій, який входить до складу препарату, не тільки покращує фізико- і біохімічні властивості фульвокислот, також відіграє важливу роль у коригуванні метаболічних процесів у клітинах та оптимізації трофічних зв'язків між органами у рослин.

При застосуванні стимулятора росту досягається покращення якісних показників продукції та підвищується стійкість рослин до несприятливих умов у рослин.

Препарат доцільно вносити для оптимізації поживного режиму в рослинах при холодній та вологій погоді, перезволоженні та недостатній аерації ґрунту.

НОРМИ ВНЕСЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ГУМІЛЕНД ФРЕШ, РІД ПРИ ЛИСТОВОМУ ПІДЖИВЛЕННІ. СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТИВ-АНАЛОГІВ:

Норма внесення регулятора при листових підживленнях від 0,2 до 0,4 літрів на гектар під час вегетації при сумісному використанні засобів захисту рослин: – для покращення дії пестицидів, – для стимулювання ростових процесів, – для посилення опору рослини стресам різної природи. Кратність застосування 3-4 рази за сезон. Інтервал між обробками повинен становити 7-10 діб.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 4 роки при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

ГУМІЛЕНД ФРЕШ, РІД ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробки
Озима пшениця, кукурудза, ячмінь ярий, соняшник	1,0-3,0	Позакореневе живлення

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТИВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробки
Буряки цукрові, ріпак озимий, соя, горох, картопля, овочі	1,0-3,0	Позакореневе живлення



Professional
Професійна серія

Енергія Фреш®, П

РЕГУЛЯТОР РОСТУ ДЛЯ РОСЛИН НА ОСНОВІ ІНДОЛІЛМАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ З МАКРОЕЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕТАБОЛІЧНОЇ І ГЕНЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ГОРМОНАЛЬНОЇ І ТРОФІЧНОЇ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІВ РОСЛИН



СКЛАД: індолілмасляна кислота – 40 г/кг, азот (N) – 5,4%, фосфор (P₂O₅) – 5%, калій (K₂O) – 8% та мікроелементи: бор (B) – 0,025%, Cu (EDTA) – 0,01%, Fe (EDTA) – 0,07%, Mg – 3%, Mn (EDTA) – 0,04%, Mo (молібдат) – 0,04%, Zn (EDTA) – 0,025%

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ: 5 кг фольгований пакет

ПЕРЕВАГИ РЕГУЛЯТОРУ РОСТУ:

- Препарат на основі синтетичного ауксину – індолілмасляної кислоти, гормону стимулюючого коренеутворення у рослин
- Надзвичайно ефективний агрозахід – листкове підживлення цим препаратом на початку вегетації для росту і розвитку кореневої системи у молодих рослин
- До складу регулятора росту входить азот, фосфор і калій – важливі елементи для коригування та регулювання процесів живлення
- Активізує процеси фотосинтезу та обміну речовин у листі рослин
- Сприяє кращому засвоєнню поживних речовин з ґрунту
- В результаті застосування препарату прискорюються ростові процеси, активізується розвиток рослин
- Відсутність прояву токсичної дії на рослини навіть при використанні рід регулятора у великій кількості

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

До складу препарату входить синтетичний ауксин відповідальний за ріст і розвиток кореневої системи – індолілмасляна кислота. Обробка цим препаратом особливо актуальна на початку росту і розвитку рослин для стимулювання коренеутворення.

Регулятор росту може також застосовуватися при нестачі чи тимчасовій недоступності поживних речовин в ґрунті, для покриття дефіциту елементів живлення для рослин в стресових умовах (погодні умови, хімічні обробки).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

ЕНЕРГІЯ ФРЕШ, П ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб, час обробки
Ярий ячмінь, пшениця, кукурудза, соняшник	0,5-1,0	Позакореневе живлення



Соняшник



Кукурудза



Ярий ячмінь, пшениця





Professional
Професійна серія

Ленд Фреш®, П

РЕГУЛЯТОР РОСТУ ДЛЯ РОСЛИН НА ОСНОВІ КАЛІЄВОЇ СОЛІ ФУЛЬВОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕМБРАННОЇ І МЕТАБОЛІЧНОЇ АКТИВНОСТІ У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТРОФІЧНОЇ І ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІВ РОСЛИН



СКЛАД: солі фульвокислот – 500 г/кг, азот (N) – 3%, фосфор (P₂O₅) – 5%, калій (K₂O) – 10% та мікроелементи: бор (B) – 0,025%, Cu (EDTA) – 0,01%, Fe (EDTA) – 0,07%, Mg – 3%, Mn (EDTA) – 0,04%, Mo (молібдат) – 0,04%, Zn (EDTA) – 0,025%

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ: 5 кг фольгований пакет

ПЕРЕВАГИ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ:

- Високий вміст фізіологічно активних речовин – фульвокислот, що відновлюють функції мембран і стінок клітин та є будівельним матеріалом для синтезу продуктів вторинного обміну з антистресовими властивостями
- Фульвокислоти належать до комплексонат утворюючих речовин з неорганічними та органічними сполуками. Тому, підвищують ефективність застосування мікродобрив, інсектицидів та фунгіцидів при листовій обробці
- До складу ріст регулятора входить калій – важливий елемент для коригування та регулювання процесів живлення, функціонування мембран у клітин та отримання якісної продукції рослинництва
- Препарат відзначається особливою ефективністю для оптимізації поживного режиму в рослинах за холодної та вологої погоди, перезволоженні та недостатньої аерації ґрунту
- Під дією препарату прискорюються ростові процеси, активізується розвиток рослин
- Відсутність прояву токсичної дії на рослини навіть при використанні ріст регулятора у великій кількості

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Препарат створений на основі калійних солей фульвокислот, які належить до легкорозчинної фракції гумінових речовин. Представляють собою високомолекулярні сполуки. Завдяки біохімічній близькості до мембран та стінок клітин фульвокислоти легко проникають у рослини, фульвокислоти є чудовим будівельним матеріалом для клітинних мембран та стінок, продуктів вторинного обміну відповідальних за підвищення стійкості рослин до дії стресових факторів.

Фульвові кислоти здатні до активного утворення комплексних сполук з елементами живлення такими як азот, фосфор, калій та мікроелементами, а також з багатьма органічними сполуками. Комплексонати на основі фульвокислот також легко проникають у клітини рослин. Тому, при застосуванні фульвокислот разом з мікродобривами, інсектицидами або фунгіцидами ефективність їх дії значно підвищується. Калій, який входить до складу препарату, не тільки покращує фізико – і біохімічні властивості фульвокислот, також відіграє важливу роль у коригуванні метаболічних процесів у клітинах та оптимізації трофічних зв'язків між органами у рослин.

При застосуванні стимулятора росту досягається покращення якісних показників продукції та підвищується стійкість рослин до несприятливих умов вегетації.

Препарат доцільно вносити для оптимізації поживного режиму в рослинах при холодній та вологій погоді, перезволоженні та недостатньої аерації ґрунту.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

ЛЕНД ФРЕШ, П ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб, час обробки
Кукурудза, соняшник, ячмінь ярий	0,3-1,0	Позакореневе живлення



Professional
Професійна серія

Мікс Фреш®, П

РЕГУЛЯТОР РОСТУ НА ОСНОВІ АМІНОКИСЛОТ ІЗ ВИСОКИМ ВМІСТОМ АЗОТУ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕМБРАННОЇ, МЕТАБОЛІЧНОЇ І ГЕНЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СИСТЕМ У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТРОФІЧНОЇ І ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІВ РОСЛИН



СКЛАД: амінокислоти – 150 г/кг, азот (N) – 10%, фосфор (P₂O₅) – 5%, калій (K₂O) – 8% та мікроелементи: бор (B) – 0,025%, Cu (EDTA) – 0,01%, Fe (EDTA) – 0,07%, Mg – 3%, Mn (EDTA) – 0,04%, Mo (молібдат) – 0,04%, Zn (EDTA) – 0,025%

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ: 5кг фольгований пакет

ПЕРЕВАГИ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ:

- Високий вміст амінокислот, про амінокислот та білкових речовин
- Превалювання у препараті фізіологічно важливих незамінних : амінокислот, серед яких особливо цінними є триптофан, аргінін, аспарагін, та інші
- До складу регулятора росту входить азот в амідній та амонійній формі, тому препарат є одночасно добривом, що коригує та регулює азотний обмін рослин
- В складі препарату присутні мікроелементи (мідь, залізо, марганець і цинк), які необхідні для синтезу життєво необхідних ферментів
- Всі мікроелементи знаходяться у вигляді комплексонатів з амінокислотами, які легко і швидко проникають у клітини. При цьому, мікроелементи швидко включаються в обмінні процеси
- Застосовуючи препарат можна повністю забезпечити рослини необхідними мікроелементами
- При використанні регулятора росту підвищується вміст хлорофілу у клітинах та зростає фотосинтетична активність, активізуються фізіологічні процеси пов'язані з функціонуванням покривних тканин листа, водно-повітряний та обмін поживних речовин всередині рослини та між рослинами та зовнішнім середовищем
- Мікс Фреш, П є композицією фізіологічно активних речовин та мікроелементів, що нівелюють негативні наслідки дії високих температур на фоні дефіциту вологи у ґрунті та пестицидів після обробки рослин
- Фітотоксичність відсутня навіть при перевищенні рекомендованих норм

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Мікс Фреш, П – це композиція фізіологічно важливих амінокислот з високим вмістом азоту та мікроелементів для коригування мембранної, метаболічної і генетичної активності систем у клітинах та оптимізації трофічної і електрофізіологічної систем регуляції між органами у рослин. Результатом застосування регулятора росту є швидке підвищення вмісту хлорофілу у клітинах та збільшення фотосинтетичної активності, оптимізація азотного обміну, ліквідація дефіциту важливих для життєдіяльності мікроелементів (мідь, залізо, марганець та цинк). Регулятор росту доцільно вносити для подолання дефіциту мікроелементів у рослинах та негативних наслідків дії високих температур на фоні дефіциту вологи в ґрунті. Препарат застосовується за перших ознак дефіциту мікроелементів. Для досягнення максимального ефекту доцільно проводити декілька внесень. Регулятор росту застосовується на всіх культурах протягом вегетації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

МІКС ФРЕШ, П ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб, час обробки
Ячмінь ярий, кукурудза, соняшник	0,5-1,0	Позакореневе живлення





Professional
Професійна серія

Флорід Фреш®, П



РЕГУЛЯТОР РОСТУ РОСЛИН НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН З МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕМБРАННОЇ, МЕТАБОЛІЧНОЇ І ГЕНЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СИСТЕМ У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТРОФІЧНОЇ, ГОРМОНАЛЬНОЇ І ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІВ РОСЛИН

СКЛАД: екстракт морських водоростей – 500 г/кг, амінокислоти – 15 г/кг, азот (N) – 3%, фосфор (P₂O₅) – 5%, калій (K₂O) – 16% та мікроелементи: бор (B) – 0,025%, Cu (EDTA) – 0,01%, Fe (EDTA) – 0,07%, Mg – 3%, Mn (EDTA) – 0,04%, Mo (молібдат) – 0,04%, Zn (EDTA) – 0,025%

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ: 5 кг фольгований пакет

ПЕРЕВАГИ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ:

- Високий вміст фітогормонів – до 0,06%, переважно цитокинінів (зеатин, ізопентениладенін та інші)
- Присутні необхідні для рослин амінокислоти, полі- і олігосахариди та вітаміни
- До складу рід регулятора входить азот, фосфор, калій та мікроелементи важливі для коригування та регулювання процесів живлення у рослин
- Під дією препарату прискорюються ростові процеси, активізується розвиток рослин
- Всі речовини, які входять до складу регулятора росту, відіграють також позитивну роль в оптимізації процесів обміну речовин після дії стресових умов та підвищення імунітету до інфекційних хвороб
- Регулятор росту є композицією фізіологічно активних речовин надзвичайно ефективних для стимулювання росту надземних органів рослин в період активного росту рослин
- Відсутність прояву токсичної дії на рослини навіть при використанні рід регулятора у великій кількості

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Препарат містить екстракти трьох видів морських водоростей багатих на рослинні гормональні речовини, оліго- та полісахариди, амінокислоти, водоростеву кислоту та органічні речовини з високим вмістом азоту, фосфору, калію та мікроелементів. Серед фітогормонів у препараті переважають цитокиніни (зеатин, ізопентениладенін та інші), які відповідають за регуляцію фізіологічних процесів в надземній частині рослин. Під впливом цитокинінів оптимізуються та запускаються процеси росту і розвитку надземної частини рослин з послідуною активацією життєдіяльності кореневої системи. Амінокислоти, полісахариди, олігосахариди та вітаміни, які також присутні у препараті відповідальні компоненти при синтезі білкових речовин та продуктів вторинного обміну. Роль вторинних продуктів обміну проявляється у підвищенні стійкості до несприятливих умов вегетації та збудників хвороб. Присутні у рід регуляторі азот, калій та мікроелементи сприяють покращенню метаболічних процесів у клітинах та оптимізації трофічних зв'язків між органами у рослин. При цьому, мікроелементи у формі комплексних сполук з органічними речовинами – амінокислотами надзвичайно легко засвоюються рослинами.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

ФЛОРИД ФРЕШ, П ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб, час обробки
Кукурудза, соняшник, ячмінь	0,2-0,4	Позакореневе живлення

ПОРЯДОК ПРИГОТУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ

При приготуванні бакових сумішей ЗЗР рекомендується наступна послідовність:

1. Частково наповніть бак обприскувача водою згідно з рекомендаціями на етикетці, на 1/3, або 1/2, або 3/4 від об'єму. Увімкніть мішалку обприскувача і продовжуйте перемішування протягом приготування робочого розчину та обприскування.
2. Додайте карбамід та (або) комплексні водорозчинні мікродобрива у вигляді кристалічних порошоків.
3. Додайте препарати у вигляді водорозчинних порошоків (ВР).
4. Додайте препарати у вигляді водорозчинних гранул (РГ), у вигляді гранул, що диспергуються у воді (ВГ).
5. Додайте препарати у вигляді концентратів суспензії (КС).
6. Додайте препарати у вигляді концентратів, що емульгуються (КЕ).
7. Додайте препарати у вигляді масляних дисперсій (МД).
8. Додайте препарати у вигляді емульсії, масла (олії) у воді (ЕВ) або суспо-емульсії (СЕ).
9. Додайте препарати у вигляді розчинних концентратів (РК).
10. Додайте прилипачі, ад'юванти.
11. Додайте рідкі мікродобрива та стимулятори росту, або їх маточні розчини.
12. Долийте бак обприскувача до повного.



УВАГА!
НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЗАСТОСОВУВАТИ В БАКОВИХ СУМІШАХ НАСТУПНІ ПРЕПАРАТИ:

1. Фосфорорганічні інсектициди (**Ріфос**), гербіциди, що містять похідні сульфонілсечовин (**Апач, Гурон, Канцлер, Крейсер, Нікоміл, Меркурій**) та імідазоліонів (**Молтено, Хантер, Юпітер**). А також використовувати (**Ріфос**) до 14 днів після внесення даних препаратів. Не змішувати з пестицидами, які мають лужну реакцію (сірчане вапно, мідь тощо).
2. Гербіциди **Ефес** та **Стилет**.
3. Гербіцид **Канцлер** – при використанні у посівах льону не використовувати з грамініцидами та ПАР **Флокс**.
4. При наявності у баковій суміші карбаміду, обробки повинні проводитись у вечірні та нічні години через можливість опіків.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ РІВЕНЬ рН РОБОЧОГО РОЗЧИНУ ДЛЯ ДЕЯКИХ ГРУП ПЕСТИЦИДІВ:

рН 3,5	Добре працюють гліфосати, не підходить для більшості пестицидів
рН 3,5-6,0	Підходить для негайного застосування та недовгого зберігання (1-2 години) більшості пестицидів, не підходить для препаратів групи сульфонілсечовин
рН 6,0-7,0	Нормально працюють більшість пестицидів
рН 7,0-7,5	Добре працюють сульфонілсечовини, зменшується ефективність інших пестицидів
рН ≥7,5	Значно знижується ефективність всіх пестицидів



БАКОВІ СУМІШІ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ СПЕКТРУ ДІЇ ТА ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБОК


Культура	Група препаратів	Фаза розвитку	Мета обробки	Бакова суміш, норма внесення		
Поля призначені під посів	Гербіцид	Обприскування вегетуючих бур'янів	Для підсилення дії на перерослі та стійкі двосім'ядольні бур'яни в умовах недостатнього зволоження	Вулкан Плюс (3-4 л) + Футурин (150 г) Вулкан Плюс (3-4 л) + Сулам (0,4 л) Деліт (2-3 л) + Футурин (150 г) Деліт (2-3 л) + Сулам (0,4 л)		
			Для підсилення дії на проблемні злакові бур'яни (очерет, гумай та ін.)	Вулкан Плюс (3-4 л) + Шквал (0,5 л) Деліт (2-3 л) + Шквал (0,5 л)		
Зернові колосові	Протруйник	Обробка насіння перед сівою	Для підсилення дії на кореневі гнилі та збудника снігової плісняви	Кольчуга Плюс (0,2 л) + Форсаж (0,5 л)		
			Для підсилення дії на збудників сажкових хвороб			
	Гербіцид	До появи прапорцевого листка	Для підсилення дії на лободу білу	Корвет (50-70 г) + Сулам (0,1-0,2 л) Меркурій (15 г) + Канцлер (10 г); Меркурій (20 г) + Сулам (0,2-0,25 л)		
		До появи другого міжвузля	Для підсилення дії на багаторічні та перерослі двосім'ядольні бур'яни	Меркурій (20 г) + Леґіон (80 г) Меркурій (15 г) + Дікам Плюс (0,5 л) Меркурій (10-15 г) + Ультра Плюс (0,4-0,6 л)		
Фунгіцид	До кінця кущення	Профілактично, або за перших ознак захворювання	Для уникнення резистентності та розширення спектру контрольованих грибних хвороб в посівах пшениці, та ріпаку	Ретардин (0,5 л) + Корнет (0,4-0,5 л)		
		До сходів бур'янів та культури	Для підсилення дії на бур'яни та подовження захисного періоду	Екстрем (1,5-2,2 л) + Рейтар (1,8-2,2 л) Пропозит (2,0-2,5 л) + Рейтар (1,8-2,2 л) Тайфун (1,5-2,0 л) + Рейтар (1,8-2,2 л) Ефес (1,5-2,5 л) + Канцлер (5-8 г) Ефес (2,0 л) + Юпітер (0,5 л)		
Соя	Гербіцид	1-3 трійчастих листки	Для підсилення дії на перерослі та стійкі двосім'ядольні бур'яни в умовах недостатнього зволоження	Ефес (2,5 л) + Юпітер (0,5 л)		
		2-3 трійчастих листка	Для кращого контролю стійких та перерослих бур'янів	Молтено (0,75 л) + Ефес (2,0 л)		
Горох	Гербіцид	1-3 трійчастих листки	Для підсилення дії на перерослі та стійкі двосім'ядольні бур'яни в умовах недостатнього зволоження	Ефес (2,5 л) + Юпітер (0,5 л)		
		3-5 справжніх листків	Для кращого контролю стійких та перерослих бур'янів	Молтено (0,75 л) + Ефес (2,0 л)		
Кукурудза	Гербіцид	До сходів бур'янів та культури	Для підсилення дії на бур'яни та подовження захисного періоду	Екстрем (1,5-2,2 л) + Рейтар (1,8-2,5 л) Пропозит (2,0-2,5 л) + Рейтар (1,8-2,5 л) Тайфун (1,5-2,0 л) + Рейтар (1,8-2,5 л)		
		3-7 листків у культурі	Для контролю як злакових, так і двосім'ядольних бур'янів	Крейсер (50 г) + Сулам (0,5 л) + ПАР Флокс (0,2 л) Канцлер (10 г) + Крейсер (40-50 г) + ПАР Флокс (0,2 л) Канцлер (10 г) + Нікоміл (0,7-1,0 л) Сулам (0,3-0,4 л) + Нікоміл (0,7-1,0 л)		
				Крейсер (50 г) + Футурин (150 г) + ПАР Флокс (0,2 л) Крейсер (40-50 г) + Дікам Плюс (1,0-1,2 л) + ПАР Флокс (0,2 л) Футурин (150 г) + Нікоміл (0,7-1,0 л) Дікам Плюс (0,7 л) + Нікоміл (0,7-1,0 л) Ультра Плюс (0,5-0,6 л) + Нікоміл (0,7-1,0 л)		
		3-5 листків у культурі	Для підсилення дії на перерослі та стійкі двосім'ядольні бур'яни	Канцлер (10 г) + Сулам (0,4 л) + ПАР Флокс (0,2 л) Канцлер (10 г) + Леґіон (60-120 г) + ПАР Флокс (0,2 л) Канцлер (10 г) + Дікам Плюс (0,7 л) + ПАР Флокс (0,2 л) Канцлер (10 г) + Ультра Плюс (0,5-0,6 л)		
				Нікоміл (0,7-1,0 л) + Леґіон (120 г) Крейсер (50 г) + Леґіон (80 г) + ПАР Флокс (0,2 л)		
		3-7 листків у культурі	Для підсилення дії на перерослі та стійкі двосім'ядольні бур'яни	Екстрем (1,5-2,2 л) + Рейтар (1,8-2,5 л) Пропозит (2,0-2,5 л) + Рейтар (1,8-2,5 л) Тайфун (1,5-2,0 л) + Рейтар (1,8-2,5 л)		
				Леґіон (120-200 г) + Стиллет (0,8-1,5 л) Леґіон (120 г) + Шквал (0,6-1,2 л)		
		Соняшник	Гербіцид	До сходів бур'янів та культури	Для підсилення дії на бур'яни та подовження захисного періоду	Екстрем (1,5-2,2 л) + Рейтар (1,8-2,5 л) Пропозит (2,0-2,5 л) + Рейтар (1,8-2,5 л) Тайфун (1,5-2,0 л) + Рейтар (1,8-2,5 л)
		Буряк	Гербіцид	1-3 пари справжніх листків	Для контролю як злакових, так і двосім'ядольних бур'янів	Леґіон (120-200 г) + Стиллет (0,8-1,5 л) Леґіон (120 г) + Шквал (0,6-1,2 л)
		Ріпак	Гербіцид	6-8 листків однорічних бур'янів, розетка-початок стеблуння у багаторічних	Для контролю як злакових, так і двосім'ядольних бур'янів	Леґіон (120 г) + Шквал (0,6-1,2 л)

ВАРІАНТИ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВ ТА СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ З ПРИВ'ЯЗКОЮ ДО ФАЗ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ЇХ СУМІШІ З ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Культури	Фаза розвитку	Мета обробки	Мікродобрива та стимулятори росту – бакова суміш, норма внесення	* Засоби захисту рослин (за умови спільного внесення)	
Озимі пшениця та ячміння	До посіву (обробка насіння)	Закладання та розвиток потужної кореневої системи та забезпечення необхідними елементами живлення на початку росту рослини	Енергія Фреш (0,5-1 кг/га) + (або) Фосфор Фреш (1-2 кг/га)	Фунгіцидний протруйник – Кольчуга Плюс, або Томагавк, або Гранвіт, або Галенон + інсектицидний протруйник – Ін Сет, або універсальний комбінований протруйник Пентафорс 322 FS	
		Підвищення енергії проростання травмованого насіння; захист проростків від післядії гербіцидів, внесення під попередник; високий вміст цинку, міді, заліза та марганцю сприяє гармонійному розвитку та зимостійкості рослин	Мікс Фреш (0,5-1 кг/га)		
	Кущення (осінь)	Прискорення появи сходів за холодної погоди і (або) пізніх посівів; покращення засвоєння елементів живлення з ґрунту; зимо- та холодостійкості	Ленд Фреш (0,3-1 кг/га), або Гуміленд Фреш (1-3 л/га)		
		Синтез цукрів, підвищення зимо- та холодостійкості	Калій Фреш (1-2 кг/га)	Фунгіцид – Форсаж, або Ретардин EW	
	Кущення (весна)	Стимуляція кущення (для посівів, що перезимували в фазі сходів – початок кущення)	Флорід Фреш (0,2-0,4 кг/га) + Фосфор Фреш (1-2 кг/га)	Обробка до застосування засобів захисту рослин	
		Розвиток потужної кореневої системи	Енергія Фреш (0,5-1 кг/га) + (або) Фосфор Фреш (1-2 кг/га)	1. Гербіцид – Сулам, або Дікам Плюс, або Корвет + фунгіцид – Арбалет, або Баліста, або Корнет, або Ретардин EW, або Форсаж + інсектицид – Ріфос, або Альтекс. 2. Гербіцид – Сулам, або Дікам Плюс, або Футурин, або Меркурій, або Гурон, або Корвет + фунгіцид – Арбалет, або Баліста, або Корнет, або Ретардин EW, або Форсаж + інсектицид – Альтекс	
		Покращення засвоєння елементів живлення з ґрунту; холодостійкості (в умовах затяжної холодної весни)	Ленд Фреш (0,3-1 кг/га), або Гуміленд Фреш (1-3 л/га) + (або) Фреш Калій (1-2 кг/га)		
		Покращення засвоєння елементів живлення з ґрунту; холодостійкості (в умовах затяжної холодної весни)	Ленд Фреш (0,3-1 кг/га), або Гуміленд Фреш (1-3 л/га) + (або) Калій Фреш (1-2 кг/га)	Гербіцид – Сулам, або Меркурій, або Гурон, або Корвет + фунгіцид – Арбалет, або Баліста, або Корнет, або Ретардин EW, або Форсаж	
	Соняшник	Поява прапорцевого листка	Забезпечення макро- та мікроелементами в доступній формі в період інтенсивного росту рослин	Універсал Фреш (1-2 кг/га)	Фунгіцид – Арбалет, або Баліста, або Корнет, або Ретардин EW
			Продовження фотосинтезу, підвищення кількісних та якісних показників врожаю	Флорід Фреш (0,2-0,4 кг/га) + Аміно Фреш (0,5-1 л/га), або Флорід Фреш (0,2-0,3 кг/га) + Цинк Маджестик (0,5-0,75 л/га)	
Вихід колосу		Посухоустійкість, збільшення врожайності	Калій Фреш (1-2 кг/га)		
		Збільшення кількості заплідених квіток	Бор Маджестик (0,5 л/га)		
Молочна стиглість		Підвищення якості зерна, посухоустійкості	Аміно Фреш (0,5-1 л/га)	Інсектицид – Дестрой, або Ріфос	
		2-3 пари справжніх листків	Розвиток потужної кореневої системи	Енергія Фреш (0,5-1 л/га) + Фосфор Фреш (1-2 кг/га)	
технологія ClearField та ExpressSun		3-5 пар справжніх листків	Закладання більшої кількості квіток; усунення дефіциту бору	Бор Маджестик (1-1,5 л/га)	
		«Зірочка» - початок цвітіння	Максимальне заплінення квіток, виповненість насіння; усунення дефіциту бору	Калій Фреш (1-2 кг/га)	Фунгіцид – Арбалет, або Корнет + Форсаж, або Форсаж + інсектицид (при необхідності) Ін Сет, або Ріфос, або Альтекс
		3-4 пари справжніх листків	Усунення фітотоксичності після застосування гербіцидів	Ленд Фреш (0,3-1 кг/га), або Гуміленд Фреш (1-3 л/га), або Аміно Фреш (0,5-1 л/га)	
		«Зірочка» - початок цвітіння	Закладання більшої кількості квіток; усунення дефіциту бору	Бор Маджестик (1-1,5 л/га)	
Кукурудза	3-5 листків	Розвиток потужної кореневої системи	Енергія Фреш (0,5-1 л/га) + Фосфор Фреш (1-2 кг/га)	Гербіцид – Сулам, або Футурин, або Дікам Плюс, або Крейсер, або Нікоміл	
	6-9 листків	Стимулювання росту; посухоустійкості; усунення дефіциту цинку, міді, заліза та марганцю	Цинк Маджестик (1-3 л/га), або Мікс Фреш (0,5-1 кг/га)	Гербіцид – Сулам, або Крейсер, або Нікоміл	
Ріпак	10 листків - викидання волоти	Посухоустійкості, збільшення врожайності; усунення дефіциту калію	Калій Фреш (1-2 кг/га)	Інсектицид – Альтекс, або Ріфос	
	2-4 справжніх листки	Розвиток потужної кореневої системи	Енергія Фреш (0,5-1 л/га) + Фосфор Фреш (1-2 кг/га)	Гербіцид – Пропозит, або Шквал, або Леґіон	
	3-6 справжніх листків	Профілактика дуглостості; стимулювання утворення цукрів; зимо- та морозостійкості	Бор Маджестик (1-1,5 л/га) + Калій Фреш (1-2 кг/га)	Ретардант та фунгіцид – Ретардин EW	
	Відновлення розетки, початок росту стебла	Стимулювання росту; усунення дефіциту цинку, міді, заліза та марганцю	Мікс Фреш (0,5-1 кг/га)	Ретардант та фунгіцид – Ретардин EW + інсектицид – Ріфос, або Альтекс	
Бутонізація	Покращення засвоєння елементів живлення з ґрунту; холодостійкості (в умовах затяжної холодної весни)	Ленд Фреш (0,3-1 кг/га), або Гуміленд Фреш (1-3 л/га) + (або) Калій Фреш (1-2 кг/га)			
	Максимальне заплінення квіток, виповненість насіння; усунення дефіциту бору	Бор Маджестик (1-1,5 л/га)	Інсектицид – Дестрой		
Соя	1-3 трійчастих листки	Розвиток потужної кореневої системи	Енергія Фреш (0,5-1 л/га) + Фосфор Фреш (1-2 кг/га)	Гербіцид – Юпітер, або Ефес	
	Закладання більшої кількості квіток; усунення дефіциту бору	Бор Маджестик (1-1,5 л/га)			
Цвітіння - початок достигання	Посухоустійкість, підвищення врожайності	Флорід Фреш (0,2-0,4 кг/га) + Універсал Фреш (1-2 кг/га), або Аміно Фреш (0,5-1,0 л/га) + Універсал Фреш (1-2 кг/га)	Фунгіцид – Арбалет, або Корнет + Форсаж + інсектицид (при необхідності) Ін Сет, або Ріфос, або Альтекс		
		Калій Фреш (1-2 кг/га)			

* Вибір препаратів та норм використання залежить від виду шкідливого об'єкту, його чисельності, та фази розвитку

СИСТЕМА ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ (Professional)

• Деліт, РК (2,0-3,0 л/га)	• Гранівіт, ТН (2,5-3,0 л/т)	• Пропозит, КЕ (2,5-3,0 л/га)		
• Аболіпр, РГ (1,5 кг/га)	• Ін Сет SC, КС (3,5-6,0 л/т)	• Екстрем, КЕ (1,5-3,0 л/га)	• Нікоміл, ІС (0,7-1,0 л/га) 3-10 листків • Еліот, ІМД (1,25-2,0 л/га) 2-8 листків • Сулам, СЕ (0,4-0,6 л/га) 3-7 листків • Алач, ВГ (0,4-0,5 кг/га) 3-5 листків • Футурин, ВГ (0,2-0,25 кг/га) 3-5 листків	• Маджестик Цинк (1,0-3,0 л/га) • Фреш Калій (1,0-2,0 кг/га) • Фреш Аміно (0,5-1,0 л/га) • Фреш Універсал (1,0-2,0 кг/га)
	• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/т)	• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/га)	• Фреш Гуміленд, рід. (1,0-3,0 л/га)	• Фреш Мікс (0,5-1,0 кг/га)
	• Фреш Енергія (0,5-1,0 кг/т)	• Фреш Енергія (0,5-1,0 кг/га)		
На парах та полях, призначених під посіви ярих зернових	Протруєння насіяння	До сівби, під час та після сівби, але до появи сходів		Від 2 до 10 листків кукурудзи

140

■ ПРОТРУЙНИКИ

■ ГЕРБІЦИДИ

■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ

■ МІКРОДОБРИВА

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив) 2 – при застосуванні самостійно

СИСТЕМА ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ (Standard)

• Вулкан Плюс, РК (2,0-6,0 л/га)	• Гранівіт, ТН (2,5-3,0 л/т)	• Екстрем, КЕ (1,5-3,0 л/га)	• Дікам Плюс, РК (0,8-1,5 л/га) 3-5 листків • Алач, ВГ (0,4-0,5 кг/га) 3-5 листків • Ультра Плюс, КЕ (0,7-0,8 л/га) 3-5 листків	
	• Ін Сет SC, КС (3,0-6,0 л/т)			
	• Фреш Фосфор (1,0 - 2,0 кг/га)	• Фреш Фосфор (1,0 - 2,0 кг/га)	• Крейсер, ВГ (40-50 г/га + ПАР Флокс, РК (200 мл/га))	
			• Фреш Калій (0,5-1,0 кг/га)	
На парах та полях, призначених під посіви ярих зернових	Протруєння насіяння	До сівби, під час та після сівби, але до появи сходів		Від 3 до 10 листків кукурудзи

141






■ ПРОТРУЙНИКИ

■ ГЕРБІЦИДИ

■ МІКРОДОБРИВА

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив) 2 – при застосуванні самостійно






СИСТЕМА ЗАХИСТУ РІПАКУ (Professional)

• Ін Сет, КС (3,0-4,0 л/га)	• Пропозит, КЕ (2,0-3,0 л/га)	• Стилет, КЕ (0,4-1,8 л/га) • Шквал, КЕ (0,4-1,2 л/га)	• Легіон, ВГ (0,12-0,2 кг/га)	• Деліт, РК (2,0-2,5 л/га) • Абонір, РГ (1,5 кг/га)					
		• Ретардин ЕШ, ЕВ (0,5-1,0 л/га) • Ріфос, КЕ (0,5-0,6 л/га)	• Фреш Енергія (0,3-0,5 кг/га) • Фреш Гуміленд, рід. (1,0-3,0 л/га) • Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/га) • Маджестик Бор (1,5-3,0 л/га) • Фреш Універсал (1,0-2,0 кг/га)	• Арбалет, КС (0,6-1,0 л/га) • Фреш Калій (1,0-2,0 кг/га)					
		• Декстрой, КС (0,1-0,15 л/га)	• Фреш Мікс (0,5-1,5 тл/га)						
Протруєння до сівби	Обприскування ґрунту до/або після висівання, але до появи сходів	Фаза сім'ядолей листка 2 справжніх листка	5-6 листків	Бутонізація	Формування стручків	Побуріння стручків	Достигання		

■ ПРОТРУЙНИКИ ■ ГЕРБИЦИДИ ■ ІНСЕКТИЦИДИ ■ ФУНГЦИДИ ■ ДЕСИКАНТИ ■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ ■ МІКРОДОБРИВА

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив) 2 – при застосуванні самостійно

СИСТЕМА ЗАХИСТУ РІПАКУ (Standart)

• Ін Сет, КС (3,0-4,0 л/га)	• Тайфун, КЕ (1,6-2,6 л/га)	• Стилет, КЕ (0,4-1,8 л/га) • Шквал, КЕ (0,4-1,2 л/га)	• Легіон, ВГ (0,12-0,2 кг/га)	• Вулкан Плюс, РК (3,0 л/га)					
		• Альтекс, КЕ (0,1-0,15 л/га)	• Форсаж, КС (0,6 л/га) • Ретардин, ВГ (0,4-0,5 кг/га)	• Ріфос, КЕ (0,5-0,6 л/га)					
		• Ін Сет, ВГ (0,05-0,07 кг/га)	• Декстрой, КС (0,1-0,15 л/га)	• Фреш Калій (1,0-2,0 кг/га)					
		• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/га) • Фреш Універсал (1,0-2,0 кг/га)							
Протруєння до сівби	Обприскування ґрунту до/або після висівання, але до появи сходів	Фаза сім'ядолей листка 2 справжніх листка	5-6 листків	Бутонізація	Формування стручків	Побуріння стручків	Достигання		

■ ПРОТРУЙНИКИ ■ ГЕРБИЦИДИ ■ ІНСЕКТИЦИДИ ■ ФУНГЦИДИ ■ ДЕСИКАНТИ ■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ ■ МІКРОДОБРИВА

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив) 2 – при застосуванні самостійно

СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ (Professional)

• Ін Сет SC, КС (3,5-5,5 кг/т)	• Рейтар, КС (2,0-4,0 л/га)	• Стилет, КЕ (0,4-1,8 л/га)	• Шквал, КЕ (0,4-1,2 л/га)	• Деліт, РК (2,5 л/га)	
	• Пропозит, КЕ (2,0-3,0 л/га)	• Хантер, РК ³ (1,0-1,2 л/га)	• Молтено, РК ³ (1,0-1,2 л/га)	• Аболіт, РК (1,5 кг/га)	
		• Меркурій, ВІ ⁴ (0,02-0,05 кг/га)	• Арбалет, КС (0,6-1,0 л/га)	• Везувій, РК (2,0-3,0 л/га)	
			• Ріфос, КЕ (1,0 л/га)		
• Фреш Фосфор (1,0-2,0 ¹ кг/т)			• Фреш Фосфор (1,0-2,0 ¹ кг/га)		
• Маджестик Бор (1,0 л/т)			• Фреш Універсал (1,0-2,0 ¹ кг/га)		
• Фреш Флорід (0,3 кг/т)			• Маджестик Бор (1,5-3,0 л/га)		
		• Фреш Енергія (0,3-0,5 ² кг/га)	• Фреш Гуміленд, рід. (1,0-3,0 л/га)		
Протруєння до сімби	Обприскування вегетуючих бур'янів до висівання культури	Обприскування ґрунту до/під час висівання, але до появи сходів культури	Сходив-дві пари листків	Формування кошиків-цвітіння	Обприскування посівів у фазі побуріння кошиків

■ ПРОТРУЙНИКИ ■ ГЕРБИЦИДИ ■ ІНСЕКТИЦИДИ ■ ФУНГЦИДИ ■ ДЕСИКАНТИ ■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ ■ МІКРОДОБРИВА

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив) 2 – при застосуванні самостійно
3 – у посівах гібридів соняшнику, стійких до діючих речовин групи імідазоліноні 4 – гібриди стійкі до трибенурон-метилу

СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ (Standard)

• Ін Сет SC, КС (3,5-5,5 кг/т)	• Екстрем, КЕ (1,5-3,0 л/га)	• Стилет, КЕ (0,4-1,8 л/га)		• Везувій, РК (2,0-3,0 л/га)	
	• Тайфун, КЕ (1,6-2,6 л/га)	• Шквал, КЕ (0,4-1,2 л/га)		• Вулкан Плюс, РК (3,0 л/га)	
		• Меркурій, ВІ ³ (0,02-0,05 кг/га)			
		• Форсаж, КС + (0,4 л/га)	• Корнет, КС (0,4 л/га)		
		• Альтекс, КЕ (0,15 л/га)			
• Фреш Фосфор (1,0-2,0 ¹ кг/т)		• Фреш Фосфор (1,0-2,0 ¹ кг/т)	• Фреш Калій (1,0-2,0 ¹ кг/га)		
Протруєння до сімби	Обприскування вегетуючих бур'янів до висівання культури	Обприскування ґрунту до/під час висівання, але до появи сходів культури	Сходив-дві пари листків	Формування кошиків-цвітіння	Обприскування посівів у фазі побуріння кошиків

■ ПРОТРУЙНИКИ ■ ГЕРБИЦИДИ ■ ІНСЕКТИЦИДИ ■ ФУНГЦИДИ ■ ДЕСИКАНТИ ■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ ■ МІКРОДОБРИВА

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив) 2 – при застосуванні самостійно 3 – гібриди стійкі до трибенурон-метилу

СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОЇ (Professional)

• Деліт, РК (2,0-4,0 л/га)	• Галеон, ТН (0,55-0,75 л/г)	• Пролозіт, КЕ (2,0-3,0 л/га)	• Ефес, ВР (1,5-3,0 л/га)	• Деліт, РК (2,0-2,5 л/га)			
	• Рейтар, КС (2,0-3,0 л/га)	• Юпітер, РК* (0,5-1,0 л/га)	• Канцлер, ВГ (6-8 г/га)	• Везувій, РК (2,0-3,0 л/га)			
		• Стилет, КЕ** (0,4-1,8 л/га)	• Шквал, КЕ** (0,4-1,2 л/га)	• Аболір, РГ (1,5 кг/га)			
• Фреш Енергія (0,5-1,0 кг/г)			• Молотко, РК (0,75-1,0 л/га)				
• Фреш Гуміленд, рід. (1,0-3,0 л/г)			• Арбалет, КС (0,6-1,0 л/га)				
• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/г)			• Ріфос, КЕ (1,0 л/га)				
			• Фреш Енергія (0,5-1,0 кг/га)				
			• Фреш Гуміленд, рід. (1,0-3,0 л/га)				
			• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/га)				
			• Фреш Калій (1,0-2,0 кг/га)				
			• Фреш Мікс (0,5-1,5 г/га)				
Обприскування вегетуючих бур'янів до висівання культури	Протруєння до сівби	Обприскування ґрунту до/або після сівби, але до появи сходів	1 справжній листок	3-5 справжніх листків	Цвітіння - початок достигання	Побуріння бобів нижнього та середнього ярусів, за вологості насіння не більше 35-40%	Повна стиглість
		* Обприскування ґрунту до/або після сходів до 2-3 листків **Обприскування соєв незалежно від фази розвитку культури					

■ ПРОТРУЙНИКИ ■ ГЕРБИДИ ■ ІНСЕКТИЦИДИ ■ ФУНГІЦИДИ ■ ДЕСИКАНТИ ■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ ■ МІКРОДОБРИВА

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив) 2 – при застосуванні самостійно

СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОЇ (Standart)

• Вулкан Плюс, РК (2,0-6,0 л/га)	• Екстрем, КЕ (1,5-3,0 л/га)	• Ефес, РК (1,5-3,0 л/га)	• Везувій, РК (2,0-3,0 л/га)				
	• Юпітер, РК* (0,5-1,0 л/га)		• Вулкан Плюс, РК (3,0 л/га)				
	• Стилет, КЕ** (0,4-1,8 л/га)						
		• Форсаж, КС + (0,4 л/га)					
		• Корнет, КС (0,4 л/га)					
		• Альтекс, КЕ (0,15 л/га)					
• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/г)		• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/га)					
		• Фреш Калій (1,0-2,0 кг/га)					
		• Фреш Універсал (1,0-2,0 кг/га)					
Обприскування вегетуючих бур'янів до висівання культури	Обприскування ґрунту до/або після сівби, але до появи сходів	Обприскування ґрунту до/або після сходів до 2-3 листків **Обприскування соєв незалежно від фази розвитку культури	1 справжній листок	3-5 справжніх листків	Цвітіння, початок достигання	Побуріння бобів нижнього та середнього ярусів, за вологості насіння не більше 35-40%	Повна стиглість
		* Обприскування ґрунту до/або після сходів до 2-3 листків **Обприскування соєв незалежно від фази розвитку культури					

■ ГЕРБИДИ ■ ІНСЕКТИЦИДИ ■ ФУНГІЦИДИ ■ ДЕСИКАНТИ ■ МІКРОДОБРИВА

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив) 2 – при застосуванні самостійно

ЧУТЛИВІСТЬ БУР'ЯНІВ ДО ГЕРБИЦІДІВ

Клас	Назва бур'яна	Грунтові гербициди				Страхові гербициди							
		Екстрем	Пропозит	Рейтар	Тайфун	Бензотриазолони		Грамінциди		Імідазоліони			
						Ефес	Стилет	Шквал	Молтено	Хантер	Юпітер		
ацетолор	пропозолор	прометрин	метолахлор	бенгезон	клетодим	хлорлоф-П-етил	імазамокс	імазапір + імазамокс	імазетапір				
Злакові	Однорічні злаки	Просо, види <i>Panicum spp.</i>	2	2	2	2		3	3	3	3	3	
		Метлюг звичайний Метлица обыкновенная <i>Apera spica</i>	3	3	1	3		3	3	3	3	3	
		Пальчатка (види) Росичка кроваво-червона <i>Digitalis spp.</i>	3	3	2	3		3	3	3	3	3	
		Мишій (види) Щетинник (види) <i>Setaria spp.</i>	3	3	2	3		3	3	3	3	3	
		Вісок (види) Овсюк (види) <i>Avena spp.</i>	1	3	1	1		3	3	3	3	3	
		Пирій повзучий Пирей повзучий <i>Agropyron repens</i>	2		1			3	3	2	3	2	
	Багаторічні злаки	Гумай Гумай (Сорго аленське) <i>Sorghum halepense</i>	1	1		2		3	3		3	3	
		Тонконог (види) Мятлик (види) <i>Poa spp.</i>			1	3		3	3				
		Свинорій пальчатий Свинорій пальчатий <i>Cynodon dactylon</i>	1	1	1	1		3	3		3	3	
		Астрові (Asteraceae)											
	Двосім'ядольні	Однорічні двосім'ядольні	Амброзія польнолиста Амброзія польнолиста <i>Ambrosia artemisiifolia</i>	1	2	2	1	3			3	3	3
			Осот шорсткий Осот шерохватий <i>Sonhus asper</i>	2		1						3	3 (сходи)
			Ромашка (види) Ромашка (види) <i>Matricaria spp.</i>	1	2	2		3			3		
Галінсога (види) Галінсога (види) <i>Galinsoa</i>			2	3	3		3			3	3	3	
Нетреба (види) Дурнишник (види) <i>Xanthium</i>			1	2	2	1	3			3	3	3	
Капустяні (Brassicaceae)													
Прищип польова Горчиця польова <i>Sinapis arvensis</i>			1	2	2	3	3			3	3	3	
Грицики звичайні Пастушья сумка <i>Capsella bursa-pastoris</i>			1	2	3	2				3	3	3	
Кучерявць Софії Гулявник (Софій (Дескурайнія)) <i>Descurainia sophia</i>				2	2					3	3	3	
Редька дика Редька дика (полева) <i>Raphanus raphanistrum</i>			1	1	2	1	3			3	3	3	
Талбан польовий Ярутка польова <i>Thlaspi arvense</i>					3					3	3	2	
Гречкові (Polygonaceae)													
Гречка (види) Гречка (види) <i>Polygonum spp.</i>			2	2	2	3				3	3	3	
Гречка татарська Гречка татарська <i>Polygonum tataricum</i>			2		2	3	3				3	3	
Лободові (Chenopodiaceae)													
Лобода (види) Мара (види) <i>Chenopodium spp.</i>			3	2	2	2	3			3	2	2	
Лупига (види) Лебеда (види) <i>Atriplex spp.</i>			1	2		1				3	3	3	
Амарантові (Amaranthaceae)													
Щиряця (види) Щиряця (види) <i>Amaranthus spp.</i>	2	2	3	2	3			3	3	3			
Первоцвітні (Primulaceae)													
Курячі очка польові Очний цвет польовий <i>Anagallis arvensis</i>	1		2	1	2			3					

Страхові гербициди													
Синтетичні ауксини				Сульфонілсечовини							Триазол піримідинні		
Дікам Плюс	Легіон	Сулам	Ультра Плюс	Апач	Гурон	Еліот	Кандлер	Крейсер	Меркурій	Нікоміл	Фурурін	Корвет	
дикамба + 2,4 Д	клопіралд	2,4-Д ефір + флорасулам	2,4-Д ефір	римасульфурон-метил + дикамба	трибенурон-метил + тифенсульфурон-метил	мезотрион + нікосульфурон	тифенсульфурон-метил	римасульфурон-метил	трибенурон-метил	нікосульфурон	тифенсульфурон-метил + дикамба	флурметсулам + флорасулам	
				3		3		2		3			
				3				3					
				3		3		3		3			
				3		3		3		3			
				3		3		3		3			
				3		3		3		3			
				3		3		3		3			
				3		3		3		3			
				3		3		3		3			
3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	
2	3	2	2	3	3	3	2		2	1	3	3	
2	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	
3		3		3		3	1			3	3		
3	3	3	3	3		3	3	3			3	3	
3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	2	2	1	3	3	3	3	2	2	3	3	3	
		2	2									2	
3		3	3	3	3	3	3	2	2	3	3		
3		3	3	3	3		3	2			3		
2		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3		2	2	3		3		3			3		

ЧУТЛИВІСТЬ БУР'ЯНІВ ДО ГЕРБИЦІДІВ (Продовження)

Клас	Назва бур'яна	Грунтові гербициди				Страхові гербициди					
		Екстрем	Пропозит	Рейтар	Тайфун	Бензотриазолони		Грамініциди		Імідазоліни	
						Ефес	Стиллет	Шквал	Молтено	Хантер	Юпітер
		ацетолор	пропізохлор	прометрин	метолахлор	бенгезон	клетодим	хлоролор-П-етил	імзамакс	імзазір + мазмакс	імзагепір
Однорічні двосім'ядольні	Пасльонові (Solanaceae)										
	Паслін чорний Паслен черний Solanum nigrum	2	2	2	2	3			3	3	3
	Дурман звичайний Дурман обыкновенный Datura stramonium	1		2	2	3			3	3	3
	Макові (Papaveraceae)										
	Мак дикий Мак дикий Papaver rhoeas		2						3	3	
	Гвоздиківі (Caryophyllaceae)										
	Зірочник середній Звездчатка средняя Stellaria media	2	2	3	3				3	3	3
	Молочайні (Euphorbiaceae)										
	Молочай (види) Молочай (види) Euphorbia spp.	1	1			3 (сходи)				3	2
	Мальвові (Malvaceae)										
	Канатник Теофраста Канатник Теофраста Abutilon theophrasti	1	1		2	3			3	3	2
	Маренові (Rubiaceae)										
	Підмаренник чіпкий Подмаренник цепкий Galium aparine	1	2	1	1	3			3	3	3
	Руткові (Fumariaceae)										
	Рутка лікарська Дымянка лекарственная Fumaria officinalis	1	1	3		2			3	3	3
Глухокропивиові (Lamiaceae)											
Глуха кропива (види) Яснотка Lamium spp.		2	1		2			3	3	3	
Фіалкові (Violaceae)											
Фіалка польова Фиалка полевая Viola arvensis			3					3	3		
Астрові (Asteraceae)											
Лопух (види) Лопух (види) Arctium spp.											
Кульбаба лікарська Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale			1								
Осот польовий (рожевий) Осот розовый Cirsium arvense	1			1	3 (сходи)			2	3	3 (сходи)	
Осот жовтий польовий Осот полевой Sonchus arvensis	2		1		2 (сходи)			3	3	3 (сходи)	
Мальвові (Malvaceae)											
Просвірник (види) Калачики (види) Malva spp.	3			2				2	3	2	
Березкові (Convolvulaceae)											
Берізка польова Вьюнок полевой Convolvulus arvensis	1							2	3	1	
Капустяні (Brassicaceae)											
Хрінниця кругловодна Клоповник крупновидный Cardaria draba	3			2				3	3	3	
Жовтецеві (Ranunculaceae)											
Жовтець (види) Люттик (види) Ranunculus spp.								2	2		
Глухокропивиові (Lamiaceae)											
М'ята Мята Mentha spp.											
Хвощові (Equisetaceae)											
Хвощ польовий Хвощ полевой Equisetum arvense											

■ Чутливі: ураження бур'янів 75-100% ■ Середньочутливі: ураження бур'янів 31-75% ■ Стіякі: ураження бур'янів 0-30% □ відсутня або невідома дія препарату

Страхові гербициди												
Синтетичні ауксини				Сульфонілсечовини							Триазол піримідини	
Дікам Плюс	Легіон	Сулам	Ультра Плюс	Апан	Гурон	Еліот	Канцлер	Крейсер	Меркурій	Нікоміл	Фугурин	Корвет
дикамба + 2,4 Д	клопиралд	2,4-Д ефір + флорасулам	2,4-Д ефір	римсульфурон-метил + дикамба	трибенурон-метил + тифенсульфурон-метил	мезотрион + нкосульфурон	тифенсульфурон-метил	римсульфурон-метил	трибенурон-метил	нікосульфурон	тифенсульфурон-метил + дикамба	флурметсулам + флорасулам
2	3	3	2	3	1	3	1	1	1	3	3	3
2	3	2	2	3	2	3	1	2		3	3	3
3		3	3	3	3		2	3	3		3	3
3		3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2		2	1	2			1	3	1		2	
3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	1	3	1	3	3	3	2	3	2		3	3
3		2	1	3	1		2	3	1		3	2
3		3	2	2	3	3		3			3	2
3	3	3	1	3	3		3		3		3	2
3	3	3	3									2
3	3	3	3	3				3			3	2
2	3	2	2	3	3			2	2		3	2
2	3	2	2	3	3		2	2	3	1	3	2
		2										
2		2	2	3	1		1		1	1	3	
3		3	3	3	3			2	3		3	
3		3	3	3	3			3	3		3	1
2	2	3	1	3	3							
	2	2								1		

Таблиця складена на основі узагальнення рекомендацій та праць науково-дослідних установ України

СПЕКТР ДІЇ ФУНГІЦИДІВ І ПРОТРУЙНИКІВ НАСІННЯ

Основні види хвороб с/г культур	Арбалет, КС	Баліста, КЕ	Галеон, ТН	Гранівіт, ТН	Кольчуга Плюс, ТН	Корнет, КС	Пентафорс 322 FS, ТН	Ретардин EW, EB	Форсаж, КС	Юнкер, ЗП
Альтернاریоз	+		+			+		+	+	+
Антракноз					+		+			
Аскохітоз			+		+		+			
Біла гниль (соняшник)	+								+	
Борошниста роса	+	+			+	+	+	+	+	
Гельмінтоспоріоз	+	+				+				
Ірда листової бури	+	+				+		+		
Коренева гниль гелмінтоспоріоза	+		+	+	+	+	+		+	
Коренева гниль офіобольозна	+		+	+	+	+	+		+	
Коренева гниль пітіозна	+		+	+		+	+			
Коренева гниль фузаріозна	+		+	+	+	+	+		+	
Коренева гниль церкоспорельозна	+		+	+	+	+	+		+	
Мілд'ю	+					+				+
Моніліоз								+	+	
Несправжня борошниста роса (Пероноспороз)	+									+
Оїдіум		+						+	+	
Парша	+					+		+	+	+

Основні види хвороб с/г культур	Арбалет, КС	Баліста, КЕ	Галеон, ТН	Гранівіт, ТН	Кольчуга Плюс, ТН	Корнет, КС	Пентафорс 322 FS, ТН	Ретардин EW, EB	Форсаж, КС	Юнкер, ЗП
Пліснявння насіння			+	+	+		+		+	
Плямистості листя	+		+		+	+	+	+	+	
Ринхоспоріоз	+	+	+			+		+		
Різктоніоз			+	+					+	
Сажка кам'яна			+	+	+		+		+	
Сажка летюча			+	+	+		+		+	
Сажка покрита			+	+	+		+		+	
Сажка пухирчата			+	+			+		+	
Сажка тверда			+	+	+		+		+	
Септоріоз	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Сіра гниль (виноградники)									+	
Сіра гниль (соняшник, ріпак)	+				+			+	+	
Склеротинія (ріпак)					+			+	+	
Снігова пліснява			+						+	+
Фітофтороз										
Фомоз	+	+						+	+	
Фузаріоз	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Церкоспороз	+	+				+			+	
Чорна гниль (виноградники)										+

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

З метою запобігання можливих отруєнь при роботі з пестицидами, а також попадання препарату в харчові продукти і фураж забруднення водойм, повітря і ґрунту населених пунктів, необхідно строго дотримуватись заходів безпеки, передбачених Державними санітарними правилами "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві" ДСП 8.8.1.2.001-98 та "Державними санітарними правилами авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України" затв. МЗ України 382 від 18.12.96 р. У зв'язку з цим потрібно чітко виконувати всі заходи безпеки згідно з розробленими інструкціями, основними з яких є:

- усі працюючі з отрутохімікатами повинні мати допуск (посвідчення) на право виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами, видані відповідно до порядку отримання допуску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 746, від 18.09.95 р.;
- до роботи з пестицидами не допускаються особи, молодші за 18 років, вагітні і жінки-годувальниці, а також особи, у яких при попередньому медичному огляді виявлені захворювання, при яких забороняється робота з пестицидами;
- громадяни, які направлені на роботу з отрутохімікатами, повинні пройти попередній медичний огляд та інструктаж про токсичні властивості препаратів, що вносяться, нормах, строках та способах їх застосування;
- працюючих з отрутохімікатами слід забезпечити спецодягом з щільної, пилонепроникної тканини, спеціальним взуттям, респіраторами, протигазами, захисними окулярами, рукавицями;
- робота з отрутохімікатами повинна проводитися під керівництвом спеціалістів із захисту рослин або агрономів, які мають підготовку по заходам безпеки при роботі з отрутохімікатами;
- уникати контакту шкіри, очей і одягу з препаратом та робочим розчином. Не вдихати пил та аерозольні випари;
- при роботі з отрутохімікатами потрібно дотримуватись правил особистої гігієни, на місцях роботи не приймати харчі, не пити, не палити. Перед харчуванням потрібно зняти спецодяг, вимити з милом руки і лице, прополоскати рот. Після роботи слід добре струсити одяг і прийняти душ;
- спецодяг і захисні засоби перед їх повторним використанням піддавати очистці;
- в місцях роботи з отрутохімікатами забороняється зберігання харчів, води, фуражу та предметів домашнього побуту;
- тривалість роботи з отрутохімікатами не повинна перевищувати 6 годин, а при використанні сильнодіючих отрут (препаратів ртуті, миш'яку, фосфорорганічних сполук) – 4 години;
- забороняється залишати отрутохімікати в полі та інших місцях без охорони;
- випас худоби та укіс на оброблених гербіцидами ділянках дозволяється не раніше, як через 45 днів після обробки.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ:

Препарати слід зберігати згідно ДСП 8.8.1.2.001-98 „Транспортування, збереження та застосування пестицидів у народному господарстві”.

Отрутохімікати потрібно зберігати в оригінальній упаковці в сухому прохолодному складському приміщенні для агрохімікатів, яке має припливно-втяжну вентиляцію, поодаль від нагрівальних приладів, окремо від харчових продуктів та кормів при температурах не нижче +1°C і не вище +35°C.

Потрібно запобігати проникненню в складське приміщення вологого повітря. Забороняється зберігання у пошкодженій тарі. Транспортувати і відпускати препарати необхідно в спеціальній міцній, добре закритій тарі з вказівкою назви та кількості препарату.

Швидкість руху транспорту під час перевезення пестицидів повинна бути не більше 40 км/год, за несприятливих погодних умов – не більше 20 км/год.

Транспорт, апаратура, залишки препарату знезаражуються хлорним вапном, 10% розчином кальцієвої соди; порожня тара спалюється в установлених місцях. Забороняється повторне використання тари.

ПРИ РОБОТІ З ПЕСТИЦИДАМИ ПОТРІБНО НЕ ДОПУСКАТИ:

- забруднення іригаційних вод і водних джерел, що використовуються для побутових потреб;
- забруднення харчових продуктів і кормів;
- випас худоби на оброблених територіях;
- збирання врожаю або кормів протягом строків очікування.

ЗАХОДИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ:

До складу пестицидів входять органічні сполуки, зокрема розчинники, які характеризуються вогнебезпечними властивостями. Деякі з них горять та розкладаються під дією високих температур. Це може спричинити отруєння та матеріальні збитки.

ДЕЯКІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО УНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ:

- регулярно перевіряйте укомплектованість та справність протипожежного обладнання;
- для гасіння використовуйте пісок, ґрунт, пінні або порошкові вогнегасники;
- при охопленні вогнем пестицидів не використовуйте воду для його гасіння;
- при неможливості самостійного уникнення пожежі викликайте пожежну бригаду.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОПАДАННІ ПРЕПАРАТУ НА ШКІРУ, В ОЧІ, ШЛУНОК, ПРИ ВДИХАННІ ТОЩО

У разі будь-якого нездужання негайно припинити роботу, вжити заходів першої допомоги і викликати лікаря.

При попаданні препарату:


- у шлунок – необхідно дати постраждалому випити декілька стаканів води та викликати блювоту. Для більш повного видалення препарату із організму треба повторити це декілька раз. Після чого необхідно дати випити півсклянки 2% розчину питної соди, розмішати 2-3 столові ложки активованого вугілля;
- в очі – зняти препарат ватою або куском матерії та ретельно змити його теплою водою з милом (для фосфорорганічних – попередньо обробити 5-10% розчином аміаку або 2-5% розчином хлораміну);
- при інгаляційному попаданні в організм – постраждалого вивести із небезпечної зони, дати доступ свіжого повітря.

У разі необхідності доставити потерпілого в лікувальну установу для надання спеціалізованої допомоги. Лікування симптоматичне.

Особливу увагу потрібно приділити фосфорорганічному препарату Ріфос, КЕ. При отруєнні в терапії використовувати антидоти: атропін, оксимові препарати (ПАМ, токсогонін та ін.). Тяжкі отруєння можуть призвести до шоку і смерті протягом декількох годин після надходження у шлунок. Для інших препаратів – антидотів немає.



СОНЯШНИК AGS 103 HO


Оригінатор	Аспрія Сідс для компанії Агросфера
Тип	простий
Стиглість	надранній
Особливості	високоолеїновий гібрид 
Вегетаційний період	98 днів
Висота рослини	155 сантиметрів
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	50-55 для посушливих зон 60-65 для зон достатнього зволоження 65-70 для зрошення

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Високий	Дуже високий
Потенційна врожайність, ц/га	<div style="width: 75%;"></div>	
Енергія початкового росту	<div style="width: 65%;"></div>	
Стійкість до вилягання	<div style="width: 70%;"></div>	
Посухостійкість	<div style="width: 60%;"></div>	
Холодостійкість	<div style="width: 95%;"></div>	
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА ВОВЧКА	Високий	Дуже високий
Несправжня борошниста роса	<div style="width: 40%;"></div>	
Фома	<div style="width: 90%;"></div>	
Іржа	<div style="width: 55%;"></div>	
Склеротиніоз кошика	<div style="width: 80%;"></div>	
Склеротиніоз шийки	<div style="width: 75%;"></div>	
ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ		

- Висока олійність
- Дуже високий потенціал



СОНЯШНИК AGS 104 OR


Оригінатор	Аспрія Сідс для компанії Агросфера
Тип	простий
Стиглість	ранній
Особливості	стійкий до вовчка OR 7 
Вегетаційний період	100 днів
Висота рослини	150 сантиметрів
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	50-55 для посушливих зон 60-65 для зон достатнього зволоження 65-70 для зрошення

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Високий	Дуже високий
Потенційна врожайність, ц/га	<div style="width: 70%;"></div>	
Енергія початкового росту	<div style="width: 95%;"></div>	
Стійкість до вилягання	<div style="width: 95%;"></div>	
Посухостійкість	<div style="width: 90%;"></div>	
Холодостійкість	<div style="width: 95%;"></div>	
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА ВОВЧКА	Високий	Дуже високий
Несправжня борошниста роса	<div style="width: 95%;"></div>	
Фома	<div style="width: 65%;"></div>	
Іржа	<div style="width: 75%;"></div>	
Склеротиніоз кошика	<div style="width: 95%;"></div>	
Склеротиніоз шийки	<div style="width: 95%;"></div>	
ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ		

- Стійкий до водного стресу
- Висока олійність
- Добре адаптується до північних зон



СОНЯШНИК AGS 102 CL


Оригіатор	Аспрія Сідс для компанії Агросфера
Тип	простий
Стиглість	ранній
Особливості	ClearField гібрид стійкий до імідазолінонів
Вегетаційний період	101 день 
Висота рослини	150 сантиметрів
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	50-55 для посушливих зон 60-65 для зон достатнього зволоження 65-70 для зрошення

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Високий	Дуже високий
Потенційна врожайність, ц/га	[Green bar]	
Енергія початкового росту	[Green bar]	
Стійкість до вилягання	[Green bar]	
Посуhostійкість	[Green bar]	
Холодостійкість	[Green bar]	
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА ВОВЧКА	Високий	Дуже високий
Несправжня борошниста роса	[Orange bar]	
Фома	[Orange bar]	
Іржа	[Orange bar]	
Склеротиніоз кошика	[Orange bar]	
Склеротиніоз шийки	[Orange bar]	
ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ		

- Висока енергія росту на початок періоду
- Висока стійкість до грибкових хвороб
- Висока олійність
- Добре адаптується до північних зон



СОНЯШНИК AGS 101 OR

Оригіатор	Аспрія Сідс для компанії Агросфера
Тип	простий
Стиглість	ранній
Особливості	стійкий до вовчка OR 8 
Вегетаційний період	101 день
Висота рослини	165 сантиметрів
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	50-55 для посушливих зон 60-65 для зон достатнього зволоження 65-70 для зрошення

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Високий	Дуже високий
Потенційна врожайність, ц/га	[Green bar]	
Енергія початкового росту	[Green bar]	
Стійкість до вилягання	[Green bar]	
Посуhostійкість	[Green bar]	
Холодостійкість	[Green bar]	
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА ВОВЧКА	Високий	Дуже високий
Несправжня борошниста роса	[Orange bar]	
Фома	[Orange bar]	
Іржа	[Orange bar]	
Склеротиніоз кошика	[Orange bar]	
Склеротиніоз шийки	[Orange bar]	
ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ		

- Висока олійність
- Добре адаптується до північних зон
- Дуже високий потенціал



СОНЯШНИК AGS 105 CL

Оригіатор	Аспрія Сідс для компанії Агросфера
Тип	простий
Стиглість	середньостиглий
Особливості	ClearField гібрид стійкий до імідазолінонів
Вегетаційний період	110 днів
Висота рослини	160 сантиметрів
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	50-55 для посушливих зон 60-65 для зон достатнього зволоження 65-70 для зрошення



АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Високий	Дуже високий
Потенційна врожайність, ц/га	[Progress bar]	
Енергія початкового росту	[Progress bar]	
Стійкість до вилягання	[Progress bar]	
Посухостійкість	[Progress bar]	
Холодостійкість	[Progress bar]	
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА ВОВЧКА	Високий	Дуже високий
Несправжня борошниста роса	[Progress bar]	
Фома	[Progress bar]	
Іржа	[Progress bar]	
Склеротиніоз кошика	[Progress bar]	
Склеротиніоз шийки	[Progress bar]	
ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ		

- Висока олійність
- Висока стійкість до грибних хвороб
- Високий потенціал



КУКУРУДЗА AGS 504

Оригіатор	Аспрія Сідс для компанії Агросфера
Тип	трьохлінійний
Зерно	кременисто-зубоподібне
ФАО	310
Рядів у качані	16
Зерен у ряду	32
Висота рослини	середня
Висота кріплення качана	70 сантиметрів
Напрямок використання	зерно, силос, корнаж
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	70-80 для посушливих зон 80-90 для зон достатнього зволоження 90-100 для зрошення

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6° C)		
До цвітіння	895	
Силос (32% сухої речовини)	1510	
Зерно (35% вологи)	1710	
АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Висока	Дуже висока
Потенційна врожайність, ц/га	[Progress bar]	
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)	[Progress bar]	
Енергія початкового росту	[Progress bar]	
Стійкість до вилягання	[Progress bar]	
Посухостійкість	[Progress bar]	
Холодостійкість	[Progress bar]	
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	Висока	Дуже висока
Стійкість до фузаріозу	[Progress bar]	
Стійкість до пухирчастої сажки	[Progress bar]	
Стійкість до летючої сажки	[Progress bar]	
Стійкість до гельмінтоспориозу	[Progress bar]	
ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ		

- Високий потенціал



КУКУРУДЗА AGS 502

Оригіатор	Аспрія Сідс для компанії Агросфера
Тип	трьохлінійний
Зерно	кременисто-зубоподібне
ФАО	320
Рядів у качані	16
Зерен у ряду	32
Висота рослини	висока
Висота кріплення качана	95 сантиметрів
Напрямок використання	зерно, силос, корнаж
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	70-80 для посушливих зон 80-90 для зон достатнього зволоження 90-100 для зрошення

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6° С)

До цвітіння	880
Силос (32% сухої речовини)	1500
Зерно (35% вологи)	1660

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Висока	Дуже висока
Потенційна врожайність, ц/га	[Bar chart showing high potential yield]	
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)	[Bar chart showing stay green characteristics]	
Енергія початкового росту	[Bar chart showing energy of early growth]	
Стійкість до вилягання	[Bar chart showing resistance to lodging]	
Посухостійкість	[Bar chart showing drought tolerance]	
Холодостійкість	[Bar chart showing cold tolerance]	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	Висока	Дуже висока
Стійкість до фузаріозу	[Bar chart showing resistance to Fusarium]	
Стійкість до пухирчастої сажки	[Bar chart showing resistance to smut]	
Стійкість до летючої сажки	[Bar chart showing resistance to downy mildew]	
Стійкість до гелмінтоспоріозу	[Bar chart showing resistance to helminthosporium]	

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Високий потенціал



КУКУРУДЗА AGS 505

Оригіатор	Аспрія Сідс для компанії Агросфера
Тип	простий
Зерно	кременисто-зубоподібне
ФАО	330
Рядів у качані	16
Зерен у ряду	32
Висота рослини	висока
Висота кріплення качана	100 сантиметрів
Напрямок використання	зерно, силос, корнаж
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	70-80 для посушливих зон 80-90 для зон достатнього зволоження 90-100 для зрошення

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6° С)

До цвітіння	890
Силос (32% сухої речовини)	1510
Зерно (35% вологи)	1740

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Висока	Дуже висока
Потенційна врожайність, ц/га	[Bar chart showing high potential yield]	
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)	[Bar chart showing stay green characteristics]	
Енергія початкового росту	[Bar chart showing energy of early growth]	
Стійкість до вилягання	[Bar chart showing resistance to lodging]	
Посухостійкість	[Bar chart showing drought tolerance]	
Холодостійкість	[Bar chart showing cold tolerance]	

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	Висока	Дуже висока
Стійкість до фузаріозу	[Bar chart showing resistance to Fusarium]	
Стійкість до пухирчастої сажки	[Bar chart showing resistance to smut]	
Стійкість до летючої сажки	[Bar chart showing resistance to downy mildew]	
Стійкість до гелмінтоспоріозу	[Bar chart showing resistance to helminthosporium]	

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Висока невибагливість
- Добрий стан стебла у кінці цикла



КУКУРУДЗА ДН Корунд

Оригіатор	ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН»
Тип	трёхлінійний
Зерно	зубоподібне
ФАО	250
Рядів у качані	16
Зерен у ряду	32
Висота рослини	висока
Висота кріплення качана	90 сантиметрів
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	45-50 для посушливих зон 70-75 для зон достатнього зволоження 75-80 для зрошення

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6° С)

До цвітіння	890
Силос (32% сухої речовини)	1510
Зерно (35% вологи)	1740

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Потенційна врожайність, ц/га	[Green bar]				
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)	[Green bar]				
Енергія початкового росту	[Green bar]				
Стійкість до вилягання	[Green bar]				
Посухостійкість	[Green bar]				
Холодостійкість	[Green bar]				
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу	[Orange bar]				
Стійкість до пухирчастої сажки	[Orange bar]				
Стійкість до летючої сажки	[Orange bar]				
Стійкість до гельмінтоспориозу	[Orange bar]				

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Відносно скоростиглий
- Швидке зневоднення
- Швидкий початковий розвиток



КУКУРУДЗА Білозірський 295 СВ

Оригіатор	ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН»
Тип	трёхлінійний
Зерно	зубоподібне
ФАО	290
Рядів у качані	16
Зерен у ряду	36
Висота рослини	висока
Висота кріплення качана	105-115 сантиметрів
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	45-50 для посушливих зон 65-70 для зон достатнього зволоження 70-75 для зрошення

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6° С)

До цвітіння	890
Силос (32% сухої речовини)	1510
Зерно (35% вологи)	1740

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Потенційна врожайність, ц/га	[Green bar]				
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)	[Green bar]				
Енергія початкового росту	[Green bar]				
Стійкість до вилягання	[Green bar]				
Посухостійкість	[Green bar]				
Холодостійкість	[Green bar]				
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу	[Orange bar]				
Стійкість до пухирчастої сажки	[Orange bar]				
Стійкість до летючої сажки	[Orange bar]				
Стійкість до гельмінтоспориозу	[Orange bar]				

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Швидкий початковий розвиток
- Швидке зневоднення



КУКУРУДЗА Подільський 274 СВ

Оригіатор	ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН»
Тип	простий
Зерно	зубоподібне
ФАО	290
Рядів у качані	16
Зерен у ряду	37
Висота рослини	висока
Висота кріплення качана	100-105 сантиметрів
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	45-50 для посушливих зон 70-75 для зон достатнього зволоження 75-80 для зрошення

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6° С)

До цвітіння	890
Силос (32% сухої речовини)	1510
Зерно (35% вологи)	1740

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Потенційна врожайність ц/га	[Green bar]				
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)	[Green bar]				
Енергія початкового росту	[Green bar]				
Стійкість до вилягання	[Green bar]				
Посухостійкість	[Green bar]				
Холодостійкість	[Green bar]				
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу	[Orange bar]				
Стійкість до пухирчастої сажки	[Orange bar]				
Стійкість до летючої сажки	[Orange bar]				
Стійкість до гельмінтоспориозу	[Orange bar]				

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Дуже стійкий при перестойі і може використовуватись для зимового збирання
- Найбільш посухостійкий гібрид з високою врожайністю в степу України
- Відносно скоростиглий
- Швидкий початковий розвиток
- Швидке зневоднення



КУКУРУДЗА Солонянський 298 СВ

Оригіатор	ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН»
Тип	трьохлінійний
Зерно	зубоподібне
ФАО	310
Рядів у качані	16
Зерен у ряду	36
Висота рослини	висока
Висота кріплення качана	80-90 сантиметрів
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	45-50 для посушливих зон 70-75 для зон достатнього зволоження 75-80 для зрошення

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6° С)

До цвітіння	890
Силос (32% сухої речовини)	1510
Зерно (35% вологи)	1740

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Потенційна врожайність, ц/га	[Green bar]				
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)	[Green bar]				
Енергія початкового росту	[Green bar]				
Стійкість до вилягання	[Green bar]				
Посухостійкість	[Green bar]				
Холодостійкість	[Green bar]				
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу	[Orange bar]				
Стійкість до пухирчастої сажки	[Orange bar]				
Стійкість до летючої сажки	[Orange bar]				
Стійкість до гельмінтоспориозу	[Orange bar]				

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Найбільш розповсюджений гібрид вітчизняної селекції
- Швидкий початковий розвиток
- Національний стандарт в офіційному сортопробуванні України
- Швидке зневоднення



КУКУРУДЗА ДН Аквзор

Оригіатор	ДП «ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН»
Тип	простий
Зерно	зубоподібне
ФАО	320
Рядів у качані	16
Зерен у ряду	40-45
Висота рослини	висока
Висота кріплення качана	80-90 сантиметрів
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	45-50 для посушливих зон 70-75 для зон достатнього зволоження 75-80 для зрошення

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6° C)

До цвітіння	890
Силос (32% сухої речовини)	1510
Зерно (35% вологи)	1740

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Потенційна врожайність, ц/га	Green bar				
Достигання на зеленому стеблi (Stay green)	Green bar				
Енергія початкового росту	Green bar				
Стійкість до вилягання	Green bar				
Посухостійкість	Green bar				
Холодостійкість	Green bar				
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу	Orange bar				
Стійкість до пухирчастої сажки	Orange bar				
Стійкість до летючої сажки	Orange bar				
Стійкість до гельмінтоспориозу	Orange bar				
ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ					

- Низька збиральна вологість зерна
- Швидкий початковий розвиток
- Відносно скоростиглий
- Швидке зневоднення

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗОН ВИРОЩУВАННЯ:

Культура	СОЛЯШНИК					КУКУРУДЗА		
	AGS 105 CL	AGS 101 OR	AGS 102 CL	AGS 104 OR	AGS 103 HO	AGS 505	AGS 502	AGS 504
	110	101	101	100	98	330	320	310
Вінницька	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Дніпропетровська	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Донецька	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Житомирська	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Запорізька	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Київська	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Кіровоградська	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Луганська	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Львівська	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Миколаївська	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Одеська	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Полтавська	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Рівненська	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Сумська	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Тернопільська	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Харківська	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Херсонська	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Хмельницька	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Черкаська	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Чернівецька	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Чернігівська	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

ДЛЯ НОТАТОК

A series of horizontal dotted lines for taking notes on page 174.

ДЛЯ НОТАТОК

A series of horizontal dotted lines for taking notes on page 175.

Agrosfera^{AS}®

Територія професійного захисту

0 800 20 42 42

e-mail: agrosfera@agrosfera.ua

www.agrosfera.ua

